

الأكاديمية العربية الدولية



الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية

التكامل

أولاً تعريف التكامل الغير محدد:-

هو العملية العكسية لعملية الاشتقاق. فإذا كانت $F(x)$ دالة ما فإن علم التفاضل يختص بإيجاد مشتقة هذه الدالة $F'(x)$ بينما علم التكامل الغير محدود يختص بإيجاد الدالة $F(x)$

توضيح لمفهوم التكامل المحدد :-

إذا كانت $F'(x) = 2x$ وطلب منا إيجاد $F(x)$ ، فمن خلال خبرتنا بعلم التفاضل نستطيع أن نخمن أن الدالة المطلوبة قد تكون هي $F(x) = x^2$ مع أخذ العلم أن هذا الجواب ليس وحيداً لأن هناك العديد من الدوال $F(x)$ لها نفس التفاضل $F'(x)$ نحو:

$$F(x) = x^2 + 4$$

$$F(x) = x^2 - 3$$

$$F(x) = x^2 + \sqrt{2}$$

ولهذا كل الأجوبة السابقة تعتبر صحيحة ولتعميم الجواب نضع ثابت اختياري وليكن C يعبر عن أي عدد حقيقي أي أن الدالة المطلوبة هي :-

$$F(x) = x^2 + c$$

ومن ذلك اتضح لنا سبب تسميته بالتكامل غير محدد وذلك لأنه لا يعبر عن دالة محددة بل يعبر عن مجموعة من الدوال .

الرموز العلمية لعملية التكامل :-

إذا كانت $F'(x)$ مشتقة الدالة $F(x)$ فإن عملية التكامل المستخدمة لإيجاد الدالة $F(x)$ يرمز لها كالتالي :- $f(x)=F'(x)$, $\int f(x) dx = F(x) + c$ ، وتقرأ هذه العملية تكامل $f(x)$ بالنسبة لـ x .

عند حل مسائل التكامل يجب أن نتبع الآتي :-

- (1) إذا كانت المسألة على صورة أحد قوانين التكامل فإننا نكامل المسألة مباشرة باستخدام القانون المناسب .
- (2) إذا كانت المسألة ليست على صورة أحد قوانين التكامل فإننا نحاول تبسيط المسألة باستخدام العمليات الجبرية أو باستخدام المتطابقات المثلثية حتى نصل بالمسألة إلى صورة من صور قوانين التكامل إن أمكن ذلك .
- (3) إذا لم نتمكن من استخدام قوانين التكامل مباشرة ولم نتمكن من تبسيط المسألة أو تم تبسيطها ولكن لم تصل إلى صورة من صور قوانين التكامل فإننا نستخدم أحد طرق التكامل المناسبة .

قوانين التكامل :-

$$(1) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c , n \neq -1$$

$$(2) \int a dx = ax + c , a \in R$$

$$(3) \int dx = x + c$$

مسائل متنوعة على التكامل

$$(1) \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + c$$

$$(2) \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = 2x^{\frac{1}{2}} + c = 2\sqrt{x} + c$$

$$(3) \int \frac{3}{x^4} dx = \int 3x^{-4} dx = -x^{-3} + c = -\frac{1}{x^3} + c$$

$$(4) \int \sqrt{y} dy = \int y^{\frac{1}{2}} dy = \frac{y^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3}\sqrt{y^3} + c$$

$$(5) \int \frac{5x}{\sqrt[3]{x}} dx = \int 5x x^{-\frac{1}{3}} dx = \int 5x^{\frac{2}{3}} dx = 3x^{\frac{2}{3}} + c$$

$$= 3\sqrt[3]{x^2} + c$$

$$(6) \int 4t\sqrt{t^3} dt = \int 4t t^{\frac{3}{2}} dt = \int 4t^{\frac{5}{2}} dt = \frac{8}{7}t^{\frac{7}{2}} + c$$

$$= \frac{8}{7}\sqrt{t^7} + c$$

$$(7) \int \sqrt{3t^3} dt = \int \sqrt{3} t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2\sqrt{3}}{5}t^{\frac{5}{2}} + c = \frac{2\sqrt{3}}{5}\sqrt{t^5}$$

$$(8) \int 8 dx = 8x + c$$

$$(9) \int \sqrt{3} dx = \sqrt{3}x + c$$

$$(10) \int 3^2 dx = 3^2x + c = 9x + c$$

$$(11) \int \ln 3 \, dx = (\ln 3)x + c$$

$$(12) \int e^3 \, dx = e^3 x + c$$

$$(13) \int \frac{1}{e^2} \, dx = \frac{1}{e^2} x + c$$

$$(14) \int 0 \, dx = c$$

$$(15) \int \sin 30^\circ \, dx = x \sin 30^\circ + c$$

$$(16) \int 2^e \, dx = 2^e x + c$$

$$(17) \int \log 22 \, dx = (\log 22)x + c$$

$$(18) \int \sin^{-1} 3\pi \, dx = (\sin^{-1} 3\pi)x + c$$

$$(19) \int (r + 3x) \, dx = rx + \frac{3}{2}x^2 + c$$

$$(20) \int (2x^2 + 5x) \, dx = \frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + c$$

$$(21) \int (x^3 - 5x + 9) \, dx = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 9x + c$$

$$(22) \int \left(\frac{2}{x^3} - \frac{5}{x^2} + x \right) dx = \int (2x^{-3} - 5x^{-2} + x) dx$$

$$= -x^{-2} + 5x^{-1} + \frac{1}{2}x^2 + c = -\frac{1}{x^2} + \frac{5}{x} + \frac{1}{2}x^2 + c$$

$$(23) \int \left(\frac{x^4 + 2x^3 - 7}{x^3} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^3} + \frac{2x^3}{x^3} - \frac{7}{x^3} \right) dx$$

$$\int (x + 2 - 7x^{-3}) dx = \frac{1}{2}x^2 + 2x + \frac{7}{2}x^{-2} + c = \frac{1}{2}x^2 + 2x + \frac{7}{2x^2} + c$$

$$(24) \int \left(\frac{x^2 - 25}{x - 5} \right) dx = \int \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} dx = \int (x+5) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 + 5x + c$$

$$(25) \int \left(\frac{4x^3 - 12x^2}{x-3} \right) dx = \int \frac{4x^2(x-3)}{x-3} dx = \int 4x^2 dx$$

$$= \frac{4}{3}x^3 + c$$

$$(26) \int \left(\frac{x \ln 3 + 2 \ln 3}{x+2} \right) dx = \int \frac{(x+2) \ln 3}{x+2} dx = \int \ln 3 dx = x \ln 3 + c$$

$$(27) \int (x-2)(x+3) dx = \int (x^2 + x - 6) dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + c$$

$$(28) \int t^2 (\sqrt{t^3} + \sqrt[3]{t}) dt = \int t^2 (t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{3}}) dt = \int (t^{\frac{7}{2}} + t^{\frac{7}{3}}) dt$$

$$= \frac{2}{9} t^{\frac{9}{2}} + \frac{3}{10} t^{\frac{10}{3}} + c = \frac{2}{9} \sqrt{t^9} + \frac{3}{10} \sqrt[3]{t^{10}} + c$$

$$(29) \int \left(\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} \right) dx = \int \frac{(x-3)(x-2)}{x-3} dx = \int (x-2) dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 - 2x + c$$

$$(30) \int \left[x - \frac{1}{x} \right]^2 dx = \int \left[x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right] dx = \int [x^2 - 2 + x^{-2}] dx$$

$$= \frac{1}{3} x^3 - 2x - \frac{1}{x} + c$$

$$(31) \int x[x-1]^2 dx = \int x[x^2 - 2x + 1] dx = \int [x^3 - 2x^2 + x] dx$$

$$= \frac{1}{4} x^4 - \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + c$$

$$(32) \int \frac{(x+1)^2}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{x^2 + 2x + 1}{x^{\frac{1}{2}}} dx = \int (x^2 + 2x + 1) x^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \int (x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= \frac{2}{5} \sqrt{x^5} + \frac{4}{3} \sqrt{x^3} + 2\sqrt{x} + c$$

قوانين التكامل

$$(4) \int e^{F(x)} F'(x) dx = e^{F(x)} + c$$

$$(5) \int a^{F(x)} F'(x) dx = \frac{a^{F(x)}}{\ln a} + c$$

قوانين الأسس واللوغاريتمات:-

$$(1) A^n A^m = A^{n+m}$$

$$(2) \frac{A^n}{A^m} = A^{n-m}$$

$$(3) (A^n)^m = A^{nm}$$

$$(4) (A \cdot B)^m = A^m B^m$$

$$(5) \left(\frac{A}{B}\right)^n = \frac{A^n}{B^n}$$

$$(6) \sqrt[n]{A^m} = A^{\frac{m}{n}}$$

$$(1) \log_e A = \ln A$$

$$(2) \log_{10} A = \log A$$

$$(3) \log_a AB = \log_a A + \log_a B$$

$$(4) \log_a \frac{A}{B} = \log_a A - \log_a B$$

$$(5) e^{\ln F(x)} = F(x)$$

$$(6) a^{\log_a F(x)} = F(x)$$

$$(7) \ln e = 1$$

$$(8) \log_a a = 1$$

$$(9) \log_a B^n = n \log_a B$$

مسائل متنوعة على التكامل

$$(1) \int e^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 3e^{3x} dx = \frac{1}{3} e^{3x} + c$$

$$(2) \int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} \int -2e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} + c$$

$$(3) \int e^{-7x+2} dx = -\frac{1}{7} \int -7e^{-7x+2} dx = -\frac{1}{7} e^{-7x+2} + c$$

$$(4) \int e^{\frac{3}{2}x} dx = \frac{2}{3} \int \frac{3}{2} e^{\frac{3}{2}x} dx = \frac{2}{3} e^{\frac{3}{2}x} + c$$

$$(5) \int x e^{4x^2} dx = \frac{1}{8} \int 8x e^{4x^2} dx = \frac{1}{8} e^{4x^2} + c$$

$$(6) \int x^2 e^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int -3x^2 e^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} e^{-x^3} + c$$

$$(7) \int x^{-2} e^{\frac{1}{x}} dx = - \int -x^{-2} e^{\frac{1}{x}} dx = -e^{\frac{1}{x}} + c$$

$$(8) \int \frac{e^{x^{-2}}}{x^3} dx = \int x^{-3} e^{x^{-2}} dx = -\frac{1}{2} \int -2x^{-3} e^{x^{-2}} dx = -\frac{1}{2} e^{x^{-2}} + c$$

$$(9) \int (e^{2x} + e^{-8x}) dx = \frac{1}{2} \int 2e^{2x} dx - \frac{1}{8} \int -8e^{-8x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} - \frac{1}{8} e^{-8x} + c$$

$$(10) \int e dx = ex + c$$

$$\text{---} (11) \int \frac{3}{e^{4x}} dx = 3 \int e^{-4x} dx = -\frac{3}{4} \int -4e^{-4x} dx = -\frac{3}{4} e^{-4x} + c$$

$$(12) \int \sqrt{e^{3x}} dx = \int (e^{3x})^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{3}{2} e^{\frac{3}{2}x} dx = \frac{2}{3} e^{\frac{3}{2}x} + c$$

$$(13) \int e^{-1} dx = e^{-1} x + c$$

$$(14) \int \ln e dx = x \ln e + c = x + c$$

$$(15) \int \frac{e^{5x}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x-2x} dx = \frac{1}{3} \int 3e^{3x} dx = \frac{1}{3} e^{3x} + c$$

$$(16) \int \frac{e^{5x}}{e} dx = \int e^{5x-1} dx = \frac{1}{5} \int 5e^{5x-1} dx = \frac{1}{5} e^{5x-1} + c$$

$$(17) \int e^{-e} dx = e^{-e} x + c$$

$$(18) \int \frac{e^x + e^{2x}}{e^{3x}} dx = \int \frac{e^x}{e^{3x}} dx + \int \frac{e^{2x}}{e^{3x}} dx = -\frac{1}{2} \int 2e^{-2x} dx - \int e^{-x} dx$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-2x} - e^{-x} + c$$

$$(19) \int (e^x + e^{2x})(e^x - e^{2x}) dx = \int (e^{2x} - e^{4x}) dx = \frac{1}{2} \int 2e^{2x} dx - \frac{1}{4} \int 4e^{4x} dx$$

$$= \frac{1}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{4x} + c$$

$$(20) \int \ln \left(\frac{e^x}{e^{3x}} \right) dx = \int \ln(e^x e^{-3x}) dx = \int \ln e^{-2x} dx = \int -2x \ln e dx$$

$$= \int -2x dx = -x^2 + c$$

$$(21) \int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = \int e^{\frac{1}{x}} x^{-2} dx = - \int e^{\frac{1}{x}} x^{-2} dx = -e^{\frac{1}{x}} + c$$

$$(22) \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int e^{\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = 2e^{\sqrt{x}} + c$$

$$(23) \int \frac{e^{\ln x}}{x} dx = \int e^{\ln x} \frac{1}{x} dx = e^{\ln x} + c = x + c$$

$$(24) \int \frac{e^{\log x}}{x} dx = \ln 10 \int e^{\log x} \frac{1}{x \ln 10} dx = (\ln 10) e^{\log x} + c$$

$$(25) \int 3^{2x} dx = \frac{1}{2} \int 2 (3^{2x}) dx = \frac{3^{2x}}{2 \ln 3} + c$$

$$(26) \int 5^{-7x+2} dx = -\frac{1}{7} \int -7(5^{-7x+2}) dx = -\frac{5^{-7x+2}}{7 \ln 5} + c$$

$$(27) \int (5^{2x} + 7^{-8x}) dx = \frac{1}{2} \int 2(5^{2x}) dx - \frac{1}{8} \int -8(7^{-8x}) dx \\ = \frac{5^{2x}}{2 \ln 5} - \frac{7^{-8x}}{8 \ln 7} + c$$

$$(28) \int \frac{3}{5^{4x}} dx = 3 \int 5^{-4x} dx = -\frac{3}{4} \int -4(5^{-4x}) dx = -\frac{3(5^{-4x})}{4 \ln 5} + c$$

$$(29) \int \sqrt{7^{3x}} dx = \int (7^{3x})^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{3}{2} (7^{\frac{3}{2}x}) dx = \frac{2(7^{\frac{3}{2}x})}{3 \ln 7} + c$$

$$(30) \int 4^2 dx = 4^2 x + c$$

$$(31) \int \frac{5^{5x}}{5^{2x}} dx = \int 5^{5x-2x} dx = \frac{1}{3} \int 3(5^{3x}) dx = \frac{5^{3x}}{3 \ln 5} + c$$

$$(32) \int x^2 5^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int -3x^2 5^{-x^3} dx = -\frac{5^{-x^3}}{3 \ln 5} + c$$

$$(33) \int \frac{3^{x^{-2}}}{x^3} dx = \int x^{-3} 3^{x^{-2}} dx = -\frac{1}{2} \int -2x^{-3} 3^{x^{-2}} dx = -\frac{3^{x^{-2}}}{2 \ln 3} + c$$

$$(34) \int \frac{7^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int 7^{\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{2(7^{\sqrt{x}})}{\ln 7} + c$$

$$(35) \int \log \left(\frac{10^x}{10^{3x}} \right) dx = \int \log(10^{x-3x}) dx = \int \log 10^{-2x} dx = \int -2x \log 10 dx \\ = \int -2x dx = -x^2 + c$$

$$(36) \int \frac{4^x + 6^x}{2^x} dx = \int \frac{4^x}{2^x} dx + \int \frac{6^x}{2^x} dx = \int \left(\frac{4}{2}\right)^x dx + \int \left(\frac{6}{2}\right)^x dx \\ \int 2^x dx + \int 3^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{3^x}{\ln 3} + c$$

$$(37) \int 3\left(\frac{5}{3}\right)^{2x} dx = \frac{3}{2} \int 2\left(\frac{5}{3}\right)^{2x} dx = \frac{3\left(\frac{5}{3}\right)^{2x}}{2 \ln \frac{5}{3}} + c$$

$$\begin{aligned}
 (38) \int \frac{2^{x+1} - 5^{x+1}}{10^x} dx &= \int \frac{2^{x+1}}{10^x} dx - \int \frac{5^{x+1}}{10^x} dx = \int \frac{2^x 2}{10^x} dx - \int \frac{5^x 5}{10^x} dx \\
 &= 2 \int \left(\frac{2}{10}\right)^x dx - 5 \int \left(\frac{5}{10}\right)^x dx = 2 \int \left(\frac{1}{5}\right)^x dx - 5 \int \left(\frac{1}{2}\right)^x dx \\
 &= \frac{2\left(\frac{1}{5}\right)^x}{\ln \frac{1}{5}} - \frac{5\left(\frac{1}{2}\right)^x}{\ln \frac{1}{2}} + c
 \end{aligned}$$

$$(39) \int \pi^{2x} dx = \frac{1}{2} \int 2 (\pi^{2x}) dx = \frac{\pi^{2x}}{2 \ln \pi} + c$$

$$\begin{aligned}
 (40) \int \log \left(\frac{2^{x+1}}{3^x} \right) dx &= \int (\log 2^{x+1} - \log 3^x) dx \\
 &= \int (x+1) \log 2 dx - \int x \log 3 dx = \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right) \log 2 - \frac{1}{2}x^2 \log 3 + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (41) \int (2^x + 3^x)^2 dx &= \int (2^{2x} + 2 \cdot 2^x 3^x + 3^{2x}) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int 2^{2x} dx + \int 2 (2 \cdot 3)^x dx + \frac{1}{2} \int 3^{2x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int 2^{2x} dx + 2 \int 6^x dx + \frac{1}{2} \int 3^{2x} dx = \frac{2^{2x}}{2 \ln 2} + 2 \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{3^{2x}}{2 \ln 3} + c
 \end{aligned}$$

$$(42) \int (2^x + 3^{2x})(2^x - 3^{2x}) dx = \int (2^{2x} - 3^{4x}) dx = \frac{1}{2} \int 2^{2x} 2 dx - \frac{1}{4} \int 3^{4x} 4 dx$$

$$= \frac{2^{2x}}{2 \ln 2} - \frac{3^{4x}}{4 \ln 3} + c$$

$$(43) \int \frac{2^{\log x}}{x} dx = \ln 10 \int 2^{\log x} \frac{1}{x \ln 10} dx = \frac{2^{\log x} \ln 10}{\ln 2} + c$$

$$(44) \int 2^x \cdot 3^{2x} dx = \int (2 \cdot 3^2)^x dx = \int (18)^x dx = \frac{(18)^x}{\ln 18} + c$$

$$(45) \int e^x \cdot 3^{2x} dx = \int (e \cdot 3^2)^x dx = \int (9e)^x dx = \frac{(9e)^x}{\ln 9e} + c$$

$$(46) \int \frac{5^{2x}}{e^x} dx = \int \left(\frac{5^2}{e}\right)^x dx = \int \left(\frac{25}{e}\right)^x dx = \frac{\left(\frac{25}{e}\right)^x}{\ln \frac{25}{e}} + c$$

$$(47) \int (2+e)^x dx = \frac{(2+e)^x}{\ln(2+e)} + c$$

$$(48) \int (2+\pi)^x dx = \frac{(2+\pi)^x}{\ln(2+\pi)} + c$$

$$(49) \int (\ln 3)^x dx = \frac{(\ln 3)^x}{\ln(\ln 3)} + c$$

$$(50) \int (\sin 30^\circ)^x dx = \frac{(\sin 30^\circ)^x}{\ln(\sin 30^\circ)} + c$$

$$(51) \int x^\pi dx = \frac{x^{\pi+1}}{\pi+1} + c$$

$$(52) \int x^e dx = \frac{x^{e+1}}{e+1} + c$$

$$(53) \int e^{e^x + x} dx = \int e^{e^x} e^x dx = e^{e^x} + c$$

$$(54) \int e^{2x^2 + \ln x} dx = \int e^{2x^2} e^{\ln x} dx = \frac{1}{4} \int 4e^{2x^2} x dx = \frac{1}{4} e^{2x^2} + c$$

$$(55) \int e^{-\frac{1}{x} - 2 \ln x} dx = \int e^{-\frac{1}{x}} e^{-2 \ln x} dx = \int e^{-\frac{1}{x}} \frac{1}{x^2} dx = e^{-\frac{1}{x}} + c$$

$$\begin{aligned} (56) \int \frac{(e^x + 3)^2}{e^{-x}} dx &= \int \frac{e^{2x} + 6e^x + 9}{e^{-x}} dx = \int (e^{2x} + 6e^x + 9)e^x dx \\ &= \int (e^{3x} + 6e^{2x} + 9e^x) dx = \frac{1}{3} e^{3x} + 3e^{2x} + 9e^x + c \end{aligned}$$

$$(57) \int \frac{e^{2x}-1}{e^x+1} dx = \int \frac{(e^x+1)(e^x-1)}{e^x+1} dx = \int (e^x-1) dx = e^x - x + c$$

$$(58) \int x^3 e^{\ln x} dx = \int x^3 x dx = \int x^4 dx = \frac{1}{5} x^5 + c$$

$$(59) \int e^x \tan^{-1}(3) dx = \tan^{-1}(3) \int e^x dx = \tan^{-1}(3) e^x + c$$

$$(60) \int e^{\ln x+1} dx = \int e^{\ln x} e dx = e \int x dx = \frac{e}{2} x^2 + c$$

$$(61) \int \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int 2^{\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{2}{\ln 2} 2^{\sqrt{x}} + c$$

$$(62) \int 2^{3^x} 3^x dx = \frac{1}{\ln 3} \int 2^{3^x} 3^x (\ln 3) dx = \frac{2^{3^x}}{(\ln 3)(\ln 2)} + c$$

$$(63) \int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1} dx = \int \frac{(e^x+1)(e^{2x}-e^x+1)}{e^x+1} dx = \int (e^{2x}-e^x+1) dx \\ = \frac{1}{2} \int 2e^{2x} dx - \int e^x dx + \int x dx = \frac{1}{2} e^{2x} - e^x + x + c$$

$$(63) \int (e^x + e^{-x})^2 dx = \int (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx \\ = \frac{1}{2} \int 2e^{2x} dx + \int 2 dx - \frac{1}{2} \int -2e^{-2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + 2x - \frac{1}{2} e^{-2x} + c$$

قوانين التكامل

$$(6) \int \frac{F'(x)}{F(x)} dx = \ln|F(x)| + c$$

$$(7) \int [F(x)]^n F'(x) dx = \frac{[F(x)]^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$$

قوانين اللوغاريتمات :-

$$(1) \log_e A = \ln A$$

$$(2) \log_{10} A = \log A$$

$$(3) \log_a A B = \log_a A + \log_a B$$

$$(4) \log_a \frac{A}{B} = \log_a A - \log_a B$$

$$(5) e^{\ln F(x)} = F(x)$$

$$(6) a^{\log_a F(x)} = F(x)$$

$$(7) \ln e = 1$$

$$(8) \log_a a = 1$$

$$(9) \log_a B^n = n \log_a B$$

مسائل متنوعة على التكامل

$$(1) \int \frac{dx}{2+x} = \ln|2+x| + c$$

$$(2) \int \frac{3dx}{5x+3} = \frac{3}{5} \int \frac{5dx}{5x+3} = \frac{3}{5} \ln|5x+3| + c$$

$$(3) \int \frac{2dx}{4-3x} = -\frac{2}{3} \int \frac{-3dx}{4-3x} = -\frac{2}{3} \ln|4-3x| + c$$

$$(4) \int \frac{x+5}{x^2+10x+5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+10}{x^2+10x+5} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+10x+5| + c$$

$$(5) \int \frac{x^2+4x^5}{x^3+2x^6} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2+12x^5}{x^3+2x^6} dx = \frac{1}{3} \ln|x^3+2x^6| + c$$

$$(6) \int \frac{2e^x}{2+e^x} dx = 2 \int \frac{e^x}{2+e^x} dx = 2 \ln|2+e^x| + c$$

$$(7) \int \frac{e^x+1}{e^x+x} dx = \ln|e^x+x| + c$$

$$(8) \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \ln|e^x + e^{-x}| + c$$

$$(9) \int \frac{3x^2+2x}{\sqrt{x^3+x^2}} dx = \int (3x^2+2x) (x^3+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = 2(x^3+x^2)^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= 2\sqrt{x^3+x^2} + c$$

$$(10) \int \frac{4x+1}{\sqrt{2x^2+x+3}} dx = \int (4x+1)(2x^2+x+3)^{-\frac{1}{2}} dx = 2(2x^2+x+3)^{\frac{1}{2}}$$

$$= 2\sqrt{2x^2+x+3} + c$$

$$(11) \int \frac{e^x - x}{\sqrt[3]{2e^x - x^2}} dx = \frac{1}{2} \int (2e^x - 2x)(2e^x - x^2)^{-\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4} (2e^x - x^2)^{\frac{2}{3}} + c$$

$$= \frac{3}{4} \sqrt[3]{(2e^x - x^2)^2} + c$$

$$(12) \int \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{e^{2x} - e^{-2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{e^{2x} - e^{-2x}} dx = \frac{1}{2} \ln |e^{2x} - e^{-2x}| + c$$

$$(13) \int \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{2^x \ln 2 + 2^{-x} \ln 2}{2^x - 2^{-x}} dx = \frac{1}{\ln 2} \ln |2^x - 2^{-x}| + c$$

$$(14) \int \frac{dx}{e+x} = \ln |e+x| + c$$

$$(15) \int \frac{dx}{\pi+x} = \ln |\pi+x| + c$$

$$(16) \int \frac{(2+\ln x)^{10} dx}{x} = \int (2+\ln x)^{10} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{11} (2+\ln x)^{11} + c$$

مسائل متنوعة على التكامل

$$(1) \int \frac{dx}{2+x} = \ln|2+x| + c$$

$$(2) \int \frac{3dx}{5x+3} = \frac{3}{5} \int \frac{5dx}{5x+3} = \frac{3}{5} \ln|5x+3| + c$$

$$(3) \int \frac{2dx}{4-3x} = -\frac{2}{3} \int \frac{-3dx}{4-3x} = -\frac{2}{3} \ln|4-3x| + c$$

$$(4) \int \frac{x+5}{x^2+10x+5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+10}{x^2+10x+5} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+10x+5| + c$$

$$(5) \int \frac{x^2+4x^5}{x^3+2x^6} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2+12x^5}{x^3+2x^6} dx = \frac{1}{3} \ln|x^3+2x^6| + c$$

$$(6) \int \frac{2e^x}{2+e^x} dx = 2 \int \frac{e^x}{2+e^x} dx = 2 \ln|2+e^x| + c$$

$$(7) \int \frac{e^x+1}{e^x+x} dx = \ln|e^x+x| + c$$

$$(8) \int \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}} dx = \ln|e^x+e^{-x}| + c$$

$$(9) \int \frac{3x^2+2x}{\sqrt{x^3+x^2}} dx = \int (3x^2+2x) (x^3+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = 2(x^3+x^2)^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= 2\sqrt{x^3+x^2} + c$$

$$(10) \int \frac{4x+1}{\sqrt{2x^2+x+3}} dx = \int (4x+1)(2x^2+x+3)^{-\frac{1}{2}} dx = 2(2x^2+x+3)^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= 2\sqrt{2x^2+x+3} + c$$

$$(11) \int \frac{e^x - x}{\sqrt[3]{2e^x - x^2}} dx = \frac{1}{2} \int (2e^x - 2x)(2e^x - x^2)^{-\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4}(2e^x - x^2)^{\frac{2}{3}} + c$$

$$= \frac{3}{4}\sqrt[3]{(2e^x - x^2)^2} + c$$

$$(12) \int \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{e^{2x} - e^{-2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{e^{2x} - e^{-2x}} dx = \frac{1}{2} \ln|e^{2x} - e^{-2x}| + c$$

$$(13) \int \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{2^x \ln 2 + 2^{-x} \ln 2}{2^x - 2^{-x}} dx = \frac{1}{\ln 2} \ln|2^x - 2^{-x}| + c$$

$$(14) \int \frac{dx}{e+x} = \ln|e+x| + c$$

$$(15) \int \frac{dx}{\pi+x} = \ln|\pi+x| + c$$

$$(16) \int \frac{(2+\ln x)^{10} dx}{x} = \int (2+\ln x)^{10} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{11} (2+\ln x)^{11} + c$$

$$(17) \int \frac{e^{x^2} x}{\sqrt{1-e^{x^2}}} dx = -\frac{1}{2} \int -2e^{x^2} x (1-e^{x^2})^{-\frac{1}{2}} dx = -(1-e^{x^2})^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= -\sqrt{1-e^{x^2}} + c$$

$$(18) \int \frac{\sqrt[4]{1-\frac{1}{x}}}{x^2} dx = \int x^{-2} (1-\frac{1}{x})^{\frac{1}{4}} dx = \frac{4}{5} (1-\frac{1}{x})^{\frac{5}{4}} + c$$

$$(19) \int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} dx = 2 \int (1+\sqrt{x})^3 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} (1+\sqrt{x})^4 + c$$

$$(20) \int (1+\frac{1}{x})^{-3} \frac{1}{x^2} dx = \int (1+x^{-1})^{-3} x^{-2} dx = - \int (1+x^{-1})^{-3} x^{-2} dx$$

$$= -\frac{(1+x^{-1})^{-2}}{-2} + c = \frac{1}{2(1+\frac{1}{x})^2} + c$$

$$(21) \int x^{\frac{1}{3}} \sqrt{x^{\frac{4}{3}} - 1} dx = \int x^{\frac{1}{3}} (x^{\frac{4}{3}} - 1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{3}{4} \int \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} (x^{\frac{4}{3}} - 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{3}{4} \frac{(x^{\frac{4}{3}} - 1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{1}{2} (x^{\frac{4}{3}} - 1)^{\frac{3}{2}} + c = \frac{1}{2} \sqrt{(\sqrt[3]{x^4} - 1)^3} + c$$

$$(22) \int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \int \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}+1)} dx = 2 \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}+1)} dx = 2 \ln|\sqrt{x}+1| + c$$

$$(23) \int \frac{dx}{x\sqrt{\ln x+1}} = \int (\ln x+1)^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{x} dx = 2(\ln x+1)^{\frac{1}{2}} + c = 2\sqrt{\ln x+1} + c$$

$$(24) \int \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \int (\ln x)^{-2} \frac{1}{x} dx = -(\ln x)^{-1} + c = -\frac{1}{\ln x} + c$$

$$(25) \int e^{2x} \sqrt{1+e^{2x}} dx = \frac{1}{2} \int 2e^{2x} (1+e^{2x})^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \frac{(1+e^{2x})^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c$$

$$= \frac{1}{3} \sqrt{(1+e^{2x})^3} + c$$

$$(26) \int \frac{\sqrt{\ln x+1} dx}{x} = \int (\ln x+1)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x} dx = \frac{2}{3} (\ln x+1)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{(\ln x+1)^3} + c$$

$$(27) \int \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx = \frac{2}{3} \int \frac{\frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}}{1+x^2} dx = \frac{2}{3} \ln|1+x^{\frac{3}{2}}| + c$$

$$\begin{aligned}
 (28) \int \frac{dx}{x^{\frac{1}{3}}(1+x^{\frac{2}{3}})^2} &= \frac{3}{2} \int \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} (1+x^{\frac{2}{3}})^{-2} dx = -\frac{3}{2} (1+x^{\frac{2}{3}})^{-1} + c \\
 &= -\frac{3}{2+2x^{\frac{2}{3}}} + c
 \end{aligned}$$

$$(29) \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{\frac{1}{x} dx}{\ln x} = \ln |\ln x| + c$$

$$(30) \int \frac{dx}{x \ln x + x} = \int \frac{dx}{x(\ln x + 1)} = \int \frac{\frac{1}{x} dx}{(\ln x + 1)} = \ln |\ln x + 1| + c$$

$$(31) \int (x^2 - x)^{\frac{1}{2}} (x - \frac{1}{2}) dx = \frac{1}{2} \int (x^2 - x)^{\frac{1}{2}} (2x - 1) dx = \frac{1}{3} (x^2 - x)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$\begin{aligned}
 (32) \int \frac{3x^2 dx}{(9+x^3)\sqrt{\ln(9+x^3)}} &= \int \frac{3x^2}{(9+x^3)} \cdot [\ln(9+x^3)]^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= 2[\ln(9+x^3)]^{\frac{1}{2}} + c = 2\sqrt{\ln(9+x^3)} + c
 \end{aligned}$$

$$(33) \int 4^x (1+2^{2x})^5 dx = \frac{1}{\ln 4} \int (\ln 4) 4^x (1+4^x)^5 dx = \frac{(1+4^x)^6}{6 \ln 4} + c$$

$$(34) \int \frac{\sqrt{1+e^{-4x}}}{e^{-6x}} dx = \int \sqrt{1+\frac{1}{e^{4x}}} e^{6x} dx = \int \sqrt{\frac{e^{4x}+1}{e^{4x}}} e^{6x} dx$$

$$\int \frac{\sqrt{e^{4x}+1}}{e^{2x}} e^{6x} dx = \frac{1}{4} \int (e^{4x}+1)^{\frac{1}{2}} 4e^{4x} dx = \frac{1}{6} (e^{4x}+1)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(35) \int \frac{2^x}{2+2^x} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{2^x \ln 2}{2+2^x} dx = \frac{1}{\ln 2} \ln |2+2^x| + c$$

$$(36) \int \frac{3}{(1+x)^5} dx = 3 \int (1+x)^{-5} dx = -\frac{3(1+x)^{-4}}{4} + c$$

$$= -\frac{3}{4(1+x)^4} + c$$

$$(37) \int (1+x^2)^2 dx = \int (1+2x^2+x^4) dx = x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + c$$

$$(38) \int \frac{8-2x}{\sqrt{4-x}} dx = 2 \int \frac{4-x}{\sqrt{4-x}} dx = 2 \int (4-x)(4-x)^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= -2 \int -(4-x)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{4}{3}(4-x)^{\frac{3}{2}} + c = -\frac{4}{3}\sqrt{(4-x)^3} + c$$

$$(39) \int \frac{dx}{x^2+4x+4} = \int \frac{dx}{(x+2)^2} = \int (x+2)^{-2} dx = \frac{(x+2)^{-1}}{-1} + c$$

$$= \frac{1}{-x-2} + c$$

$$(40) \int \frac{dx}{(x+2)\sqrt{x^2+4x+4}} = \int \frac{dx}{(x+2)\sqrt{(x+2)^2}} = \int \frac{dx}{(x+2)(x+2)}$$

$$= \int (x+2)^{-2} dx = \frac{(x+2)^{-1}}{-1} + c = \frac{1}{-x-2} + c$$

$$(41) \int \frac{dx}{1+e^x} = \int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+e^{-x}e^x} dx \quad \text{بضرب البسط والمقام في } e^{-x}$$

$$= -\int \frac{-e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = -\ln|e^{-x}+1| + c$$

$$(42) \int \frac{dx}{1+e^{-x}} = \int \frac{e^x}{e^x+e^{-x}e^x} dx \quad \text{بضرب البسط والمقام في } e^x$$

$$= \int \frac{e^x}{e^x+1} dx = \ln|e^x+1| + c$$

$$(43) \int \frac{dx}{1+2^{-x}} = \int \frac{2^x}{2^x + 2^{-x} 2^x} dx \quad \text{بضرب البسط والمقام في } 2^x$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{2^x \ln 2}{2^x + 1} dx = \frac{1}{\ln 2} \ln |2^x + 1| + c$$

$$(44) \int \frac{dx}{1+3^x} = \int \frac{3^{-x}}{3^{-x} + 3^{-x} 3^x} dx \quad \text{بضرب البسط والمقام في } 3^{-x}$$

$$= -\frac{1}{\ln 3} \int \frac{-3^{-x} \ln 3}{3^{-x} + 1} dx = -\frac{1}{\ln 3} \ln |3^{-x} + 1| + c$$

$$(45) \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{e^x e^x}{e^x e^x + e^x e^{-x}} dx \quad \text{بضرب البسط والمقام في } e^x$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x}}{e^{2x} + 1} dx = \frac{1}{2} \ln |e^{2x} + 1| + c$$

$$(46) \int \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx = \int \tan^{-1} x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} (\tan^{-1} x)^2 + c$$

$$(47) \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 2e^x + 1} = \int \frac{e^x dx}{(e^x + 1)^2} = \int e^x (e^x + 1)^{-2} dx = \frac{(e^x + 1)^{-1}}{-1} + c$$

$$= \frac{1}{-e^x - 1} + c$$

$$(48) \int \frac{\ln x \, dx}{x \sqrt{3 + (\ln x)^2}} = \int \frac{\ln x}{x} [3 + (\ln x)^2]^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int 2 \frac{\ln x}{x} [3 + (\ln x)^2]^{-\frac{1}{2}} dx = [3 + (\ln x)^2]^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= \sqrt{3 + (\ln x)^2} + c$$

$$(49) \int \frac{\ln \sqrt[6]{e^{6x} - 6}}{1 - 6e^{-6x}} dx = \int \frac{\ln(e^{6x} - 6)^{\frac{1}{6}}}{1 - 6e^{-6x}} dx$$

$$= \frac{1}{6} \int \frac{\ln(e^{6x} - 6)}{1 - 6e^{-6x}} dx = \frac{1}{6} \int \ln(e^{6x} - 6) \frac{1}{1 - 6e^{-6x}} dx$$

(بضرب البسط والمقام في e^{6x})

$$= \frac{1}{36} \int \ln(e^{6x} - 6) \frac{6e^{6x}}{e^{6x} - 6} dx = \frac{1}{72} [\ln(e^{6x} - 6)]^2 + c$$

$$(50) \int \frac{\ln \sqrt{1 - 2^{3x}}}{2^{-3x} - 1} dx = \int \frac{\ln(1 - 2^{3x})^{\frac{1}{2}}}{2^{-3x} - 1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{\ln(1 - 2^{3x})}{2^{-3x} - 1} dx = \frac{1}{2} \int \ln(1 - 2^{3x}) \frac{1}{2^{-3x} - 1} dx$$

(بضرب البسط والمقام في 2^{3x})

$$= \frac{1}{-6 \ln 2} \int \ln(1 - 2^{3x}) \frac{-2^{3x} 3 \ln 2}{1 - 2^{3x}} dx = -\frac{1}{12 \ln 2} [\ln(1 - 2^{3x})]^2 + c$$

$$\begin{aligned}
 (51) \int \frac{\sqrt{4-9^x}}{3^{-2x}} dx &= \int (4-9^x)^{\frac{1}{2}} 3^{2x} dx \\
 &= \frac{-1}{\ln 9} \int -(4-9^x)^{\frac{1}{2}} 9^x \ln 9 dx \\
 &= \frac{-2}{3\ln 9} (4-9^x)^{\frac{3}{2}} + c = \frac{-2}{3\ln 9} \sqrt{(4-9^x)^3} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (52) \int \frac{2^x dx}{4^x + 2^{x+1} + 1} &= \int \frac{2^x}{2^{2x} + 2(2^x) + 1} dx \\
 &= \int \frac{2^x}{(2^x + 1)(2^x + 1)} dx = \int \frac{2^x}{(2^x + 1)^2} dx \\
 &= \frac{1}{\ln 2} \int 2^x (2^x + 1)^{-2} \ln 2 dx = \frac{-1}{\ln 2} (2^x + 1)^{-1} + c \\
 &= \frac{-1}{(\ln 2)(2^x + 1)} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (53) \int \frac{dx}{x(\ln x)^2 + 2x \ln x + x} &= \int \frac{dx}{x[(\ln x)^2 + 2\ln x + 1]} \\
 &= \int \frac{1 dx}{x(\ln x + 1)(\ln x + 1)} = \int \frac{1}{x(\ln x + 1)^2} dx \\
 &= \int \frac{1}{x} (\ln x + 1)^{-2} dx = -(\ln x + 1)^{-1} + c \\
 &= \frac{-1}{\ln x + 1} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (54) \int \frac{\ln x}{x} e^{\ln\left(\frac{1}{\sqrt{3+(\ln x)^2}}\right)} dx &= \int \frac{\ln x}{x\sqrt{3+(\ln x)^2}} dx \\
 &= \int \frac{\ln x}{x} (3+(\ln x)^2)^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \int 2 \frac{\ln x}{x} (3+(\ln x)^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= (3+(\ln x)^2)^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{3+(\ln x)^2} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (55) \int \frac{1+\ln x}{3+2x\ln x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2+2\ln x}{3+2x\ln x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln(3+2x\ln x) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (56) \int \frac{\ln x}{x(\ln x)^2 + x} dx &= \int \frac{\ln x}{x[(\ln x)^2 + 1]} dx \\
 \frac{1}{2} \int \frac{2 \frac{\ln x}{x}}{(\ln x)^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \ln|(\ln x)^2 + 1|
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (57) \int \frac{e^x x + 1}{2x\sqrt{e^x + \ln x}} dx &= \int \left(\frac{e^x x + 1}{2x}\right) (e^x + \ln x)^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{e^x x + 1}{x}\right) (e^x + \ln x)^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= (e^x + \ln x)^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{e^x + \ln x} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (58) \int \frac{\sqrt{1+\ln(1+4^x)}}{2^{-2x}(1+4^x)} dx &= \int [1+\ln(1+4^x)]^{\frac{1}{2}} \frac{2^{2x}}{1+4^x} dx \\
 &= \frac{1}{\ln 4} \int [1+\ln(1+4^x)]^{\frac{1}{2}} \frac{4^x}{1+4^x} \ln 4 \, dx \\
 &= \frac{2}{3\ln 4} [1+\ln(1+4^x)]^{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3\ln 4} \sqrt{[1+\ln(1+4^x)]^3} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (59) \int \frac{\sqrt{1+\ln(1+e^x)}}{e^{-x}(1+e^x)} dx &= \int [1+\ln(1+e^x)]^{\frac{1}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} dx \\
 &= \frac{2}{3} [1+\ln(1+e^x)]^{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3} \sqrt{[1+\ln(1+e^x)]^3} + c
 \end{aligned}$$

$$(60) \int \frac{\sqrt{1+\ln(1+e^{-x})}}{(1+e^x)} dx = \int [1+\ln(1+e^{-x})]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+e^x} dx$$

$$= - \int [1+\ln(1+e^{-x})]^{\frac{1}{2}} \frac{-e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \quad \text{بضرب البسط والمقام في } e^{-x}$$

$$= -\frac{2}{3} [1+\ln(e^{-x}+1)]^{\frac{3}{2}} + c = -\frac{2}{3} \sqrt{(1+\ln[e^{-x}+1])^3} + c$$

$$\begin{aligned}
 (61) \int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(x+1)} dx &= -\int [\ln(1+x) - \ln x] \frac{-1}{x(x+1)} dx \\
 &= -\frac{1}{2} [\ln(1+x) - \ln x]^2 + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (62) \int \sqrt{\frac{\cos^{-1} 3x}{1-9x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1-9x^2}} \sqrt{\cos^{-1} 3x} dx \\
 &= -\frac{1}{3} \int \frac{-3}{\sqrt{1-9x^2}} (\cos^{-1} 3x)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{2}{9} (\cos^{-1} 3x)^{\frac{3}{2}} + c \\
 &= -\frac{2}{9} \sqrt{(\cos^{-1} 3x)^3} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (63) \int \sqrt{\frac{\sin^{-1} 2x}{1-4x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}} \sqrt{\sin^{-1} 2x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} (\sin^{-1} 2x)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{3} (\sin^{-1} 2x)^{\frac{3}{2}} + c \\
 &= \frac{1}{3} \sqrt{(\sin^{-1} 2x)^3} + c
 \end{aligned}$$

$$(64) \int \frac{x + \cos^{-1} 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx + \int \frac{\cos^{-1} 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{8} \int -8x(1-4x^2)^{-\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{2} \int \frac{-2}{\sqrt{1-4x^2}} \cos^{-1} 2x dx \\
&= -\frac{1}{4} (1-4x^2)^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{4} (\cos^{-1} 2x)^2 + c = -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} - \frac{1}{4} (\cos^{-1} 2x)^2 + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(65) \int \frac{3^x - 1}{9^x - 1} dx &= \int \frac{3^x - 1}{3^{2x} - 1} dx = \int \frac{3^x - 1}{(3^x - 1)(3^x + 1)} dx \\
&= \int \frac{1}{3^x + 1} dx = \int \frac{3^{-x}}{3^{-x} 3^x + 3^{-x}} dx = \int \frac{3^{-x}}{1 + 3^{-x}} dx \\
&= -\frac{1}{\ln 3} \int \frac{3^{-x} \ln 3}{1 + 3^{-x}} dx = -\frac{1}{\ln 3} \ln |1 + 3^{-x}| + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(66) \int \frac{1}{\ln 2^x - 1} dx &= \int \frac{1}{x \ln 2 - 1} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln 2}{x \ln 2 - 1} dx \\
&= \frac{1}{\ln 2} \ln |x \ln 2 - 1| + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(67) \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})} dx &= \int \frac{\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}}{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})} dx \\
&= \ln |\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})| + c
\end{aligned}$$

$$(68) \int x^x [x^x + x^x \ln x] dx$$

لا حظ أن الدالة $y = x^x$ يمكن أن نفاضلها كالتالي :-

$$(1) y = x^x$$

$$(a) \ln y = \ln x^x$$

$$(b) \ln y = x \ln x$$

$$(c) \frac{1}{y} y' = x \frac{1}{x} + \ln x \Rightarrow \frac{1}{y} y' = 1 + \ln x$$

$$(d) y' = y + y \ln x$$

$$(e) y' = x^x + x^x \ln x$$

$$\int x^x [x^x + x^x \ln x] dx = \frac{1}{2} [x^x]^2 + c = \frac{1}{2} x^{2x} + c$$

$$(69) \int (x^{2x} + 1) [x^{2x} + x^{2x} \ln x] dx$$

لا حظ أن الدالة $y = x^{2x} + 1$ يمكن أن نفاضلها كالتالي :-

$$y = e^{\ln x^{2x}} + 1$$

$$y = e^{2x \ln x} + 1$$

$$y' = e^{2x \ln x} (2x \frac{1}{x} + 2 \ln x)$$

$$y' = e^{\ln x^{2x}} (2 + 2 \ln x) = x^{2x} (2 + 2 \ln x)$$

$$y' = 2x^{2x} + 2x^{2x} \ln x$$

$$\frac{1}{2} \int (x^{2x} + 1) [2x^{2x} + 2x^{2x} \ln x] dx = \frac{1}{2} [x^{2x} + 1]^2 + c$$

تعريف التكامل المحدد:-

عملية تجميع لعناصر { أطوال ، مساحات ، حجوم } بطريقة معينة
يقام العالم الألماني ريمان بتوضيح عملية الجمع هذه والتي تعرف
بـ (مجموع ريمان) وأثبت أن هذا المجموع ما هو في الحقيقة إلا
التكامل المحدد .

الرموز العلمية لعملية التكامل المحدد:-

كانت $F'(x)$ مشتقة الدالة $F(x)$ ومتصلة على الفترة $[a,b]$ فإن عملية
التكامل المحدد يرمز لها كالتالي :-

$$\int_a^b F'(x) dx$$

صاحب التكامل المحدد باستخدام النظرية الأساسية للتكامل :-

كانت $F'(x)$ مشتقة الدالة $F(x)$ ومتصلة على الفترة $[a,b]$ فإن :-

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad , \quad f(x) = F'(x)$$

$$\text{EX : } \int_1^2 2x dx = x^2 \Big|_1^2 = (2)^2 - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

توضيح لمفهوم التكامل المحدد :-

سبق أن ذكرنا أن التكامل المحدد يستخدم لحساب الأطوال و المساحات والحجوم والآن سوف نوضح كيف أن التكامل المحدد يستخدم لإيجاد المساحات .


$$\int_0^2 x \, dx$$

$$f(x)=x \quad , \quad x \in [0,2]$$

أولاً نعين قيمة التكامل المحدد باستخدام النظرية الأساسية للتكامل :-

$$\int_0^2 x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (2)^2 - \frac{1}{2} (0)^2 = 2$$

ثانياً نعين قيمة التكامل المحدد هندسياً :-



لاحظ من بيان الدالة أن المطلوبة هو المساحة المظللة تحت بيان الدالة وهي عبارة عن مثلث قائم الزاوية طول قاعدته 2 وحدة طولية وارتفاعه 2 وحدة طولية

$$\int_0^2 x \, dx = \frac{1}{2} (2)(2) = 2 \quad \text{وحدة مربعة}$$

نبذة مختصرة عن المتسلسلات

السلسلة هي منظومة من الأعداد مرتبة بطريقة معينة

سلسلة التعبير عن المتسلسلات :-

طريقة السرد :- وهي عبارة عن سرد حدود المتسلسلة كالتالي :-

$$1+2+3+4+\dots\dots\dots$$

$$2+4+6+8+\dots\dots\dots$$

$$1-3+5-7+\dots\dots\dots$$

طريقة $\sum$:-

$\sum$ وهو عبارة عن رمزيكون بديل عن كتابة حدود المتسلسلة

{ويعني مجموع} بحيث يوضع داخل هذا الرمز قانون الحد العام ويعطينا هذا القانون حدود المتسلسلة وبالتالي يمكن تحويل أي متسلسلة في هذه الصورة إلى متسلسلة على صورة حدود (أي بطريقة السرد)

$$\sum_{i=1}^{14} (i+1) = 2+3+4+\dots\dots\dots +15$$

$$i=1$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} i^2 = 1+4+9+16+\dots\dots\dots$$

$$i=1$$

حالات خاصة من المتسلسلات :-

(1) المتسلسلة الحسابية :- هي مجموعة حدود رتبت بحيث يكون الفرق بين أي حد والحد السابق له مباشرة مقداراً ثابتاً يسمى أساس المتسلسلة ويرمز له بالرمز d .

مثال :- بين ما إذا كانت المتسلسلات الآتية حسابية أم لا :

(A) $2+5+8+11+.....$

$$d = 5 - 2 = 3$$

$$d = 8 - 5 = 3$$

المتسلسلة حسابية

(B) $1+4+6+10+.....$

$$d = 4 - 1 = 3$$

$$d = 6 - 4 = 2$$

المتسلسلة ليست حسابية

قانون الحد العام للمتسلسلة الحسابية :-

$$\sum_i^k a_i = \sum_i^k [a_1 + d(i-1)]$$

حيث i رتبة أي حد

d أساس المتسلسلة حيث a_i قانون الحد العام

a_1 قيمة الحد الأول في المتسلسلة

k رتبة الحد الأخير في المتسلسلة أو عدد الحدود المتسلسلة

تستخدم قانون الحد العام للمتسلسلة الحسابية :-

يستخدم لإيجاد قيمة أي حد إذا علم a_1, i, d

يستخدم لإيجاد رتبة أي حد i إذا علم a_1, d, a_i

يستخدم لإيجاد الحد العام لأي متسلسلة حسابية وذلك بأن نعوض بـ a_1, d, a_i في قانون الحد العام

المتسلسلة الهندسية :- هي مجموعة حدود رتبت بحيث يكون حاصل قسمة أي حد على الحد السابق له مباشرة مقداراً ثابتاً يسمى أساس المتسلسلة ويرمز له بالرمز d .

مثال :- بين ما إذا كانت المتسلسلات الآتية هندسية أم لا :

$$(A) 2 + 4 + 8 + \dots$$

$$d = \frac{4}{2} = 2$$

$$d = \frac{8}{4} = 2$$

المتسلسلة هندسية

$$(B) 3 + 9 + 18 + 10 + \dots$$

$$d = \frac{9}{3} = 3$$

$$d = \frac{18}{9} = 2$$

المتسلسلة ليست هندسية

قانون الحد العام للمتسلسلة الهندسية :-

$$\sum_1^k a_i = \sum_1^k a_1 d^{i-1}$$

حيث i رتبة أي حد

d أساس المتسلسلة حيث أي حد

الحد السابق له مباشرة

a_1 قيمة الحد الأول في المتسلسلة

k رتبة الحد الأخير في المتسلسلة أو عدد الحدود المتسلسلة

a_i قانون الحد العام

استخدامات قانون الحد العام للمتسلسلة الهندسية :-

(1) يستخدم لإيجاد قيمة أي حد إذا علم a_1, i, d

(2) يستخدم لإيجاد رتبة أي حد i إذا علم a_1, d, a_i

(3) يستخدم لإيجاد الحد العام لأي متسلسلة هندسية وذلك بأن نعوض بـ

a_1, d, a_i في قانون الحد العام

قوانين المجاميع لمتسلسلات خاصة :-

تستخدم هذه القوانين لإيجاد مجموع حدود المتسلسلات ابتداء من الحد الأول

$i=1$ وكل قانون للجمع يستخدم على حسب نوع المتسلسلة كالتالي :-

$$(1) \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

$$(4) \sum_{i=1}^n a = an$$

ملاحظات:-

(1) في قوانين المجاميع هي عدد الحدود المراد جمعها ابتداء من الحد الأول $i=1$ وانتهاء بـ $i=n$

(2) إذا كان عدد الحدود المراد جمعها تبدأ من $i=m$ حيث $m \neq 1$ فإننا لا نستخدم قوانين المجاميع مباشرة وإنما نستخدم القانون الآتي :-

$$\sum_{i=m}^n A = \sum_{i=1}^n A - \sum_{i=1}^{m-1} A$$

مثال:- أوجد مجموع المتسلسلات :

$$(1) \sum_{i=1}^6 (2i+1) = 3+5+7+9+11+13 = 48$$

$$\text{or } \sum_{i=1}^6 (2i+1) = \sum_{i=1}^6 2i + \sum_{i=1}^6 1 = 2 \sum_{i=1}^6 i + \sum_{i=1}^6 1$$

$$= 2 \sum_{i=1}^6 i + \sum_{i=1}^6 1 = 2 \frac{(6)(6+1)}{2} + 6 = 48, n=6$$

$$(2) \sum_{i=1}^5 i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

$$\text{or } \sum_{i=1}^5 i^2 = \frac{5[2(5)+1](5+1)}{6} = 55, n=5$$

$$(3) \sum_{i=1}^5 (i^2 + 1) = \sum_{i=1}^5 i^2 + \sum_{i=1}^5 1 = \frac{5[2(5)+1](5+1)}{6} + 5 = 60$$

$$(4) \sum_{i=1}^5 (2i^2 + 3i) = 2 \sum_{i=1}^5 i^2 + 3 \sum_{i=1}^5 i$$

$$= 2 \frac{5[2(5)+1](5+1)}{6} + 3 \frac{(5)(5+1)}{2} = 2(55) + 3(15) = 155$$

$$(5) \sum_{i=1}^5 (2i^3 + 3i) = 2 \sum_{i=1}^5 i^3 + 3 \sum_{i=1}^5 i$$

$$= 2 \left[\frac{(5)(5+1)}{2} \right]^2 + 3 \frac{(5)(5+1)}{2} = 2(225) + 3(15) = 495$$

$$(6) \sum_{i=3}^6 (2i+1) = 7+9+11+13 = 40$$

$$\text{or } \sum_{i=3}^6 (2i+1) = \sum_{i=1}^6 (2i+1) - \sum_{i=1}^2 (2i+1)$$

$$\sum_{i=1}^6 (2i+1) = 2 \sum_{i=1}^6 i + \sum_{i=1}^6 1 = 2 \frac{(6)(6+1)}{2} + 6 = 48$$

$$\sum_{i=1}^2 (2i+1) = 2 \sum_{i=1}^2 i + \sum_{i=1}^2 1 = 2 \frac{(2)(2+1)}{2} + 2 = 8$$

$$\sum_{i=3}^6 (2i+1) = 48 - 8 = 40$$

$$(7) \sum_{i=5}^{30} (2i^2 - 2)$$

$$\sum_{i=5}^{30} (2i^2 - 2) = \sum_{i=1}^{30} (2i^2 - 2) - \sum_{i=1}^4 (2i^2 - 2)$$

$$\sum_{i=1}^{30} (2i^2 - 2) = 2 \sum_{i=1}^{30} i^2 - \sum_{i=1}^{30} 2 = 2 \frac{30[2(30)+1](30+1)}{6} - 2(30)$$

$$\sum_{i=1}^{30} (2i^2 - 2) = 18850$$

$$\sum_{i=1}^4 (2i^2 - 2) = \sum_{i=1}^4 2i^2 - \sum_{i=1}^4 2 = 2 \sum_{i=1}^4 i^2 - \sum_{i=1}^4 2$$

$$= 2 \frac{4[2(4)+1](4+1)}{6} - 2(4) = 60 - 8 = 52$$

$$\sum_{i=5}^{30} (2i^2 - 2) = 18850 - 52 = 18798$$

مثال:- عبر عن كل مما يأتي في صورة $\sum$:-

$$(1) 3+5+7+9+11+13$$

(A) نحدد نوع المتسلسلة هل هي حسابية أم هندسية :-

$$d = 5 - 3 = 2$$

$$d = 7 - 5 = 2$$

المتسلسلة حسابية

(B) نعين الحد العام للمتسلسلة الحسابية :-

$$a_1 = 3, d = 2$$

$$a_i = a_1 + d(i-1) \rightarrow a_i = 3 + 2(i-1)$$

$$a_i = 3 + 2i - 2 \rightarrow a_i = 2i + 1$$

(C) نعين رتبة آخر حد أو عدد الحدود :- عدد الحدود = 6

$$k = 6$$

$$\sum_{i=1}^6 a_i = \sum_{i=1}^6 [2i+1]$$

$$(2) 2+4+6+8+\dots\dots\dots +16$$

(A) نحدد نوع المتسلسلة هل هي حسابية أم هندسية :-

$$d = 4 - 2 = 2$$

$$d = 6 - 4 = 2$$

المتسلسلة حسابية

(B) نعين الحد العام للمتسلسلة الحسابية :-

$$a_1 = 2, d = 2$$

$$a_i = a_1 + d(i-1) \rightarrow a_i = 2 + 2(i-1)$$

$$a_i = 2 + 2i - 2 \rightarrow a_i = 2i$$

(C) نعين رتبة آخر حد أو عدد الحدود :- عدد الحدود = 8 $k = 8$

$$\sum_{i=1}^8 a_i = \sum_{i=1}^8 2i$$

$$(3) 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 64$$

(A) نحدد نوع المتسلسلة هل هي حسابية أم هندسية :-

$$d = \frac{2}{1} = 2$$

$$d = \frac{4}{2} = 2$$

المتسلسلة هندسية

(B) نعين الحد العام للمتسلسلة الهندسية :-

$$a_1 = 1, d = 2$$

$$a_i = 2^{i-1}$$

(C) نعين رتبة آخر حد أو عدد الحدود :- عدد الحدود = 7 $k = 7$

$$\sum_{i=1}^7 a_i = \sum_{i=1}^7 (1)2^{i-1} = \sum_{i=1}^7 2^{i-1}$$

$$(4) 1+3+9+27+81$$

(B) نحدد نوع المتسلسلة هل هي حسابية أم هندسية :-

$$d = \frac{3}{1} = 3$$

$$d = \frac{9}{3} = 3$$

متسلسلة هندسية

(C) نعين الحد العام للمتسلسلة الهندسية :-

$$a_1 = 1, d = 3$$

$$a_i = 3^{i-1}$$

(D) نعين رتبة آخر حد أو عدد الحدود :- عدد الحدود = 5

$$\sum_{i=1}^5 a_i = \sum_{i=1}^5 (1)3^{i-1} = \sum_{i=1}^5 3^{i-1}$$


حساب التكامل المحدد باستخدام مجموع ريمان :-

يمكن حساب قيمة التكامل المحدد $\int_a^b f(x) dx$ باستخدام مجموع

ريمان وذلك بأن نقسم المساحة التي تحت منحنى الدالة $f(x)$ إلى

مستطيلات ونقوم بإيجاد مجموع مساحة هذه المستطيلات فيكون هو قيمة

التكامل المحدد .



(1) نعين عرض كل مستطيل وليكن Δx بحيث تكون المستطيلات

متساوية في العرض أي أن $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ حيث n عدد المستطيلات

(2) نعين x_i حيث :-

$$x_i = a + i \Delta x$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, n$$

- (3) نعين طول كل مستطيل وليكن $f(x_i)$ وذلك بأن نعوض بـ x_i التي حصلنا عليها في $f(x)$
- (4) نعين مجموع مساحات المستطيلات S_n وذلك بأن نعوض بـ $f(x_i)$ Δx في القانون الآتي :-

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

- (5) نقوم بإخراج أي عدد وأي n خارج $\sum_{i=1}^n$ ونستخدم قوانين المجاميع
- الآتية للتبسيط :-

$$(1) \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

$$(4) \sum_{i=1}^n 1 = n$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad (6) \text{ نعين نهاية المجموع أي :}$$

مثال :- باستخدام مجموع ريمان أوجد قيمة التكاملات الآتية :-

$$(1) \int_0^3 x dx$$

$$a=0, b=3, f(x)=x$$

$$(A) \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{n} = \frac{3}{n}$$

$$(B) x_i = a + i\Delta x = 0 + i\frac{3}{n} = i\frac{3}{n}$$

$$(C) f(x_i) = f(i\frac{3}{n}) = i\frac{3}{n}$$

$$(D) \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n i\frac{3}{n} \frac{3}{n}$$

$$(E) S_n = \frac{9}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{9}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{9}{2} + \frac{9}{2n}$$

$$(F) \int_0^3 x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{9}{2} + \frac{9}{2n}) = \frac{9}{2} + 0 = \frac{9}{2}$$

$$(2) \int_2^3 (x+1) dx$$

$$a = 2, b = 3, f(x) = x + 1$$

$$(A) \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-2}{n} = \frac{1}{n}$$

$$(B) x_i = a + i \Delta x = 2 + i \frac{1}{n}$$

$$(C) f(x_i) = f(2 + i \frac{1}{n}) = 2 + i \frac{1}{n} + 1 = 3 + i \frac{1}{n}$$

$$(D) \sum_i^n f(x_i) \Delta x = \sum_i^n (3 + i \frac{1}{n}) \frac{1}{n}$$

$$(E) S_n = \sum_{i=1}^n (\frac{3}{n} + i \frac{1}{n^2}) = \sum_{i=1}^n \frac{3}{n} + \sum_{i=1}^n i \frac{1}{n^2} = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n 1 + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i$$

$$= \frac{3}{n} n + \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = 3 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} = \frac{7}{2} + \frac{1}{2n}$$

$$(F) \int_2^3 (x+1) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{7}{2} + \frac{1}{2n}) = \frac{7}{2} + 0 = \frac{7}{2}$$

$$(3) \int_1^3 x^2 dx$$

$$a = 1, b = 3, f(x) = x^2$$

$$(A) \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}$$

$$(B) x_i = a + i \Delta x = 1 + i \frac{2}{n}$$

$$(C) f(x_i) = f(1 + i \frac{2}{n}) = (1 + i \frac{2}{n})^2 = 1 + i \frac{4}{n} + i^2 \frac{4}{n^2}$$

$$(D) \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left(1 + i \frac{4}{n} + i^2 \frac{4}{n^2}\right) \frac{2}{n}$$

$$(E) \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{n} + i \frac{8}{n^2} + i^2 \frac{8}{n^3}\right)$$

$$= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n 1 + \frac{8}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2$$

$$= \frac{2}{n} n + \frac{8}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} + \frac{8}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= 2 + \frac{4n+4}{n} + \frac{8n^2+12n+4}{3n^2}$$

$$= 2 + 4 + \frac{4}{n} + \frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2}$$

$$= 6 + \frac{4}{n} + \frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2}$$

$$(F) \int_1^3 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(6 + \frac{4}{n} + \frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2}\right)$$

$$= 6 + 0 + \frac{8}{3} + 0 + 0 = \frac{26}{3}$$

$$(4) \int_1^2 (x^2 + x) dx$$

$$a=1, b=2, f(x)=x^2+x$$

$$(A) \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{n} = \frac{1}{n}$$

$$(B) x_i = a + i\Delta x = 1 + i\frac{1}{n}$$

$$(C) f(x_i) = f\left(1 + i\frac{1}{n}\right) = \left(1 + i\frac{1}{n}\right)^2 + 1 + i\frac{1}{n}$$

$$= 1 + i\frac{2}{n} + i^2 \frac{1}{n^2} + 1 + i\frac{1}{n} = 2 + i\frac{3}{n} + i^2 \frac{1}{n^2}$$

$$= \frac{2}{n} \sum_i^n 1 + \frac{3}{n^2} \sum_i^n i + \frac{1}{n^3} \sum_i^n i^2$$

$$= \frac{2}{n}n + \frac{3}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} + \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= 2 + \frac{3n+3}{2n} + \frac{2n^2+3n+1}{6n^2}$$

$$= 2 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2n} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}$$

$$= \frac{7}{2} + \frac{3}{2n} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}$$

$$(F) \int_1^2 (x^2 + x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{7}{2} + \frac{3}{2n} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \right)$$

$$= \frac{7}{2} + 0 + \frac{1}{3} + 0 + 0 = \frac{23}{6}$$

$$(5) \int_0^3 x^3 dx$$

$$a=0, b=3, f(x)=x^3$$

$$(A) \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{n} = \frac{3}{n}$$

$$(B) x_i = a + i \Delta x = 0 + i \frac{3}{n} = i \frac{3}{n}$$

$$(C) f(x_i) = f\left(i \frac{3}{n}\right) = \left(i \frac{3}{n}\right)^3 = i^3 \frac{27}{n^3}$$

$$(D) \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left(i^3 \frac{27}{n^3}\right) \frac{3}{n}$$

$$(E) \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n i^3 \frac{81}{n^4}$$

$$= \frac{81}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{81}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

$$= \frac{81}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \frac{81}{n^4} \frac{n^2(n^2+2n+1)}{4}$$

$$= \frac{(81n^2 + 162n + 81)}{4n^2} = \frac{81}{4} + \frac{81}{2n} + \frac{81}{4n^2}$$

$$(F) \int_0^3 x^3 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{81}{4} + \frac{81}{2n} + \frac{81}{4n^2} \right)$$

$$= \frac{81}{4} + 0 + 0 = \frac{81}{4}$$

$$(6) \int_0^3 2 \, dx$$

$$a = 0, b = 3, f(x) = 2$$

$$(A) \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{n} = \frac{3}{n}$$

$$(B) x_i = a + i \Delta x = 0 + i \frac{3}{n} = i \frac{3}{n}$$

$$(C) f(x_i) = f\left(i \frac{3}{n}\right) = 2$$

$$(D) \sum_i^n f(x_i) \Delta x = \sum_i^n 2 \frac{3}{n}$$

$$(E) S_n = \frac{6}{n} \sum_i^n 1 = \frac{6}{n} n = 6$$


$$(F) \int_0^3 2 \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (6) = 6$$

التكامل المحدد لدالة القيمة المطلقة

عند إيجاد التكامل المحدد لدالة القيمة المطلقة يتم إعادة تعريف دالة القيمة المطلقة بأكثر من قاعدة لمعرفة متى تكون سالبة ومتى تكون موجبة وبناء على ذلك نكامل القسم السالب من الدالة لوحده والقسم الموجب لوحده وكل هذا مشروط بحدود التكامل هل تقع في القسم الموجب فقط أو القسم السالب فقط أو تقع في كليهما

$$(1) \int_{-1}^1 |x| dx$$

$$F(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$




$$\int_{-1}^1 |x| dx = \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx$$

$$= -\frac{1}{2}x^2 \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = \left[-\frac{1}{2}(0)^2 + \frac{1}{2}(-1)^2\right] + \left[\frac{1}{2}(1)^2 - \frac{1}{2}(0)^2\right]$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$(2) \int_{-2}^0 |x+1| dx$$

$$F(x) = \begin{cases} x+1 & , x \geq -1 \\ -(x+1) & , x < -1 \end{cases}$$



$$\int_{-2}^0 |x+1| dx = \int_{-2}^{-1} (-x-1) dx + \int_{-1}^0 (x+1) dx$$


$$= \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right) \Big|_{-2}^{-1} + \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right) \Big|_{-1}^0$$

$$= \left[-\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1)\right] - \left[-\frac{1}{2}(-2)^2 + 2\right] + \left[\frac{1}{2}(0)^2 + (0)\right] - \left[\frac{1}{2}(-1)^2 - 1\right]$$

$$= \left[-\frac{1}{2} + 1\right] - [-2 + 2] - \left[\frac{1}{2} - 1\right] = 1$$

$$(3) \int_0^1 |x+2| dx$$

$$F(x) = \begin{cases} x+2 & , x \geq -2 \\ -(x+2) & , x < -2 \end{cases}$$




$$\int_0^1 |x+2| dx = \int_0^1 (x+2) dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_0^1 = \left[\frac{1}{2}(1)^2 + 2(1) \right] - \left[\frac{1}{2}(0)^2 + 2(0) \right] = \frac{5}{2}$$

$$(4) \int_{-2}^{-1} |x+1| dx$$

$$F(x) = \begin{cases} x+1 & , x \geq -1 \\ -(x+1) & , x < -1 \end{cases}$$




$$\int_{-2}^{-1} |x+1| dx = \int_{-2}^{-1} (-x-1) dx$$

$$= \left(-\frac{1}{2}x^2 - x \right) \Big|_{-2}^{-1} = \left[-\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) \right] - \left[-\frac{1}{2}(-2)^2 + 2 \right]$$

$$= \left[-\frac{1}{2} + 1 \right] - \left[-2 + 2 \right] = \frac{1}{2}$$

$$(5) \int_{-2}^1 (|x|+2) dx$$

$$F(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$



$$\int_{-2}^1 (|x|+2) dx = \int_{-2}^0 x dx + \int_{-2}^0 2 dx = \int_{-2}^0 -x dx + \int_0^1 x dx + \int_{-2}^1 2 dx$$


$$= -\frac{1}{2}x^2 \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 + 2x \Big|_{-2}^1$$

$$= \left[-\frac{1}{2}(0)^2 + \frac{1}{2}(-2)^2 \right] + \left[\frac{1}{2}(1)^2 - \frac{1}{2}(0)^2 \right] + [2(1) - 2(-2)]$$

$$= 2 + \frac{1}{2} + 6 = \frac{17}{2}$$

$$(6) \int_{-2}^{-1} (|x+1|+2x) dx$$


$$F(x) = \begin{cases} x+1 & , x \geq -1 \\ -(x+1) & , x < -1 \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 \int_{-2}^{-1} (|x+1|+2x) dx &= \int_{-2}^{-1} |x+1| dx + \int_{-2}^{-1} 2x dx \\
 &= \int_{-2}^{-1} (-x-1) dx + \int_{-2}^{-1} 2x dx \\
 &= \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right) \Big|_{-2}^{-1} + x^2 \Big|_{-2}^{-1} \\
 &= \left[-\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1)\right] - \left[-\frac{1}{2}(-2)^2 + 2\right] + [(-1)^2 - (-2)^2] \\
 &= \left[-\frac{1}{2} + 1\right] - [-2 + 2] - 3 = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

$$(7) \int_{-3}^1 x|x+2| dx$$


$$F(x) = \begin{cases} x+2, & x \geq -2 \\ -(x+2), & x < -2 \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 \int_{-3}^1 x|x+2| dx &= \int_{-3}^{-2} -x(x+2) dx + \int_{-2}^1 x(x+2) dx \\
 &= \int_{-3}^{-2} (-x^2 - 2x) dx + \int_{-2}^1 (x^2 + 2x) dx = \left(-\frac{1}{3}x^3 - x^2\right) \Big|_{-3}^{-2} + \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2\right) \Big|_{-2}^1 = -\frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

$$(8) \int_{-2}^3 |x^2 - 1| dx$$

$$F(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & , x \geq 1 \text{ or } x < -1 \\ -(x^2 - 1) & , -1 \leq x < 1 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \int_{-2}^3 |x^2 - 1| dx &= \int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^1 -(x^2 - 1) dx + \int_1^3 (x^2 - 1) dx \\ &= \left(\frac{1}{3}x^3 - x \right) \Big|_{-2}^{-1} + \left(-\frac{1}{3}x^3 + x \right) \Big|_{-1}^1 + \left(\frac{1}{3}x^3 - x \right) \Big|_1^3 \approx 9.33 \end{aligned}$$

نتائج هامة

$$(1) \frac{d}{dx} \int F'(x) dx = F'(x)$$

$$D_x \int F'(x) dx = F'(x)$$

EX:

$$(A) \frac{d}{dx} \int (3x+1) dx = 3x+1$$

$$(B) D_x \int (x^2 + x) dx = x^2 + x$$

$$(2) \int \frac{d}{dx} F'(x) dx = F'(x) + c$$

$$\int D_x F'(x) dx = F'(x) + c$$

EX:

$$(A) \int \frac{d}{dx} (3x+1) dx = 3x+1+c$$

$$(B) \int D_x (x^2 + x) dx = x^2 + x + c$$

$$(3) \int_a^b \frac{d}{dx} F'(x) dx = F'(x) \Big|_a^b = F'(b) - F'(a)$$

$$\int_a^b D_x F'(x) dx = F'(x) \Big|_a^b = F'(b) - F'(a)$$

EX:

$$(A) \int_1^2 \frac{d}{dx} (x+1) dx = (x+1) \Big|_1^2 = (2+1) - (1+1) = 1$$

$$(B) \int_0^2 D_x (x^2 + 2) dx = (x^2 + 2) \Big|_0^2 = (4+2) - (0+2) = 4$$

$$(4) \frac{d}{dx} \int_{k(x)}^{h(x)} F(t) dt = F[h(x)] h'(x) - F[k(x)] k'(x)$$

$$D_x \int_{k(x)}^{h(x)} F(t) dt = F[h(x)] h'(x) - F[k(x)] k'(x)$$

EX:

$$(A) \frac{d}{dx} \int_2^x \frac{dt}{t^2+1}$$

$$F(t) = \frac{1}{t^2+1}$$

$$k(x) = x^2, \quad k'(x) = 2x$$

$$h(x) = x^3, \quad h'(x) = 3x^2$$

$$\frac{d}{dx} \int_2^x \frac{dt}{t^2+1} = F[x^3] 3x^2 - F[x^2] 2x$$

$$\frac{d}{dx} \int_2^x \frac{dt}{t^2+1} = \frac{3x^2}{x^6+1} - \frac{2x}{x^4+1}$$

$$(B) \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$F(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$k(x) = 0, \quad k'(x) = 0$$

$$h(x) = x, \quad h'(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = F[x](1) - F0 = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

نظرية القيمة المتوسطة

$F(X)$ دالة مستمرة على الفترة المغلقة $[a,b]$ فإن هناك على

c في الفترة المفتوحة (a,b) بحيث يحقق هذا العدد :

$$F(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b F(x) dx$$

مثال :- أوجد قيم c التي تحقق نظرية القيمة المتوسطة للتكامل المحدد:

$$(1) F(x) = x^2, x \in [1,2]$$

$$a = 1, b = 2$$

$$F(c) = c^2$$

$$c^2 = \frac{1}{2-1} \int_1^2 x^2 dx$$

$$c^2 = \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^2$$

$$c^2 = \frac{1}{3}(2)^3 - \frac{1}{3}(1)^3$$

$$c^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} \Rightarrow c^2 = \frac{7}{3}$$

$$c = \sqrt{\frac{7}{3}} \in (1,2)$$

$$c = -\sqrt{\frac{7}{3}} \notin (1,2)$$

$$2) F(x) = 2x - 3, x \in [1, 4]$$

$$a = 1, b = 4$$

$$F(c) = 2c - 3$$

$$2c - 3 = \frac{1}{4-1} \int_1^4 (2x-3) dx$$

$$2c - 3 = \left(\frac{1}{3}x^2 - x \right) \Big|_1^4$$

$$2c - 3 = \left[\frac{1}{3}(4)^2 - 4 \right] - \left[\frac{1}{3}(1)^2 - 1 \right]$$

$$2c - 3 = 2 \therefore c = \frac{5}{2}$$

$$c = \frac{5}{2} \in (1, 4)$$

$$3) F(x) = x(3-x), x \in [0, 3]$$

$$a = 0, b = 3$$

$$F(c) = c(3-c) = 3c - c^2$$

$$3c - c^2 = \frac{1}{3-0} \int_0^3 (3x-x^2) dx$$

$$3c - c^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^3$$

$$3c - c^2 = \frac{1}{3} \left[\frac{3}{2}(3)^2 - \frac{1}{3}(3)^3 \right] - \frac{1}{3} \left[\frac{3}{2}(0)^2 - \frac{1}{3}(0)^3 \right]$$

$$3c - c^2 = \frac{3}{2} \rightarrow 2c^2 - 6c + 3 = 0$$

$$a = 2, b = -6, c = 3$$

$$c = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 24}}{4} = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{4}$$

$$c = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$c = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \in [0, 3]$$

$$c = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \in (0, 3)$$

$$(4) F(x) = \frac{1}{x}, x \in [1, e]$$

$$a = 1, b = e$$

$$F(c) = \frac{1}{c}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{e-1} \int_1^e \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{e-1} (\ln |x|) \Big|_1^e$$

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{e-1} [\ln e - \ln 1] \Rightarrow \frac{1}{c} = \frac{1}{e-1} [1 - 0]$$

$$\therefore c = e - 1$$

$$c = e - 1 \in (1, e)$$

قوانين تكامل الدوال المثلثية

- (1) $\int \sin F(x) F'(x) dx = -\cos F(x) + c$
- (2) $\int \cos F(x) F'(x) dx = \sin F(x) + c$
- (3) $\int \tan F(x) F'(x) dx = \ln|\sec F(x)| + c$
- (4) $\int \cot F(x) F'(x) dx = \ln|\sin F(x)| + c$
- (5) $\int \sec F(x) F'(x) dx = \ln|\sec F(x) + \tan F(x)| + c$
- (6) $\int \csc F(x) F'(x) dx = \ln|\csc F(x) - \cot F(x)| + c \checkmark$
or $= -\ln|\csc F(x) + \cot F(x)| + c$
- (7) $\int \sec F(x) \tan F(x) F'(x) dx = \sec F(x) + c$
- (8) $\int \csc F(x) \cot F(x) F'(x) dx = -\csc F(x) + c$
- (9) $\int \csc^2 F(x) F'(x) dx = -\cot F(x) + c$
- (10) $\int \sec^2 F(x) F'(x) dx = \tan F(x) + c$

قوانين حساب المثلثات (المتطابقات)

$$(1) \sin^2 ax + \cos^2 ax = 1$$

$$(2) \sec^2 ax = 1 + \tan^2 ax$$

$$(3) \csc^2 ax = 1 + \cot^2 ax$$

$$(4) \sin^2 ax = \frac{1}{2}(1 - \cos 2ax)$$

$$(5) \cos^2 ax = \frac{1}{2}(1 + \cos 2ax)$$

$$(6) \sin 2ax = 2 \sin ax \cos ax$$

$$(7) \cos 2ax = \cos^2 ax - \sin^2 ax$$

$$(8) \sin ax = \frac{1}{\csc ax}$$

$$(9) \cos ax = \frac{1}{\sec ax}$$

$$(10) \tan ax = \frac{1}{\cot ax}$$

$$(11) \cot ax = \frac{\cos ax}{\sin ax}$$

$$(12) \tan ax = \frac{\sin ax}{\cos ax}$$

$$(13) \sin ax \cos bx = \frac{1}{2}[\sin(ax+bx) + \sin(ax-bx)]$$

$$(14) \cos ax \cos bx = \frac{1}{2}[\cos(ax+bx) + \cos(ax-bx)]$$

$$(15) \sin ax \sin bx = \frac{1}{2}[\cos(ax-bx) - \cos(ax+bx)]$$

$$(16) \sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$(17) \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

مسائل متنوعة على التكامل

- 1) $\int \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \int 2 \sin 2x \, dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + c$
- 2) $\int \cos \frac{2}{3}x \, dx = \frac{3}{2} \int \frac{2}{3} \cos \frac{2}{3}x \, dx = \frac{3}{2} \sin \frac{2}{3}x + c$
- 3) $\int \tan \frac{1}{3}x \, dx = 3 \int \frac{1}{3} \tan \frac{1}{3}x \, dx = 3 \ln \left| \sec \frac{1}{3}x \right| + c$
- 4) $\int x \tan x^2 \sec x^2 \, dx = \frac{1}{2} \int 2x \tan x^2 \sec x^2 \, dx = \frac{1}{2} \sec x^2 + c$
- 5) $\int 3^{2x} \cot 3^{2x} \csc 3^{2x} \, dx = \frac{1}{2 \ln 3} \int 3^{2x} 2(\ln 3) \cot 3^{2x} \csc 3^{2x} \, dx$
 $= -\frac{1}{2 \ln 3} \csc 3^{2x} + c$
- 6) $\int \frac{\sec \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx = 2 \int \sec(\sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}} \, dx = 2 \ln |\sec \sqrt{x} + \tan \sqrt{x}| + c$
- 7) $\int e^{3x} \csc^2 e^{3x} \, dx = \frac{1}{3} \int 3e^{3x} \csc^2 e^{3x} \, dx = -\frac{1}{3} \cot e^{3x} + c$
- 8) $\int e^x \sec^2 e^x \, dx = \tan e^x + c$

$$\begin{aligned}
 (9) \int \frac{\sec 5x \tan 5x}{\sqrt{3 + \sec 5x}} dx &= \frac{1}{5} \int 5(\sec 5x \tan 5x)(3 + \sec 5x)^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= \frac{2}{5} (3 + \sec 5x)^{\frac{1}{2}} + c = \frac{2}{5} \sqrt{3 + \sec 5x} + c
 \end{aligned}$$

$$(10) \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx = \ln |\sec x + \tan x| + c$$

$$\begin{aligned}
 (11) \int \frac{\cos 2x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx &= \frac{1}{2} \int 2(\cos 2x)(1 + \sin 2x)^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{1 + \sin 2x} + c
 \end{aligned}$$

$$(12) \int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x + c$$

$$\begin{aligned}
 (13) \int \sin 2x \cos^3 2x dx &= -\frac{1}{2} \int -2 \sin 2x (\cos 2x)^3 dx \\
 &= -\frac{1}{8} \cos^4 2x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (14) \int \frac{\sin t}{\sqrt{\cos t}} dt &= -\int -\sin t (\cos t)^{-\frac{1}{2}} dt = -2(\cos t)^{\frac{1}{2}} + c \\
 &= -2\sqrt{\cos t} + c
 \end{aligned}$$

$$(5) \int \sqrt{x} \sin x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{3}{2} \sqrt{x} \sin x^{\frac{3}{2}} dx = -\frac{2}{3} \cos x^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(16) \int \frac{1}{t^2} \sin \frac{1}{t} dt = - \int -t^{-2} \sin t^{-1} dt = \cos t^{-1} + c$$

$$(17) \int e^{\cos t} \sin t dt = - \int -e^{\cos t} \sin t dt = -e^{\cos t} + c$$

$$(18) \int \cot 2x \csc^2 2x dx = -\frac{1}{2} \int -2 \cot 2x \csc^2 2x dx \\ = -\frac{1}{4} \cot^2 2x + c$$

$$(19) \int \cot^4 3x \csc^2 3x dx = -\frac{1}{3} \int -3 \cot^4 3x \csc^2 3x dx \\ = -\frac{1}{15} \cot^5 3x + c$$

$$(20) \int \tan 5x \sec^2 5x dx = \frac{1}{5} \int 5 \tan 5x \sec^2 5x dx \\ = \frac{1}{10} \tan^2 5x + c$$

$$(21) \int \tan^4 3x \sec^2 3x dx = \frac{1}{3} \int 3 \tan^4 3x \sec^2 3x dx \\ = \frac{1}{15} \tan^5 3x + c$$

$$(22) \int \frac{e^x}{\cos^2 e^x} dx = \int e^x \sec^2 e^x dx = \tan e^x + c$$

$$(23) \int \frac{x}{\sin^2 x^2} dx = \frac{1}{2} \int 2x \csc^2 x^2 dx = -\frac{1}{2} \cot x^2 + c$$

$$(24) \int \frac{x \cos x + 2 \cos x}{x+2} dx = \int \frac{\cos x (x+2)}{x+2} dx \\ = \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$(25) \int \cos x \sec x dx = \int \cos x \frac{1}{\cos x} dx \\ = \int dx = x + c$$

$$(26) \int \sin x \sec x dx = \int \sin x \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ = \int \tan x dx = \ln |\sec x| + c$$

$$(27) \int \frac{\cot x \csc x}{1 + \csc x} dx = - \int \frac{\cot x \csc x}{1 + \csc x} dx = -\ln |1 + \csc x| + c$$

$$(28) \int \frac{1}{x} \sin(\ln x) dx = -\cos(\ln x) + c$$

$$(29) \int \frac{\sin 2x}{2 + \cos 2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{-2 \sin 2x}{2 + \cos 2x} dx = -\frac{1}{2} \ln |2 + \cos 2x| + c$$

$$(30) \int \sec^2 2x \tan^6 2x \, dx = \frac{1}{2} \int 2 \sec^2 2x \tan^6 2x \, dx \\ = \frac{1}{14} \tan^7 2x + c$$

$$(31) \int (1 + \cos 8x)^3 \sin 8x \, dx = -\frac{1}{8} \int -8(1 + \cos 8x)^3 \sin 8x \, dx \\ = -\frac{1}{32} (1 + \cos 8x)^4 + c$$

$$(32) \int \sqrt{1 + \sin 2x} \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{2}} 2 \cos 2x \, dx \\ = \frac{1}{3} (1 + \sin 2x)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(33) \int \frac{\tan x}{\ln(\cos x)} \, dx = - \int \frac{-\tan x}{\ln(\cos x)} \, dx = -\ln|\ln(\cos x)| + c$$

$$(34) \int \frac{\cot x}{\ln(\sin x)} \, dx = \ln|\ln(\sin x)| + c$$

$$(35) \int \frac{\tan x}{\cos^2 x} \, dx = \int \tan x \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \int \tan x \sec^2 x \, dx = \\ = \frac{1}{2} \tan^2 x + c$$

$$(36) \int \frac{\cot x}{\sin^2 x} \, dx = \int \cot x \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = - \int -\cot x \csc^2 x \, dx \\ = -\frac{1}{2} \cot^2 x + c$$

$$(37) \int \frac{\sec x}{\tan x} dx = \int \sec x \frac{1}{\tan x} dx = \int \frac{1}{\cos x} \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ = \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + c$$

$$(38) \int \frac{\csc x}{\cot x} dx = \int \csc x \frac{1}{\cot x} dx = \int \frac{1}{\sin x} \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ = \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + c$$

$$(39) \int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \sin^{-1} x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} (\sin^{-1} x)^2 + c$$

$$(40) \int \frac{\cos^{-1} 3x}{\sqrt{1-9x^2}} dx = -\frac{1}{3} \int \cos^{-1} 3x \frac{-3}{\sqrt{1-9x^2}} dx \\ = -\frac{1}{6} (\cos^{-1} 3x)^2 + c$$

$$(41) \int \frac{(\tan^{-1} 2x)^3}{1+4x^2} dx = \frac{1}{2} \int (\tan^{-1} 2x)^3 \frac{2}{1+4x^2} dx = \frac{1}{8} (\tan^{-1} 2x)^4 + c$$

$$(42) \int \frac{\sin 2x}{\cos^5 2x} dx = \int \sin 2x (\cos 2x)^{-5} dx \\ = -\frac{1}{2} \int -2 \sin 2x (\cos 2x)^{-5} dx = \frac{1}{8} (\cos 2x)^{-4} + c \\ = \frac{1}{8 \cos^4 2x} + c$$

$$(43) \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} e^{\sec x} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \frac{1}{\cos x} e^{\sec x} dx$$

$$= \int \tan x \sec x e^{\sec x} dx = e^{\sec x} + c$$

$$(44) \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} 2^{\csc x} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \frac{1}{\sin x} 2^{\csc x} dx$$

$$= - \int -\cot x \csc x 2^{\csc x} dx = -\frac{1}{\ln 2} 2^{\csc x} + c$$

$$(45) \int \sec^4 x \tan x dx = \int \sec^3 x \sec x \tan x dx$$

$$= \frac{1}{4} \sec^4 x + c$$

$$(46) \int \csc^5 x \cot x dx = - \int -\csc^4 x \csc x \cot x dx$$

$$= -\frac{1}{5} \csc^5 x + c$$

$$(47) \int \frac{2^{\tan^{-1} 2x}}{1+4x^2} dx = \int 2^{\tan^{-1} 2x} \frac{1}{1+4x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int 2^{\tan^{-1} 2x} \frac{2}{1+4x^2} dx = \frac{1}{2 \ln 2} 2^{\tan^{-1} 2x} + c$$

$$\begin{aligned}
 (48) \int \sqrt[5]{\tan 2x} \sec^2 2x \, dx &= \frac{1}{2} \int (\tan 2x)^{\frac{1}{5}} 2 \sec^2 2x \, dx \\
 &= \frac{5}{12} (\tan 2x)^{\frac{6}{5}} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (49) \int \cot 8x \sqrt{\ln(\sin 8x)} \, dx &= \frac{1}{8} \int 8 \cot 8x (\ln(\sin 8x))^{\frac{1}{2}} \, dx \\
 &= \frac{1}{12} [\ln(\sin 8x)]^{\frac{3}{2}} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (50) \int \sec^2 4x \sin 4x \, dx &= \int \frac{1}{\cos^2 4x} \sin 4x \, dx \\
 &= -\frac{1}{4} \int -4(\cos 4x)^{-2} \sin 4x \, dx = \frac{1}{4} (\cos 4x)^{-1} + c \\
 &= \frac{1}{4 \cos 4x} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (51) \int \tan 3x \sqrt[3]{\ln(\cos 3x)} \, dx &= -\frac{1}{3} \int -3 \tan 3x (\ln(\cos 3x))^{\frac{1}{3}} \, dx \\
 &= -\frac{1}{4} [\ln(\cos 3x)]^{\frac{4}{3}} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (52) \int \frac{5^{\cot 3x}}{\sin^2 3x} \, dx &= \int 5^{\cot 3x} \csc^2 3x \, dx = -\frac{1}{3} \int 5^{\cot 3x} (-3 \csc^2 3x) \, dx \\
 &= -\frac{5^{\cot 3x}}{3 \ln 5}
 \end{aligned}$$

$$(52) \int 3^{3 \tan 2t} \sec^2 2t \, dt = \frac{1}{6} \int 3^{3 \tan 2t} 6 \sec^2 2t \, dt = \frac{3^{3 \tan 2t}}{6 \ln 3} + c$$

$$(53) \int \frac{x^2}{\tan x^3} \, dx = \int x^2 \cot x^3 \, dx = \frac{1}{3} \int 3x^2 \cot x^3 \, dx = \frac{1}{3} \ln |\sin x^3| + c$$

$$(54) \int \frac{-dx}{(1+\frac{x^2}{4})(\cot^{-1} \frac{x}{2})} = 2 \int \frac{\frac{-1/2}{(1+\frac{x^2}{4})}}{(\cot^{-1} \frac{x}{2})} \, dx = 2 \ln(\cot^{-1} \frac{x}{2}) + c$$

$$(55) \int \frac{dx}{(1+\frac{x^2}{16})(\tan^{-1} \frac{x}{4})} = 4 \int \frac{\frac{1/4}{(1+\frac{x^2}{16})}}{(\tan^{-1} \frac{x}{4})} \, dx = 4 \ln(\tan^{-1} \frac{x}{4}) + c$$

$$(56) \int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2} (\sin^{-1} 2x)} = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}}{(\sin^{-1} 2x)} \, dx = \frac{1}{2} \ln(\sin^{-1} 2x) + c$$

$$\begin{aligned}
 (57) \int \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2} (\cos^{-1} 3x)} &= -\frac{1}{3} \int \frac{\frac{-3}{\sqrt{1-9x^2}}}{(\cos^{-1} 3x)} dx \\
 &= -\frac{1}{3} \ln(\cos^{-1} 3x) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (58) \int \frac{1+\cos 2x}{\sin^2 2x} dx &= \int \frac{1}{\sin^2 2x} dx + \int \frac{\cos 2x}{\sin^2 2x} dx \\
 &= \int \csc^2 2x dx + \int \frac{\cos 2x}{\sin 2x} \cdot \frac{1}{\sin 2x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int 2 \csc^2 2x dx + \frac{1}{2} \int 2 \cot 2x \csc 2x dx \\
 &= -\frac{1}{2} \cot 2x - \frac{1}{2} \csc 2x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (59) \int \frac{1+\sin 2x}{\cos^2 2x} dx &= \int \frac{1}{\cos^2 2x} dx + \int \frac{\sin 2x}{\cos^2 2x} dx \\
 &= \int \sec^2 2x dx + \int \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int 2 \sec^2 2x dx + \frac{1}{2} \int 2 \tan 2x \sec 2x dx \\
 &= \frac{1}{2} \tan 2x + \frac{1}{2} \sec 2x + c
 \end{aligned}$$

$$50) \int \frac{\cot 4x}{\sqrt{1+\ln \sin 4x}} dx = \frac{1}{4} \int 4(\cot 4x)(1+\ln(\sin 4x))^{-\frac{1}{2}} dx \\ = \frac{2}{4}(1+\ln(\sin 4x))^{\frac{1}{2}} + c = \frac{1}{2}\sqrt{1+\ln(\sin 4x)} + c$$

$$61) \int \frac{\tan 2x}{\sqrt{1+\ln \cos 2x}} dx = -\frac{1}{2} \int -2(\tan 2x)(1+\ln(\cos 2x))^{-\frac{1}{2}} dx \\ = -(1+\ln(\cos 2x))^{\frac{1}{2}} + c = -\sqrt{1+\ln(\cos 2x)} + c$$

$$62) \int \frac{\sec x \sin x}{\cos x} dx = \int \sec x \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \sec x \tan x dx = \sec x + c$$

$$63) \int e^{\sin t} \sin t \cot t dt = \int e^{\sin t} \sin t \frac{\cos t}{\sin t} dt = \int e^{\sin t} \cos t dt \\ = e^{\sin t} + c$$

$$(64) \int e^{\csc x} \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = \int e^{\csc x} \frac{\cos x}{\sin x} \frac{1}{\sin x} dx \\ = -\int e^{\csc x} \cot x \csc x dx = -e^{\csc x} + c$$

$$(65) \int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos x} dx = \int \frac{1}{\cos x} dx - \int \frac{\cos^2 x}{\cos x} dx \\ = \int \sec x dx - \int \cos x dx = \ln|\sec x + \tan x| - \sin x + c$$

$$\begin{aligned}
 (66) \int \frac{e^x \sec^2 e^x}{\tan^2 e^x} dx &= \int \frac{e^x (1 + \tan^2 e^x)}{\tan^2 e^x} dx = \int \frac{e^x + e^x \tan^2 e^x}{\tan^2 e^x} dx \\
 &= \int \frac{e^x}{\tan^2 e^x} dx + \int \frac{e^x \tan^2 e^x}{\tan^2 e^x} dx = \int e^x \cot^2 e^x dx + \int e^x dx \\
 &= \int (e^x \csc^2 e^x - e^x) dx + \int e^x dx = \int e^x \csc^2 e^x dx \\
 &= -\cot e^x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (67) \int \frac{\sec 2x \tan 2x}{(1 + \sec 2x)^{\frac{3}{2}}} dx &= \frac{1}{2} \int 2(\sec 2x \tan 2x)(1 + \sec 2x)^{-\frac{3}{2}} dx \\
 &= -(1 + \sec 2x)^{-\frac{1}{2}} + c = \frac{-1}{\sqrt{1 + \sec 2x}} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (68) \int \frac{(1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}}}{\sec x \csc x} dx &= \int (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sec x \csc x} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}} 2 \cos x \sin x dx = \frac{1}{3} (1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}} + c
 \end{aligned}$$

$$(69) \int \sin \pi dx = x \sin \pi + c$$

$$(70) \int (\sin^2 x + \cos^2 x) dx = \int dx = x + c$$

$$(71) \int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx = \int \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\ = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + c$$

$$(72) \int \cos^2 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) \, dx = \int \frac{1}{2} dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx \\ = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}\sin 4x + c$$

$$(73) \int \sin^4 x \, dx = \int (\sin^2 x)^2 \, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 dx \\ = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x\right)^2 dx = \int \frac{1}{4} dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x \, dx \\ = \int \frac{1}{4} dx - \frac{1}{4} \int 2\cos 2x \, dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{2} (1 + \cos 4x) dx \\ = \int \frac{1}{4} dx - \frac{1}{4} \int 2\cos 2x \, dx + \int \frac{1}{8} dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx \\ = \int \frac{1}{4} dx - \frac{1}{4} \int 2\cos 2x \, dx + \int \frac{1}{8} dx + \frac{1}{32} \int 4\cos 4x \, dx \\ = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{32}\sin 4x + c \\ = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c$$

$$\begin{aligned}
 (74) \int \cos^4 x dx &= \int (\cos^2 x)^2 dx = \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 dx \\
 &= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x\right)^2 dx = \int \frac{1}{4} dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx \\
 &= \int \frac{1}{4} dx + \frac{1}{4} \int 2\cos 2x dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{2}(1+\cos 4x) dx \\
 &= \int \frac{1}{4} dx + \frac{1}{4} \int 2\cos 2x dx + \int \frac{1}{8} dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x dx \\
 &= \int \frac{1}{4} dx + \frac{1}{4} \int 2\cos 2x dx + \int \frac{1}{8} dx + \frac{1}{32} \int 4\cos 4x dx \\
 &= \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{32}\sin 4x + c \\
 &= \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (75) \int \cos^2 x \sin^2 x dx &= \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right) dx \\
 &= \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos^2 2x\right) dx = \int \frac{1}{4} dx - \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx \\
 &= \int \frac{1}{4} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{2}(1+\cos 4x) dx \\
 &= \int \frac{1}{4} dx - \int \frac{1}{8} dx - \frac{1}{8} \int \cos 4x dx \\
 &= \int \frac{1}{4} dx - \int \frac{1}{8} dx - \frac{1}{32} \int 4\cos 4x dx \\
 &= \frac{1}{4}x - \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + c \\
 &= \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (76) \int \sin^3 x dx &= \int \sin^2 x \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx \\
 &= \int \sin x dx - \int \cos^2 x \sin x dx = \int \sin x dx + \int -(\cos x)^2 \sin x dx \\
 &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (77) \int \cos^3 x dx &= \int \cos^2 x \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx \\
 &= \int \cos x dx - \int \sin^2 x \cos x dx = \int \cos x dx - \int (\sin x)^2 \cos x dx \\
 &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (78) \int \sin^3 3x dx &= \int \sin^2 3x \sin 3x dx = \int (1 - \cos^2 3x) \sin 3x dx \\
 &= \int \sin 3x dx - \int \cos^2 3x \sin 3x dx \\
 &= \frac{1}{3} \int 3 \sin 3x dx + \frac{1}{3} \int -3(\cos 3x)^2 \sin 3x dx \\
 &= -\frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{9} \cos^3 3x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (79) \int \cos^3 2x dx &= \int \cos^2 2x \cos 2x dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x dx \\
 &= \int \cos 2x dx - \int \sin^2 2x \cos 2x dx \\
 &= \frac{1}{2} \int 2 \cos 2x dx - \frac{1}{2} \int 2(\sin 2x)^2 \cos 2x dx \\
 &= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin^3 2x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(80) \int \cos^2 x \sin^4 x \, dx &= \int \cos^2 x \sin^2 x \sin^2 x \, dx \\
&= \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right) dx \\
&= \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos^2 2x\right) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x\right) dx \\
&= \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{1}{8} \cos 2x dx - \frac{1}{8} \int \cos^2 2x dx + \frac{1}{8} \int \cos^3 2x dx \\
&= \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{1}{8} \cos 2x dx - \frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x\right) dx + \frac{1}{8} \int \cos^3 2x dx \\
&= \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{1}{8} \cos 2x dx - \int \frac{1}{16} dx + \int \frac{1}{16} \cos 2x dx + \frac{1}{8} \int \cos^3 2x dx \\
&= \int \frac{1}{16} dx - \frac{1}{16} \int \cos 2x dx + \frac{1}{8} \int \cos^2 2x \cos 2x dx \\
&= \int \frac{1}{16} dx - \frac{1}{16} \int \cos 2x dx + \frac{1}{8} \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x dx \\
&= \int \frac{1}{16} dx - \frac{1}{16} \int \cos 2x dx + \int \frac{1}{8} \cos 2x dx - \frac{1}{8} \int (\sin 2x)^2 \cos 2x dx \\
&= \int \frac{1}{16} dx + \frac{1}{16} \int \cos 2x dx - \frac{1}{8} \int (\sin 2x)^2 \cos 2x dx \\
&= \int \frac{1}{16} dx + \frac{1}{32} \int 2 \cos 2x dx - \frac{1}{16} \int 2 (\sin 2x)^2 \cos 2x dx \\
&= \frac{1}{16} x + \frac{1}{32} \sin 2x - \frac{1}{48} (\sin 2x)^3 + c
\end{aligned}$$

$$(81) \int \tan^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \int \sec^2 x \, dx - \int dx \\ = \tan x - x + c$$

$$(82) \int \tan^3 x \, dx = \int \tan^2 x \tan x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \tan x \, dx \\ = \int \sec^2 x \tan x \, dx - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\sec x| + c$$

$$(83) \int \tan^4 x \, dx = \int \tan^2 x \tan^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \tan^2 x \, dx \\ = \int \sec^2 x \tan^2 x \, dx - \int \tan^2 x \, dx \\ = \int \sec^2 x (\tan x)^2 \, dx - \int (\sec^2 x - 1) \, dx \\ = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + c$$

$$(84) \int \cot^2 x \, dx = \int (\csc^2 x - 1) \, dx = \int \csc^2 x \, dx - \int dx \\ = -\cot x - x + c$$

$$(85) \int \cot^3 x \, dx = \int \cot^2 x \cot x \, dx = \int (\csc^2 x - 1) \cot x \, dx \\ = - \int -\csc^2 x \cot x \, dx - \int \cot x \, dx = -\frac{1}{2} \cot^2 x - \ln|\sin x| + c$$

$$\begin{aligned}
 (86) \int \cot^4 x \, dx &= \int \cot^2 x \cot^2 x \, dx = \int (\csc^2 x - 1) \cot^2 x \, dx \\
 &= \int \csc^2 x \cot^2 x \, dx - \int \cot^2 x \, dx \\
 &= \int \csc^2 x (\cot x)^2 \, dx - \int (\csc^2 x - 1) \, dx \\
 &= -\int -\csc^2 x (\cot x)^2 \, dx - \int \csc^2 x \, dx + \int dx \\
 &= -\frac{1}{3} \cot^3 x + \cot x + x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (87) \int \sec^4 x \, dx &= \int \sec^2 x \sec^2 x \, dx = \int (\tan^2 x + 1) \sec^2 x \, dx \\
 &= \int \sec^2 x \tan^2 x \, dx + \int \sec^2 x \, dx \\
 &= \int \sec^2 x (\tan x)^2 \, dx + \int \sec^2 x \, dx \\
 &= \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (88) \int \csc^4 x \, dx &= \int \csc^2 x \csc^2 x \, dx = \int (\cot^2 x + 1) \csc^2 x \, dx \\
 &= \int \csc^2 x \cot^2 x \, dx + \int \csc^2 x \, dx \\
 &= \int \csc^2 x (\cot x)^2 \, dx + \int \csc^2 x \, dx \\
 &= -\frac{1}{3} \cot^3 x - \cot x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(89) \int \sin^6 x \, dx &= \int (\sin^2 x)^2 \sin^2 x \, dx \\
&= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right) dx \\
&= \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\cos^2 2x\right) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x\right) dx \\
&= \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{1}{4}\cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int \cos^2 2x \, dx - \frac{1}{8} \int \cos 2x \, dx \\
&\quad + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x \, dx - \frac{1}{8} \int \cos^3 2x \, dx \\
&= \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{3}{8}\cos 2x \, dx + \frac{3}{8} \int \cos^2 2x \, dx - \frac{1}{8} \int \cos^3 2x \, dx \\
&= \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{3}{8}\cos 2x \, dx + \frac{3}{8} \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 4x\right) dx - \frac{1}{8} \int \cos^3 2x \, dx \\
&= \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{3}{8}\cos 2x \, dx + \int \frac{3}{16} dx + \int \frac{3}{16}\cos 4x \, dx - \frac{1}{8} \int \cos^3 2x \, dx \\
&= \int \frac{5}{16} dx - \frac{3}{8} \int \cos 2x \, dx + \int \frac{3}{16}\cos 4x \, dx - \frac{1}{8} \int \cos^2 2x \cos 2x \, dx \\
&= \int \frac{5}{16} dx - \frac{3}{8} \int \cos 2x \, dx + \int \frac{3}{16}\cos 4x \, dx - \frac{1}{8} \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx \\
&= \int \frac{5}{16} dx - \frac{3}{8} \int \cos 2x \, dx + \int \frac{3}{16}\cos 4x \, dx - \int \frac{1}{8}\cos 2x \, dx \\
&\quad + \frac{1}{8} \int (\sin 2x)^2 \cos 2x \, dx \\
&= \int \frac{5}{16} dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \int \frac{3}{16}\cos 4x \, dx + \frac{1}{8} \int (\sin 2x)^2 \cos 2x \, dx \\
&= \int \frac{5}{16} dx - \frac{1}{4} \int 2\cos 2x \, dx + \frac{3}{64} \int 4\cos 4x \, dx + \frac{1}{16} \int 2(\sin 2x)^2 \cos 2x \, dx \\
&= \frac{5}{16} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{48} (\sin 2x)^3 + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (90) \int \frac{\sin^3 x}{\cos x - 1} dx &= \int \frac{\sin x \sin^2 x}{\cos x - 1} dx = \int \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)}{\cos x - 1} dx \\
 &= - \int \frac{\sin x (1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} dx = - \int \sin x (1 + \cos x) dx \\
 &= - \int \sin x dx - \int \sin x \cos x dx = \cos x - \frac{1}{2} \sin^2 x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (91) \int \frac{\sin x}{\sin 2x} dx &= \int \frac{\sin x}{2 \cos x \sin x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \sec x dx = \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (92) \int \frac{\cos 2x}{\cos x} dx &= \int \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos x} dx = 2 \int \cos x dx - \int \frac{1}{\cos x} dx \\
 &= 2 \int \cos x dx - \int \sec x dx = 2 \sin x - \ln |\sec x + \tan x| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (93) \int \sqrt{1 + \cos 2x} dx &= \int \sqrt{2 \cos^2 x} dx = \sqrt{2} \int \cos x dx \\
 &= \sqrt{2} \sin x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (94) \int \sqrt{1 - \cos 2x} dx &= \int \sqrt{2 \sin^2 x} dx = \sqrt{2} \int \sin x dx \\
 &= -\sqrt{2} \cos x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (95) \int \frac{1}{1 - \cos 2x} dx &= \int \frac{1}{2 \sin^2 x} dx = \frac{1}{2} \int \csc^2 x dx \\
 &= -\frac{1}{2} \cot x + c
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{1+\cos 2x} dx = \int \frac{1}{2\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \int \sec^2 x dx$$

$$= \frac{1}{2} \tan x + c$$

$$\int \sin 2x \cos x dx = \int 2\sin x \cos x \cos x dx$$

$$= \int 2\sin x \cos^2 x dx = -\frac{2}{3} \cos^3 x + c$$

$$\int \frac{\tan^2 x \sec x}{\sec x - 1} dx = \int \frac{(\sec^2 x - 1)\sec x}{\sec x - 1} dx$$

$$= \int \frac{(\sec x - 1)(\sec x + 1)\sec x}{\sec x - 1} dx = \int (\sec x + 1)\sec x dx$$

$$= \int (\sec^2 x + \sec x) dx = \tan x + \ln|\sec x + \tan x| + c$$

$$\int (2 + \sin^2 x)^3 \sin 2x dx = \int (2 + \sin^2 x)^3 2\sin x \cos x dx$$

$$= \frac{1}{4} (2 + \sin^2 x)^4 + c$$

$$\int \frac{1+\cos 2x}{1-\cos 2x} dx = \int \frac{2\cos^2 x}{2\sin^2 x} dx = \int \cot^2 x dx$$

$$= \int (\csc^2 x - 1) dx = -\cot x - x + c$$

$$\begin{aligned}
 (101) \int (\sin x + \cos x)^2 dx &= \int (\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x) dx \\
 &= \int (\sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cos x) dx = \int (1 + 2\sin x \cos x) dx \\
 &= x + \sin^2 x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (102) \int \frac{\tan x - 1}{1 - \sin^2 x} dx &= \int \frac{\tan x - 1}{\cos^2 x} dx = \int (\tan x - 1) \sec^2 x dx \\
 &= \frac{1}{2} (\tan x - 1)^2 + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (103) \int \frac{\cot x - 1}{1 - \cos^2 x} dx &= \int \frac{\cot x - 1}{\sin^2 x} dx = \int (\cot x - 1) \csc^2 x dx \\
 &= -\int -(\cot x - 1) \csc^2 x dx = -\frac{1}{2} (\cot x - 1)^2 + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (104) \int \csc 2x \ln(\tan x) dx &= \frac{1}{2} \int 2 \csc 2x \ln(\tan x) dx \\
 &= \frac{1}{4} (\ln(\tan x))^2 + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (105) \int \sec 2x \ln \cot x dx &= -\frac{1}{2} \int -2 \sec 2x \ln \cot x dx \\
 &= -\frac{1}{4} (\ln \cot x)^2 + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (106) \int \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos x} dx = \int \frac{(1 + \cos x)(1 - \cos x)}{1 + \cos x} dx \\
 &= \int (1 - \cos x) dx = x - \sin x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (107) \int \frac{\cos x}{\sin^3 x - \sin x} dx &= \int \frac{\cos x}{-\sin x(1 - \sin^2 x)} dx = \int \frac{-\cos x}{\sin x \cos^2 x} dx \\
 &= \int \frac{-1}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{-2}{\sin 2x} dx = -\int 2 \csc 2x dx \\
 &= -\ln |\csc 2x - \cot 2x| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (108) \int (1 - \sec x)(1 + \sec x) dx &= \int (1 - \sec^2 x) dx \\
 &= x - \tan x + c
 \end{aligned}$$

$$(109) \int \frac{\sin 2x}{4 + \sin^2 x} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{4 + \sin^2 x} dx = \ln |4 + \sin^2 x| + c$$

$$\begin{aligned}
 (110) \int \frac{1 + \sec x}{\csc x} \cot x dx &= \int (1 + \sec x) \sin x \frac{\cos x}{\sin x} dx \\
 &= \int (1 + \sec x) \cos x dx = \int (\cos x + \cos x \sec x) dx \\
 &= \int (\cos x + 1) dx = \sin x + x + c
 \end{aligned}$$

$$(111) \int \sin(\sin x) \cos x dx = -\cos(\sin x) + c$$

$$\begin{aligned}
 (112) \int \left(1 + \frac{1}{\sin x}\right)^2 dx &= \int (1 + \csc x)^2 dx = \int (1 + 2 \csc x + \csc^2 x) dx \\
 &= x + 2 \ln |\csc x - \cot x| - \cot x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (113) \int \sin 4x \cos 3x dx &= \frac{1}{2} \int [\sin(4x+3x) + \sin(4x-3x)] dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \sin 7x dx + \frac{1}{2} \int \sin x dx = \frac{1}{2} \frac{1}{7} \int 7 \sin 7x dx + \frac{1}{2} \int \sin x dx \\
 &= -\frac{1}{14} \cos 7x - \frac{1}{2} \cos x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (114) \int \sin 4x \cos 6x dx &= \frac{1}{2} \int [\sin(4x+6x) + \sin(4x-6x)] dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \sin 10x dx + \frac{1}{2} \int \sin(-2x) dx = \frac{1}{2} \frac{1}{10} \int 10 \sin 10x dx - \frac{1}{4} \int 2 \sin 2x dx \\
 &= -\frac{1}{20} \cos 10x + \frac{1}{4} \cos 2x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (115) \int \cos x \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int [\cos(x+5x) + \cos(x-5x)] dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \cos 6x dx + \frac{1}{2} \int \cos(-4x) dx = \frac{1}{2} \frac{1}{6} \int 6 \cos 6x dx + \frac{1}{2} \frac{1}{4} \int 4 \cos 4x dx \\
 &= \frac{1}{12} \sin 6x + \frac{1}{8} \sin 4x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (116) \int \sin 3x \sin 4x dx &= \frac{1}{2} \int [\cos(3x-4x) - \cos(3x+4x)] dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \cos(-x) dx - \frac{1}{2} \int \cos 7x dx = \frac{1}{2} \int \cos x dx - \frac{1}{2} \frac{1}{7} \int 7 \cos 7x dx \\
 &= \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{14} \sin 7x + c
 \end{aligned}$$

$$117) \int \sin x \sin 2x \sin 3x \, dx$$

$$\sin x \sin 2x = \frac{1}{2} [\cos(x-2x) - \cos(x+2x)]$$

$$\sin x \sin 2x = \frac{1}{2} [\cos(-x) - \cos 3x] = \frac{1}{2} [\cos x - \cos 3x]$$

$$= \int \sin x \sin 2x \sin 3x \, dx = \int \frac{1}{2} [\cos x - \cos 3x] \sin 3x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \cos x \sin 3x \, dx - \frac{1}{2} \int \cos 3x \sin 3x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{2} [\sin(3x-x) + \sin(3x+x)] \, dx - \frac{1}{2} \int \cos 3x \sin 3x \, dx$$

$$= \frac{1}{4} \int [\sin 2x + \sin 4x] \, dx - \frac{1}{2} \int \cos 3x \sin 3x \, dx$$

$$= \frac{1}{4} \int \sin 2x \, dx + \frac{1}{4} \int \sin 4x \, dx - \frac{1}{2} \int \cos 3x \sin 3x \, dx$$

$$= \frac{1}{8} \int 2 \sin 2x \, dx + \frac{1}{16} \int 4 \sin 4x \, dx - \frac{1}{6} \int 3 \cos 3x \sin 3x \, dx$$

$$= -\frac{1}{8} \cos 2x - \frac{1}{16} \cos 4x - \frac{1}{12} \sin^2 3x + c$$

$$118) \int \frac{\cos x}{\sin^3 x} \, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \frac{1}{\sin^2 x} \, dx$$

$$= - \int -\cot x \csc^2 x \, dx = -\frac{1}{2} \cot^2 x + c$$

$$119) \int \sin x \sec^2 x \, dx = \int \sin x \frac{1}{\cos^2 x} \, dx$$

$$= \int \frac{\sin x}{\cos x} \frac{1}{\cos x} \, dx = \int \tan x \sec x \, dx = \sec x + c$$

$$(120) \int \frac{\tan x - \sec x}{\cos x} dx = \int \frac{\tan x}{\cos x} dx - \int \frac{\sec x}{\cos x} dx$$

$$= \int \tan x \sec x dx - \int \sec^2 x dx = \sec x - \tan x + c$$

$$(121) \int \cos^3 x \sin 2x dx = \int \cos^3 x 2 \sin x \cos x dx$$

$$= -2 \int -\cos^4 x \sin x dx = -\frac{2}{5} \cos^5 x + c$$

$$(122) \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1+\tan x}} = \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1+\tan x}} dx$$

$$= \int \sec^2 x (1+\tan x)^{-\frac{1}{2}} dx = 2(1+\tan x)^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= 2\sqrt{1+\tan x} + c$$

$$(123) \int \frac{\cos x}{\cos^2 \frac{1}{2}x \sin^2 \frac{1}{2}x} dx = \int \frac{\cos x}{(\cos \frac{1}{2}x \sin \frac{1}{2}x)^2} dx$$

$$\int \frac{\cos x}{\frac{1}{4} \sin^2 x} dx = 4 \int \frac{\cos x}{\sin x} \frac{1}{\sin x} dx = 4 \int \cot x \csc x dx$$

$$= -4 \csc x + c$$

$$(124) \int \frac{dx}{x \cos^2(1+\ln x)} = \int \sec^2(1+\ln x) \frac{1}{x} dx$$

$$= \tan(1+\ln x) + c$$

$$(125) \int \frac{\cos 2x}{1+\sin x \cos x} dx = \int \frac{\cos 2x}{1+\frac{1}{2}\sin 2x} = \ln \left| 1 + \frac{1}{2}\sin 2x \right| + c$$

$$(126) \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx = \int \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} \frac{1}{\cos x} dx = \int \tan^3 x \sec x dx$$

$$= \int \tan x (\sec^2 x - 1) \sec x dx$$

$$= \int (\tan x \sec x \sec^2 x - \tan x \sec x) dx$$

$$= \int \tan x \sec x \sec^2 x dx - \int \sec x \tan x dx$$

$$= \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + c$$

$$(127) \int \frac{\sec x}{\tan^2 x} dx = \int \sec x \cot^2 x dx = \int \frac{1}{\cos x} \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \frac{1}{\sin x} dx = \int \cot x \csc x dx$$

$$= -\csc x + c$$

$$\begin{aligned}
 (128) \int \sqrt{1 - \sin x} \, dx &= \int \sqrt{\sin^2 \frac{1}{2}x + \cos^2 \frac{1}{2}x - 2\sin \frac{1}{2}x \cos \frac{1}{2}x} \, dx \\
 &= \int \sqrt{\sin^2 \frac{1}{2}x - 2\sin \frac{1}{2}x \cos \frac{1}{2}x + \cos^2 \frac{1}{2}x} \, dx \\
 &= \int \sqrt{(\sin \frac{1}{2}x - \cos \frac{1}{2}x)(\sin \frac{1}{2}x - \cos \frac{1}{2}x)} \, dx \\
 &= \int (\sin \frac{1}{2}x - \cos \frac{1}{2}x) \, dx = 2 \int \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2}x \, dx - 2 \int \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2}x \, dx \\
 &= -2\cos \frac{1}{2}x - 2\sin \frac{1}{2}x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (129) \int \sqrt{1 + \sin 2x} \, dx &= \int \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cos x} \, dx \\
 &= \int \sqrt{\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x} \, dx \\
 &= \int \sqrt{(\sin x + \cos x)(\sin x + \cos x)} \, dx \\
 &= \int (\sin x + \cos x) \, dx = \int \sin x \, dx + \int \cos x \, dx \\
 &= -\cos x + \sin x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (130) \int \frac{dx}{1 - \tan^2 x} &= \int \frac{dx}{1 - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \int \frac{dx}{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}} \\
 &= \int \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \, dx = \int \frac{\cos^2 x}{\cos 2x} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{1 + \cos 2x}{\cos 2x} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos 2x} \, dx + \frac{1}{2} \int dx = \frac{1}{4} \int 2 \sec 2x \, dx + \int \frac{1}{2} \, dx \\
 &= \frac{1}{4} \ln |\sec 2x + \tan 2x| + \frac{1}{2}x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (131) \int \frac{dx}{1-\cot^2 x} &= \int \frac{dx}{1-\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}} = \int \frac{dx}{\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x}} \\
 &= -\int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} dx = -\int \frac{\sin^2 x}{\cos 2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1-\cos 2x}{\cos 2x} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos 2x} dx + \frac{1}{2} \int dx = -\frac{1}{4} \int 2 \sec 2x dx + \int \frac{1}{2} dx \\
 &= -\frac{1}{4} \ln |\sec 2x + \tan 2x| + \frac{1}{2} x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (132) \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx &= \int \frac{\sin^2 x \sin^2 x}{\cos^2 x} dx \\
 &= \int \frac{(1-\cos^2 x)(1-\cos^2 x)}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1-2\cos^2 x + \cos^4 x}{\cos^2 x} dx \\
 &= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int 2 dx + \int \cos^2 x dx \\
 &= \int \sec^2 x dx - \int 2 dx + \frac{1}{2} \int (1+\cos 2x) dx \\
 &= \int \sec^2 x dx - \int 2 dx + \int \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \int 2 \cos 2x dx \\
 &= \tan x - 2x + \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + c \\
 &= \tan x - \frac{3}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (133) \int (\sin^4 x - \cos^4 x) dx &= \int (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x) dx \\
 &= \int (\sin^2 x - \cos^2 x) dx = - \int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx \\
 &= - \int \cos 2x dx = -\frac{1}{2} \int 2 \cos 2x dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (134) \int \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} dx &= \int \frac{1 - \frac{\sin x}{\cos x}}{1 + \frac{\sin x}{\cos x}} dx = \int \frac{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x + \sin x}{\cos x}} dx \\
 &= \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx = \ln |\cos x + \sin x| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (135) \int \frac{dx}{\csc^2 x - 2} &= \int \frac{dx}{\csc^2 x - 1 - 1} = \int \frac{dx}{\cot^2 x - 1} \\
 &= \int \frac{dx}{\frac{\cos^2 x - 1}{\sin^2 x}} = \int \frac{dx}{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x}} \\
 &= \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1 - \cos 2x}{\cos 2x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos 2x} dx - \int \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4} \int 2 \sec 2x dx - \int \frac{1}{2} dx \\
 &= \frac{1}{4} \ln |\sec 2x + \tan 2x| - \frac{1}{2} x + c
 \end{aligned}$$

$$(136) \int \frac{\ln(\tan x)}{\sin 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} dx = \frac{1}{4} [\ln(\tan x)]^2 + c$$

$$\begin{aligned}
 (137) \int e^{\sqrt{1+\cos 2t}} \sin t \, dt &= \int e^{\sqrt{2\cos^2 t}} \sin t \, dt \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int e^{\sqrt{2}\cos t} (-\sqrt{2}\sin t) \, dt \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}\cos t} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (138) \int e^{\sqrt{1+\sin 2t}} \sqrt{1-\sin 2t} \, dt \\
 &= \int e^{\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t + 2\sin x \cos x}} \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t - 2\sin x \cos x} \, dt \\
 &= \int e^{\sqrt{\cos^2 t + 2\sin x \cos x + \sin^2 t}} \sqrt{\cos^2 t - 2\sin x \cos x + \sin^2 t} \, dt \\
 &= \int e^{\sqrt{(\cos + \sin x)(\cos + \sin x)}} \sqrt{(\cos t - \sin t)(\cos t - \sin t)} \, dt \\
 &= \int e^{(\cos + \sin x)} (\cos t - \sin t) \, dt = e^{(\cos + \sin x)} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (139) \int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \\
 &= -\int \frac{-\sin x}{\cos x} \, dx = -\ln|\cos x| + c = \ln|(\cos x)^{-1}| + c \\
 &= \ln\left|\frac{1}{\cos x}\right| + c = \ln|\sec x| + c
 \end{aligned}$$

$$(140) \int \cot x \, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \ln|\sin x| + c$$

$$(141) \int \sec x \, dx = \int \sec x \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx$$

$$\int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$$

$$(142) \int \csc x \, dx = \int \csc x \frac{\csc x - \cot x}{\csc x - \cot x} \, dx$$

$$\int \frac{\csc^2 x - \csc x \cot x}{\csc x - \cot x} \, dx = \ln|\csc x - \cot x| + c$$

or

$$\int \csc x \, dx = \int \csc x \frac{\csc x + \cot x}{\csc x + \cot x} \, dx$$

$$- \int \frac{-\csc^2 x - \csc x \cot x}{\csc x + \cot x} \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + c$$

قوانين تكامل الدوال الزائدية

$$1) \int \sinh F(x) F'(x) dx = \cosh F(x) + c$$

$$2) \int \cosh F(x) F'(x) dx = \sinh F(x) + c$$

$$3) \int \tanh F(x) F'(x) dx = \ln |\cosh F(x)| + c$$

$$4) \int \coth F(x) F'(x) dx = \ln |\sinh F(x)| + c$$

$$5) \int \operatorname{sech} F(x) \tanh F(x) F'(x) dx = -\operatorname{sech} F(x) + c$$

$$6) \int \operatorname{csch} F(x) \coth F(x) F'(x) dx = -\operatorname{csch} F(x) + c$$

$$7) \int \operatorname{csch}^2 F(x) F'(x) dx = -\coth F(x) + c$$

$$8) \int \operatorname{sech}^2 F(x) F'(x) dx = \tanh F(x) + c$$

متطابقات الدوال الزائدية

$$(1) \cosh^2 ax - \sinh^2 ax = 1$$

$$(2) \operatorname{sech}^2 ax = 1 - \tanh^2 ax$$

$$(3) \operatorname{csch}^2 ax = \coth^2 ax - 1$$

$$(4) \sinh^2 ax = \frac{1}{2}(\cosh 2ax - 1)$$

$$(5) \cosh^2 ax = \frac{1}{2}(\cosh 2ax + 1)$$

$$(6) \sinh 2ax = 2 \sinh ax \cosh ax$$

$$(7) \cosh 2ax = \cosh^2 ax + \sinh^2 ax$$

$$(8) \sinh ax = \frac{1}{\operatorname{csch} ax}$$

$$(9) \cosh ax = \frac{1}{\operatorname{sech} ax}$$

$$(10) \tanh ax = \frac{1}{\coth ax}$$

$$(11) \coth ax = \frac{\cosh ax}{\sinh ax}$$

$$(12) \tanh ax = \frac{\sinh ax}{\cosh ax}$$

$$(13) \sinh ax \cosh bx = \frac{1}{2}[\sinh(ax+bx) + \sinh(ax-bx)]$$

$$(14) \cosh ax \cosh bx = \frac{1}{2}[\cosh(ax+bx) + \cosh(ax-bx)]$$

$$(15) \sinh ax \sinh bx = \frac{1}{2}[\cosh(ax+bx) - \cosh(ax-bx)]$$

مسائل متنوعة على تكامل الدوال الزائدية

$$(1) \int \sinh 2x \, dx = \frac{1}{2} \int 2 \sinh 2x \, dx = \frac{1}{2} \cosh 2x + c$$

$$(2) \int \cosh \frac{2}{3}x \, dx = \frac{3}{2} \int \frac{2}{3} \cosh \frac{2}{3}x \, dx = \frac{3}{2} \sinh \frac{2}{3}x + c$$

$$(3) \int \tanh \frac{1}{3}x \, dx = 3 \int \frac{1}{3} \tanh \frac{1}{3}x \, dx = 3 \ln \left| \cosh \frac{1}{3}x \right| + c$$

$$(4) \int \frac{\cosh 2x}{\sqrt{1+\sinh 2x}} \, dx = \frac{1}{2} \int 2(\cosh 2x)(1+\sinh 2x)^{-\frac{1}{2}} \, dx$$

$$= (1+\sinh 2x)^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{1+\sinh 2x} + c$$

$$(5) \int \frac{\cosh^{-1} 3x}{\sqrt{9x^2-1}} \, dx = \frac{1}{3} \int \cosh^{-1} 3x \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}} \, dx$$

$$= \frac{1}{6} (\cosh^{-1} 3x)^2 + c$$

$$(6) \int \cosh^2 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (1+\cosh 4x) \, dx = \int \frac{1}{2} \, dx + \frac{1}{8} \int 4 \cosh 4x \, dx$$

$$= \frac{1}{2}x + \frac{1}{8} \sinh 4x + c$$

$$(7) \int \tanh^2 x \, dx = \int (1 - \operatorname{sech}^2 x) \, dx = \int dx - \int \operatorname{sech}^2 x \, dx$$

$$= x - \tanh x + c$$

$$(8) \int \coth^2 x \, dx = \int (\operatorname{csch}^2 x + 1) \, dx = \int \operatorname{csch}^2 x \, dx + \int dx \\ = -\operatorname{coth} x + x + c$$

$$(9) \int \frac{dx}{(e^x - e^{-x})^2} = \frac{1}{4} \int \left(\frac{2}{e^x - e^{-x}} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int \operatorname{csch}^2 x \, dx = -\frac{1}{4} \operatorname{coth} x + c$$

$$(10) \int \frac{dx}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{1}{4} \int \left(\frac{2}{e^x + e^{-x}} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \frac{1}{4} \tanh x + c$$

$$(11) \int \operatorname{sech} x \, dx = \int \frac{2}{e^x + e^{-x}} \, dx = \int \frac{2e^x}{e^x e^x + e^x e^{-x}} \, dx \\ = \int \frac{2e^x}{e^{2x} + 1} \, dx = 2 \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} \, dx = 2 \tan^{-1}(e^x) + c$$

$$(12) \int \operatorname{csch} x \, dx = \int \operatorname{csch} x \frac{\operatorname{csch} x - \operatorname{coth} x}{\operatorname{csch} x - \operatorname{coth} x} \, dx$$

$$\int \frac{\operatorname{csc}^2 hx - \operatorname{csch} x \operatorname{coth} x}{\operatorname{csch} x - \operatorname{coth} x} \, dx = \ln |\operatorname{csch} x - \operatorname{coth} x| + c$$

$$(13) \int \tanh x \, dx = \int \frac{\sinh x}{\cosh x} \, dx = \ln |\cosh x| + c$$

$$(14) \int \coth x \, dx = \int \frac{\cosh x}{\sinh x} \, dx = \ln |\sinh x| + c$$

$$(15) \int \sinh 2x \sinh 3x \, dx$$

$$= \int \frac{1}{2} [\cosh(2x+3x) - \cosh(2x-3x)] \, dx$$

$$= \int \frac{1}{2} [\cosh(5x) - \cosh(-x)] \, dx$$

$$= \frac{1}{10} \int 5 \cosh(5x) \, dx - \frac{1}{2} \int \cosh(x) \, dx$$

$$= \frac{1}{10} \sinh 5x - \frac{1}{2} \sinh x + c$$

$$(16) \int \frac{(1+\sinh^2 x)^{\frac{1}{2}}}{\operatorname{sech} x \operatorname{csch} x} \, dx = \int (1+\sinh^2 x)^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\operatorname{sech} x \operatorname{csch} x}$$

$$= \frac{1}{2} \int (1+\sinh^2 x)^{\frac{1}{2}} 2 \cosh x \sinh x \, dx = \frac{1}{3} (1+\sinh^2 x)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(17) \int \frac{1+\cosh 2x}{\sinh^2 2x} \, dx = \int \frac{1}{\sinh^2 2x} \, dx + \int \frac{\cosh 2x}{\sinh^2 2x} \, dx$$

$$= \int \operatorname{csc}^2 2x \, dx + \int \frac{\cosh 2x}{\sinh 2x} \cdot \frac{1}{\sinh 2x} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int 2 \operatorname{csc}^2 2x \, dx + \frac{1}{2} \int 2 \coth 2x \operatorname{csc} 2x \, dx$$

$$= -\frac{1}{2} \coth 2x - \frac{1}{2} \operatorname{csc} 2x + c$$

$$(18) \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2-1} (\cosh^{-1} 3x)} = \frac{1}{3} \int \frac{\frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}}{(\cosh^{-1} 3x)} \, dx$$

$$= \frac{1}{3} \ln(\cosh^{-1} 3x) + c$$

قوانين تكامل مشتقة الدوال المثلثية العكسية

$$(1) \int \frac{F'(x)}{\sqrt{1-[F(x)]^2}} dx = \sin^{-1} F(x) + c$$

$$(2) \int \frac{-F'(x)}{\sqrt{1-[F(x)]^2}} dx = \cos^{-1} F(x) + c$$

$$(3) \int \frac{F'(x)}{1+[F(x)]^2} dx = \tan^{-1} F(x) + c$$

$$(4) \int \frac{-F'(x)}{1+[F(x)]^2} dx = \cot^{-1} F(x) + c$$

$$(5) \int \frac{F'(x)}{F(x)\sqrt{[F(x)]^2-1}} dx = \sec^{-1}|F(x)| + c$$

$$(6) \int \frac{-F'(x)}{F(x)\sqrt{[F(x)]^2-1}} dx = \csc^{-1}|F(x)| + c$$

مسائل متنوعة على تكامل مشتقة الدوال العكسية

$$(1) \int \frac{dx}{x^2+16} = \frac{1}{16} \int \frac{dx}{\frac{x^2}{16}+1} = \frac{1}{16} \int \frac{dx}{(\frac{x}{4})^2+1} = \frac{1}{4} \int \frac{\frac{1}{4}dx}{(\frac{x}{4})^2+1}$$

$$= \frac{1}{4} \tan^{-1}(\frac{x}{4}) + c$$

$$(2) \int \frac{dx}{x^2+9} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\frac{x^2}{9}+1} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{(\frac{x}{3})^2+1} = \frac{1}{3} \int \frac{\frac{1}{3}dx}{(\frac{x}{3})^2+1}$$

$$= \frac{1}{3} \tan^{-1}(\frac{x}{3}) + c$$

$$(3) \int \frac{dx}{x^2+2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\frac{x^2}{2}+1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(\frac{x}{\sqrt{2}})^2+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}dx}{(\frac{x}{\sqrt{2}})^2+1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1}(\frac{x}{\sqrt{2}}) + c$$

$$(4) \int \frac{dx}{2x^2+9} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\frac{2x^2}{9}+1} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{(\frac{\sqrt{2}x}{3})^2+1} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{3}dx}{(\frac{\sqrt{2}x}{3})^2+1}$$

$$= \frac{1}{3\sqrt{2}} \tan^{-1}(\frac{\sqrt{2}x}{3}) + c$$

$$\textcircled{9} \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}} = \int \frac{\frac{1}{2}dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}}$$

$$= \sin^{-1}(\frac{x}{2}) + c$$

$$\textcircled{10} \int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{5})^2}} = \int \frac{\frac{1}{5}dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{5})^2}}$$

$$= \sin^{-1}(\frac{x}{5}) + c$$

$$\textcircled{11} \int \frac{dx}{\sqrt{3-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{x^2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{\sqrt{3}})^2}} = \int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{\sqrt{3}})^2}}$$

$$= \sin^{-1}(\frac{x}{\sqrt{3}}) + c$$

$$\textcircled{12} \int \frac{dx}{\sqrt{3-2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{2x^2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}})^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}dx}{\sqrt{1-(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1}(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}}) + c$$

$$(13) \int \frac{-dx}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{1}{3} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}} = \frac{1}{3} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{3})^2}} = \int \frac{-\frac{1}{3}dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{3})^2}}$$

$$= \cos^{-1}(\frac{x}{3}) + c$$

$$(14) \int \frac{-dx}{\sqrt{16-x^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-\frac{x^2}{16}}} = \frac{1}{4} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{4})^2}} = \int \frac{-\frac{1}{4}dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{4})^2}}$$

$$= \cos^{-1}(\frac{x}{4}) + c$$

$$(15) \int \frac{-dx}{\sqrt{5-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-\frac{x^2}{5}}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{\sqrt{5}})^2}}$$

$$= \int \frac{-\frac{1}{\sqrt{5}}dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{\sqrt{5}})^2}} = \cos^{-1}(\frac{x}{\sqrt{5}}) + c$$

$$(16) \int \frac{-dx}{\sqrt{3-2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-\frac{2x^2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}})^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}dx}{\sqrt{1-(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos^{-1}(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}}) + c$$

$$(17) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{\frac{x^2}{4}-1}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{(\frac{x}{2})^2-1}}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2} dx}{\frac{1}{2} x \sqrt{(\frac{x}{2})^2-1}} = \frac{1}{2} \sec^{-1} \left| \frac{x}{2} \right| + c$$

$$(18) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-25}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x\sqrt{\frac{x^2}{25}-1}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x\sqrt{(\frac{x}{5})^2-1}}$$

$$= \frac{1}{5} \int \frac{\frac{1}{5} dx}{\frac{1}{5} x \sqrt{(\frac{x}{5})^2-1}} = \frac{1}{5} \sec^{-1} \left| \frac{x}{5} \right| + c$$

$$(19) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{x\sqrt{\frac{x^2}{3}-1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{x\sqrt{(\frac{x}{\sqrt{3}})^2-1}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} dx}{\frac{1}{\sqrt{3}} x \sqrt{(\frac{x}{\sqrt{3}})^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sec^{-1} \left| \frac{x}{\sqrt{3}} \right| + c$$

$$\begin{aligned}
 (20) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x^2-3}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{x\sqrt{\frac{2x^2}{3}-1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{x\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}}\right)^2-1}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} dx}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} x \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}}\right)^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sec^{-1} \left| \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}} \right| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (21) \int \frac{-dx}{x\sqrt{x^2-4}} &= \frac{1}{2} \int \frac{-dx}{x\sqrt{\frac{x^2}{4}-1}} = \frac{1}{2} \int \frac{-dx}{x\sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2-1}} \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{-\frac{1}{2} dx}{\frac{1}{2} x \sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2-1}} = \frac{1}{2} \csc^{-1} \left| \frac{x}{2} \right| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (22) \int \frac{-dx}{x\sqrt{x^2-25}} &= \frac{1}{5} \int \frac{-dx}{x\sqrt{\frac{x^2}{25}-1}} = \frac{1}{5} \int \frac{-dx}{x\sqrt{\left(\frac{x}{5}\right)^2-1}} \\
 &= \frac{1}{5} \int \frac{-\frac{1}{5} dx}{\frac{1}{5} x \sqrt{\left(\frac{x}{5}\right)^2-1}} = \frac{1}{5} \csc^{-1} \left| \frac{x}{5} \right| + c
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{25-x^6}} = \frac{1}{5} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-\frac{x^6}{25}}} = \frac{1}{5} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-(\frac{x^3}{5})^2}}$$

$$\Rightarrow \int \frac{\frac{3}{5}x^2 dx}{\sqrt{1-(\frac{x^3}{5})^2}} = \frac{1}{3} \sin^{-1}(\frac{x^3}{5}) + c$$

$$\Rightarrow \int \frac{-x^3 dx}{\sqrt{9-x^8}} = \frac{1}{3} \int \frac{-x^3 dx}{\sqrt{1-\frac{x^8}{9}}} = \frac{1}{3} \int \frac{-x^3 dx}{\sqrt{1-(\frac{x^4}{3})^2}}$$

$$\Rightarrow \int \frac{-\frac{4}{3}x^3 dx}{\sqrt{1-(\frac{x^4}{3})^2}} = \frac{1}{4} \cos^{-1}(\frac{x^4}{3}) + c$$

$$\Rightarrow \int \frac{xdx}{x^4+9} = \frac{1}{9} \int \frac{xdx}{\frac{x^4}{9}+1} = \frac{1}{9} \int \frac{xdx}{(\frac{x^2}{3})^2+1} = \frac{1}{6} \int \frac{\frac{2}{3}x}{(\frac{x^2}{3})^2+1} dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \tan^{-1}(\frac{x^2}{3}) + c$$

$$\begin{aligned}
 (26) \int \frac{-x^3 dx}{x^8 + 9} &= \frac{1}{9} \int \frac{-x^3 dx}{\frac{x^8}{9} + 1} = \frac{1}{9} \int \frac{-x^3 dx}{\left(\frac{x^4}{3}\right)^2 + 1} \\
 &= \frac{1}{12} \int \frac{-\frac{4}{3}x^3}{\left(\frac{x^4}{3}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{12} \cot^{-1}\left(\frac{x^4}{3}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (27) \int \frac{\sin x}{\cos^2 x + 4} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{\sin x}{\frac{\cos^2 x}{4} + 1} dx = \frac{1}{4} \int \frac{\sin x}{\left(\frac{\cos x}{2}\right)^2 + 1} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-\frac{1}{2} \sin x}{\left(\frac{\cos x}{2}\right)^2 + 1} dx = -\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{2}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (28) \int \frac{\cos x}{\sin^2 x + 9} dx &= \frac{1}{9} \int \frac{\cos x}{\frac{\sin^2 x}{9} + 1} dx = \frac{1}{9} \int \frac{\cos x}{\left(\frac{\sin x}{3}\right)^2 + 1} dx \\
 &= \frac{1}{3} \int \frac{\frac{1}{3} \cos x}{\left(\frac{\sin x}{3}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{3}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$(29) \int \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x + 1} dx = \int \frac{\sec x \tan x}{(\sec x)^2 + 1} dx = \tan^{-1}(\sec x) + c$$

$$(30) \int \frac{\csc x \cot x}{\csc^2 x + 1} dx = -\int \frac{-\csc x \cot x}{(\csc x)^2 + 1} dx = -\tan^{-1}(\csc x) + c$$

$$\begin{aligned}
 (31) \int \frac{\cos x}{\sqrt{9 - \sin^2 x}} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 x}{9}}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \left(\frac{\sin x}{3}\right)^2}} dx \\
 &= \int \frac{\frac{1}{3} \cos x}{\sqrt{1 - \left(\frac{\sin x}{3}\right)^2}} dx = \sin^{-1}\left(\frac{\sin x}{3}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (32) \int \frac{-\sec^2 x}{\sqrt{4 - \tan^2 x}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{-\sec^2 x}{\sqrt{1 - \frac{\tan^2 x}{4}}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{-\sec^2 x}{\sqrt{1 - \left(\frac{\tan x}{2}\right)^2}} dx \\
 &= \int \frac{-\frac{1}{2} \sec^2 x}{\sqrt{1 - \left(\frac{\tan x}{2}\right)^2}} dx = \cos^{-1}\left(\frac{\tan x}{2}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (33) \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{3 - \tan^2 x}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1 - \frac{\tan^2 x}{3}}} dx \\
 &= \int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} \sec^2 x}{\sqrt{1 - \left(\frac{\tan x}{\sqrt{3}}\right)^2}} dx = \sin^{-1}\left(\frac{\tan x}{\sqrt{3}}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$(34) \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{e^x}{(e^x)^2 + 1} dx = \tan^{-1} e^x + c$$

$$(35) \int \frac{e^{-2x}}{e^{-4x} + 2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{e^{-2x}}{\frac{e^{-4x}}{2} + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{e^{-2x}}{\left[\frac{e^{-2x}}{\sqrt{2}}\right]^2 + 1} dx$$

$$= \frac{-1}{2\sqrt{2}} \int \frac{-\frac{2}{\sqrt{2}} e^{-2x}}{\left[\frac{e^{-2x}}{\sqrt{2}}\right]^2 + 1} dx = \frac{-1}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{e^{-2x}}{\sqrt{2}} + c$$

$$(36) \int \frac{-2^x}{2^{2x} + 1} dx = \int \frac{-2^x}{(2^x)^2 + 1} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{-2^x \ln 2}{(2^x)^2 + 1} dx$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \cot^{-1} 2^x + c$$

$$(37) \int \frac{3^x}{9^x + 2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{3^x}{\frac{3^{2x}}{2} + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{3^x}{\left(\frac{3^x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2} \ln 3} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} 3^x \ln 3}{\left(\frac{3^x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{\sqrt{2} \ln 3} \tan^{-1} \frac{3^x}{\sqrt{2}} + c$$

$$(38) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}} \quad \text{بضرب البسط والمقام في } e^x$$

$$= \int \frac{e^x}{e^x \sqrt{(e^x)^2-1}} dx = \sec^{-1} |e^x| + c = \sec^{-1} e^x + c$$

$$(39) \int \frac{-dx}{\sqrt{3^{2x}-1}} \quad 3^x \text{ بضرب البسط والمقام في}$$

$$= \frac{1}{\ln 3} \int \frac{-3^x \ln 3}{3^x \sqrt{(3^x)^2-1}} dx = \frac{1}{\ln 3} \csc^{-1} |3^x| + c = \frac{1}{\ln 3} \csc^{-1}(3^x) + c$$

$$(40) \int \frac{dx}{x[1+(\ln x)^2]} = \int \frac{\frac{1}{x} dx}{1+(\ln x)^2} = \tan^{-1}(\ln x) + c$$

$$(41) \int \frac{\cos x}{\sqrt{4+\cos^2 x}} dx = \int \frac{\cos x \, dx}{\sqrt{4+1-\sin^2 x}} = \int \frac{\cos x \, dx}{\sqrt{5-\sin^2 x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{\cos x}{\sqrt{1-\frac{\sin^2 x}{5}}} dx = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{\cos x}{\sqrt{1-(\frac{\sin x}{\sqrt{5}})^2}} dx$$

$$= \int \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} \cos x}{\sqrt{1-(\frac{\sin x}{\sqrt{5}})^2}} dx = \sin^{-1}(\frac{\sin x}{\sqrt{5}}) + c$$

$$\begin{aligned}
 (42) \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{5-\sec^2 x}} dx &= \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{5-1-\tan^2 x}} dx = \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{4-\tan^2 x}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-\frac{\tan^2 x}{4}}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-(\frac{\tan x}{2})^2}} dx \\
 &= \int \frac{\frac{1}{2} \sec^2 x}{\sqrt{1-(\frac{\tan x}{2})^2}} dx = \sin^{-1}(\frac{\tan x}{2}) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (43) \int \frac{dx}{2\sin^2 x + \cos^2 x} &= \int \frac{dx}{\cos^2 x [2\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 1]} = \int \frac{\sec^2 x dx}{2\tan^2 x + 1} \\
 &= \int \frac{\sec^2 x}{(\sqrt{2}\tan x)^2 + 1} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\sqrt{2}\sec^2 x}{(\sqrt{2}\tan x)^2 + 1} dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1}(\sqrt{2}\tan x) + c
 \end{aligned}$$

$$(44) \int \frac{\sin 2x}{1 + \sin^4 x} dx = \int \frac{2\sin x \cos x}{1 + (\sin^2 x)^2} dx = \tan^{-1}(\sin^2 x) + c$$

$$\begin{aligned}
 (45) \int \frac{x+2}{x^2+1} dx &= \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{2}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + 2\tan^{-1} x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (46) \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx - \frac{1}{2} \int -2x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= \sin^{-1} x - (1-x^2)^{\frac{1}{2}} + c = \sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (47) \int \frac{\sqrt{x}}{1+x^3} dx &= \int \frac{\sqrt{x}}{1+(\sqrt{x^3})^2} dx = \frac{2}{3} \int \frac{\frac{3}{2}\sqrt{x}}{1+(\sqrt{x^3})^2} dx \\
 &= \frac{2}{3} \tan^{-1} \sqrt{x^3} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (48) \int \frac{1}{\sqrt{x^3-x^2}} dx &= \int \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx = \int \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}\sqrt{(\sqrt{x})^2-1}} dx \\
 &= 2 \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}\sqrt{(\sqrt{x})^2-1}} dx = 2 \sec^{-1} |\sqrt{x}| + c = 2 \sec^{-1} \sqrt{x} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (49) \int \frac{1}{x\sqrt{x^4-1}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2\sqrt{(x^2)^2-1}} dx = \frac{1}{2} \sec^{-1} |x^2| + c \\
 &= \frac{1}{2} \sec^{-1} x^2 + c
 \end{aligned}$$

بضرب البسط والمقام في x

$$\begin{aligned}
 (50) \int \frac{\cos x}{\sin x \sqrt{\sin^4 x - 1}} dx &= \int \frac{\sin x \cos x}{\sin^2 x \sqrt{\sin^4 x - 1}} dx \\
 &\quad \text{السط والمقام في } \sin x \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2 \sin x \cos x}{\sin^2 x \sqrt{(\sin^2 x)^2 - 1}} dx = \frac{1}{2} \sec^{-1} |\sin^2 x| + c = \frac{1}{2} \sec^{-1} (\sin^2 x) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (51) \int \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)} dx &= \int \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{(\sqrt{x})^2 + 1} dx = 2 \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x})^2 + 1} dx \\
 &= 2 \tan^{-1} \sqrt{x} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (52) \int \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt{1-x}} dx \\
 &= \int \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} dx = 2 \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} dx \\
 &= 2 \sin^{-1} \sqrt{x} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (53) \int \frac{1}{x(\ln x)^2 + x} dx &= \int \frac{1}{x[(\ln x)^2 + 1]} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{(\ln x)^2 + 1} dx \\
 &= \tan^{-1}(\ln x) + c
 \end{aligned}$$

مسائل متنوعة على استخدام إكمال مربع قبل التكامل

$$\textcircled{1} \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 2} = \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 1 - 1 + 2} = \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 1}$$

$$= \tan^{-1}(x-1) + c$$

$$(2) \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 8} = \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 4 - 4 + 8} = \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 4}$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\frac{(x-2)^2}{4} + 1} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{[\frac{x-2}{2}]^2 + 1} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{[\frac{1}{2}x - 1]^2 + 1}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2}dx}{[\frac{1}{2}x - 1]^2 + 1} = \frac{1}{2} \tan^{-1}(\frac{1}{2}x - 1) + c$$

$$(3) \int \frac{dx}{x^2 + 4x + 13} = \int \frac{dx}{x^2 + 4x + 4 - 4 + 13} = \int \frac{dx}{(x+2)^2 + 9}$$

$$= \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\frac{(x+2)^2}{9} + 1} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{[\frac{x+2}{3}]^2 + 1} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{[\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}]^2 + 1}$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{\frac{1}{3}dx}{[\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}]^2 + 1} = \frac{1}{3} \tan^{-1}(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}) + c$$

$$(4) \int \frac{-dx}{4x^2+4x+2} = \frac{1}{4} \int \frac{-dx}{x^2+x+\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \int \frac{-dx}{x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{-dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}} = \int \frac{-dx}{\frac{(x+\frac{1}{2})^2}{\frac{1}{4}}+1} = \int \frac{-dx}{[2x+1]^2+1}$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{-2dx}{[2x+1]^2+1} = \frac{1}{2} \cot^{-1}(2x+1) + c$$

$$(5) \int \frac{-dx}{9x^2+6x+5} = \frac{1}{9} \int \frac{-dx}{x^2+\frac{2}{3}x+\frac{5}{9}} = \frac{1}{9} \int \frac{-dx}{x^2+\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}-\frac{1}{9}+\frac{5}{9}}$$

$$= \frac{1}{9} \int \frac{-dx}{(x+\frac{1}{3})^2+\frac{4}{9}} = \frac{1}{4} \int \frac{-dx}{\frac{(x+\frac{1}{3})^2}{\frac{4}{9}}+1} = \frac{1}{4} \int \frac{-dx}{[\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}]^2+1}$$

$$\frac{1}{6} \int \frac{-\frac{3}{2}dx}{[\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}]^2+1} = \frac{1}{6} \cot^{-1}(\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}) + c$$

$$(6) \int \frac{dx}{\sqrt{8+2x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{-[x^2-2x-8]}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-[x^2-2x+1-1-8]}} = \int \frac{dx}{\sqrt{-[(x-1)^2-9]}}$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{-(x-1)^2+9}} = \int \frac{dx}{\sqrt{9-(x-1)^2}} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{(x-1)^2}{9}}}$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x-1}{3}\right)^2}} = \int \frac{\frac{1}{3}dx}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}\right)^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}\right)+c$$

$$(7) \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2-6x-8}} = \int \frac{dx}{\sqrt{-[x^2+6x+8]}}$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{-[x^2+6x+9-9+8]}} = \int \frac{dx}{\sqrt{-[(x+3)^2-1]}}$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{-(x+3)^2+1}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x+3)^2}} = \sin^{-1}(x+3)+c$$

$$(8) \int \frac{-dx}{\sqrt{1-x-x^2}} = \int \frac{-dx}{\sqrt{-(x^2+x-1)}}$$

$$\int \frac{-dx}{\sqrt{-(x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-1)}} = \int \frac{-dx}{\sqrt{-(x+\frac{1}{2})^2-\frac{5}{4}}}$$

$$= \int \frac{-dx}{\sqrt{-(x+\frac{1}{2})^2+\frac{5}{4}}} = \int \frac{-dx}{\sqrt{\frac{5}{4}-(x+\frac{1}{2})^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \int \frac{-dx}{\sqrt{1-\frac{(x+\frac{1}{2})^2}{\frac{5}{4}}}}$$

$$\int \frac{-\frac{2}{\sqrt{5}}dx}{\sqrt{1-(\frac{2}{\sqrt{5}}x+\frac{1}{\sqrt{5}})^2}} = \cos^{-1}(\frac{2}{\sqrt{5}}x+\frac{1}{\sqrt{5}})+c$$

$$(9) \int \frac{-dx}{\sqrt{2x-x^2}} = \int \frac{-dx}{\sqrt{-(x^2-2x+1-1)}}$$

$$= \int \frac{-dx}{\sqrt{-(x-1)^2-1}} = \int \frac{-dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}} = \cos^{-1}(x-1)+c$$

$$(10) \int \frac{dx}{\sqrt{12x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{-[x^2-12x+36-36]}}$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{-(x-6)^2-36}} = \int \frac{dx}{\sqrt{36-(x-6)^2}}$$

$$= \frac{1}{6} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{(x-6)^2}{36}}} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x-6}{6}\right)^2}}$$

$$= \int \frac{\frac{1}{6}dx}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{6}x-1\right)^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{1}{6}x-1\right) + c$$

$$(11) \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)\sqrt{x^2+x-2}} = \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-2}}$$

$$= \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{9}{4}}} = \frac{2}{3} \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)\sqrt{\frac{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{9}{4}}-1}}$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)\sqrt{\left(\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}\right)^2-1}} = \frac{2}{3} \int \frac{\frac{2}{3}dx}{\left(\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}\right)\sqrt{\left(\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}\right)^2-1}}$$

$$= \frac{2}{3} \sec^{-1}\left|\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}\right| + c$$

$$\begin{aligned}
 (12) \int \frac{-dx}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+5}} &= \int \frac{-dx}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+9-9+5}} \\
 &= \int \frac{-dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-4}} = \frac{1}{2} \int \frac{-dx}{(x+3)\sqrt{\frac{(x+3)^2}{4}-1}} \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{-dx}{(x+3)\sqrt{(\frac{1}{2}x+\frac{3}{2})^2-1}} = \frac{1}{2} \int \frac{-\frac{1}{2}dx}{(\frac{1}{2}x+\frac{3}{2})\sqrt{(\frac{1}{2}x+\frac{3}{2})^2-1}} \\
 &= \frac{1}{2} \csc^{-1} \left| \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \right| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (13) \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} &= \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x+1-1}} \\
 &= \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{(x+1)^2-1}} = \sec^{-1} |x+1| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (14) \int \frac{-dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x}} &= \int \frac{-dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x+1-1}} \\
 &= \int \frac{-dx}{(x-1)\sqrt{(x-1)^2-1}} = \csc^{-1} |x-1| + c
 \end{aligned}$$

$$(15) \int \frac{2^x dx}{2^{2x} + 2^x + 1} = \int \frac{2^x dx}{2^{2x} + 2^x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1} = \int \frac{2^x dx}{(2^x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{2^x dx}{(2^x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \int \frac{2^x dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}} 2^x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1}$$

$$\frac{2}{\sqrt{3} \ln 2} \int \frac{2^x \frac{2}{\sqrt{3}} \ln 2 dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}} 2^x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3} \ln 2} \tan^{-1} [\frac{2}{\sqrt{3}} 2^x + \frac{1}{\sqrt{3}}] + c$$

$$(16) \int \frac{-3^x dx}{9^x + 3^x + 2} = \int \frac{-3^x dx}{3^{2x} + 3^x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 2} = \int \frac{-3^x dx}{(3^x + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}}$$

$$= \frac{4}{7} \int \frac{-3^x dx}{(3^x + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}} = \frac{4}{7} \int \frac{-3^x dx}{[\frac{2}{\sqrt{7}} 3^x + \frac{1}{\sqrt{7}}]^2 + 1}$$

$$\frac{2}{\sqrt{7} \ln 3} \int \frac{-3^x \frac{2}{\sqrt{7}} \ln 3 dx}{[\frac{2}{\sqrt{7}} 3^x + \frac{1}{\sqrt{7}}]^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{7} \ln 3} \cot^{-1} [\frac{2}{\sqrt{7}} 3^x + \frac{1}{\sqrt{7}}] + c$$

$$(17) \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + e^x + 1} = \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + e^x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1} = \int \frac{e^x dx}{(e^x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{e^x dx}{\frac{(e^x + \frac{1}{2})^2}{\frac{3}{4}} + 1} = \frac{4}{3} \int \frac{e^x dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}}e^x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1}$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{e^x \frac{2}{\sqrt{3}} dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}}e^x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1}[\frac{2}{\sqrt{3}}e^x + \frac{1}{\sqrt{3}}] + c$$

$$(18) \int \frac{-e^x dx}{e^{2x} + e^x + 2} = \int \frac{-e^x dx}{e^{2x} + e^x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 2} = \int \frac{-e^x dx}{(e^x + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}}$$

$$= \frac{4}{7} \int \frac{-e^x dx}{\frac{(e^x + \frac{1}{2})^2}{\frac{7}{4}} + 1} = \frac{4}{7} \int \frac{-e^x dx}{[\frac{2}{\sqrt{7}}e^x + \frac{1}{\sqrt{7}}]^2 + 1}$$

$$\frac{2}{\sqrt{7}} \int \frac{-e^x \frac{2}{\sqrt{7}} dx}{[\frac{2}{\sqrt{7}}e^x + \frac{1}{\sqrt{7}}]^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{7}} \cot^{-1}[\frac{2}{\sqrt{7}}e^x + \frac{1}{\sqrt{7}}] + c$$

$$(19) \int \frac{\sin x \, dx}{\cos^2 x + \cos x + 1} = \int \frac{\sin x \, dx}{\cos^2 x + \cos x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1}$$

$$\int \frac{\sin x \, dx}{(\cos x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \int \frac{\sin x \, dx}{\frac{(\cos x + \frac{1}{2})^2}{\frac{3}{4}} + 1}$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{\sin x \, dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}} \cos x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{-\frac{2}{\sqrt{3}} \sin x \, dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}} \cos x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1}$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} [\frac{2}{\sqrt{3}} \cos x + \frac{1}{\sqrt{3}}] + c$$

$$(20) \int \frac{\sec^2 x \, dx}{\tan^2 x + 2 \tan x + 2} = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{\tan^2 x + 2 \tan x + 1 - 1 + 2}$$

$$= \int \frac{\sec^2 x \, dx}{(\tan x + 1)^2 + 1} = \tan^{-1} [\tan x + 1] + c$$

$$\begin{aligned}
(21) \int \frac{x}{x^2 + x + 5} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1-1}{x^2 + x + 5} dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2 + x + 5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + x + 5} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2 + x + 5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 5} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2 + x + 5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{19}{4}} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2 + x + 5} dx - \frac{2}{19} \int \frac{dx}{(\frac{2}{\sqrt{19}}x + \frac{1}{\sqrt{19}})^2 + 1} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2 + x + 5} dx - \frac{1}{\sqrt{19}} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{19}} dx}{(\frac{2}{\sqrt{19}}x + \frac{1}{\sqrt{19}})^2 + 1} \\
&= \frac{1}{2} \ln |x^2 + x + 5| - \frac{1}{\sqrt{19}} \tan^{-1}(\frac{2}{\sqrt{19}}x + \frac{1}{\sqrt{19}}) + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(22) \int \frac{2x}{x^2 + 2x + 5} dx &= \int \frac{2x+2-2}{x^2 + 2x + 5} dx \\
&= \int \frac{2x+2}{x^2 + 2x + 5} dx - 2 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} \\
&= \int \frac{2x+2}{x^2 + 2x + 5} dx - 2 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 1 - 1 + 5} \\
&= \int \frac{2x+2}{x^2 + 2x + 5} dx - 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 4} \\
&= \int \frac{2x+2}{x^2 + 2x + 5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})^2 + 1} \\
&= \int \frac{2x+2}{x^2 + 2x + 5} dx - \int \frac{\frac{1}{2} dx}{(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})^2 + 1} \\
&= \ln|x^2 + 2x + 5| - \tan^{-1}(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}) + c
\end{aligned}$$

$$(23) \int \frac{5x+1}{2x^2+4x+3} dx = \frac{5}{4} \int \frac{4x + \frac{4}{5}}{2x^2+4x+3} dx$$

$$\frac{5}{4} \int \frac{4x+4-4+\frac{4}{5}}{2x^2+4x+3} dx = \frac{5}{4} \int \frac{4x+4-\frac{16}{5}}{2x^2+4x+3} dx$$

$$\frac{5}{4} \int \frac{4x+4}{2x^2+4x+3} dx - \frac{5}{4} \cdot \frac{16}{5} \int \frac{dx}{2x^2+4x+3}$$

$$\frac{5}{4} \int \frac{4x+4}{2x^2+4x+3} dx - \frac{4}{2} \int \frac{dx}{x^2+2x+\frac{3}{2}}$$

$$\frac{5}{4} \int \frac{4x+4}{2x^2+4x+3} dx - 2 \int \frac{dx}{x^2+2x+1-1+\frac{3}{2}}$$

$$\frac{5}{4} \int \frac{4x+4}{2x^2+4x+3} dx - 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + \frac{1}{2}}$$

$$\frac{5}{4} \int \frac{4x+4}{2x^2+4x+3} dx - 4 \int \frac{dx}{(\sqrt{2}x + \sqrt{2})^2 + 1}$$

$$\frac{5}{4} \int \frac{4x+4}{2x^2+4x+3} dx - \frac{4}{\sqrt{2}} \int \frac{\sqrt{2} dx}{(\sqrt{2}x + \sqrt{2})^2 + 1}$$

$$= \frac{5}{4} \ln |2x^2+4x+3| - \frac{4}{\sqrt{2}} \tan^{-1}(\sqrt{2}x + \sqrt{2}) + c$$

$$\begin{aligned}
(24) \int \frac{4-5x}{x^2-2x+5} dx &= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-\frac{8}{5}}{x^2-2x+5} dx \\
&= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2+2-\frac{8}{5}}{x^2-2x+5} dx = -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2+\frac{2}{5}}{x^2-2x+5} dx \\
&= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+5} dx - \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} \int \frac{dx}{x^2-2x+5} \\
&= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+5} dx - \int \frac{dx}{x^2-2x+5} \\
&= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+5} dx - \int \frac{dx}{x^2-2x+1-1+5} \\
&= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+5} dx - \int \frac{dx}{(x-1)^2+4} \\
&= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+5} dx - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(\frac{1}{2}x-\frac{1}{2})^2+1} \\
&= -\frac{5}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2}dx}{(\frac{1}{2}x-\frac{1}{2})^2+1} \\
&= -\frac{5}{2} \ln|x^2-2x+5| - \frac{1}{2} \tan^{-1}(\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}) + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(25) \int \frac{x}{\sqrt{-x^2+4x-3}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x}{\sqrt{-x^2+4x-3}} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4-4}{\sqrt{-x^2+4x-3}} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x-3}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{-(x^2-4x+3)}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x-3}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{-(x^2-4x+4-4+3)}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x-3}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{-(x-2)^2-1}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x-3}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x-2)^2}} \\
&= -\frac{1}{2} \int (-2x+4)(-x^2+4x-3)^{-\frac{1}{2}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x-2)^2}} \\
&= -\sqrt{-x^2+4x-3} + 2 \sin^{-1}(x-2) + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(26) \int \frac{x}{\sqrt{-4x^2-4x+10}} dx &= -\frac{1}{8} \int \frac{-8x}{\sqrt{-4x^2-4x+10}} dx \\
&- \frac{1}{8} \int \frac{-8x-4+4}{\sqrt{-4x^2-4x+10}} dx \\
&- \frac{1}{8} \int \frac{-8x-4}{\sqrt{-4x^2-4x+10}} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{-4[x^2+x-\frac{5}{2}]}} \\
&- \frac{1}{8} \int \frac{-8x-4}{\sqrt{-4x^2-4x+10}} dx - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\sqrt{-[x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-\frac{5}{2}]}} \\
&- \frac{1}{8} \int \frac{-8x-4}{\sqrt{-4x^2-4x+10}} dx - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\sqrt{-[(x+\frac{1}{2})^2-\frac{11}{4}]}} \\
&- \frac{1}{8} \int \frac{-8x-4}{\sqrt{-4x^2-4x+10}} dx - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{11}{4}-(x+\frac{1}{2})^2}} \\
&- \frac{1}{8} \int (-8x-4)(-4x^2-4x+10)^{-\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{2\sqrt{11}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{2}{\sqrt{11}}x+\frac{1}{\sqrt{11}})^2}} \\
&- \frac{1}{8} \int (-8x-4)(-4x^2-4x+10)^{-\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{4} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{11}} dx}{\sqrt{1-(\frac{2}{\sqrt{11}}x+\frac{1}{\sqrt{11}})^2}} \\
&= -\frac{1}{4} \sqrt{-4x^2-4x+10} - \frac{1}{4} \sin^{-1}(\frac{2}{\sqrt{11}}x+\frac{1}{\sqrt{11}}) + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(27) \int \frac{x-3}{\sqrt{-x^2+4x+5}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+6}{\sqrt{-x^2+4x+5}} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4-4+6}{\sqrt{-x^2+4x+5}} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x+5}} dx - \frac{1}{2} \int \frac{2dx}{\sqrt{-(x^2-4x-5)}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x+5}} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{-(x^2-4x+4-4-5)}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x+5}} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{-[(x-2)^2-9]}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x+5}} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{9-(x-2)^2}} \\
&= -\frac{1}{2} \int (-2x+4)(-x^2+4x+5)^{-\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{1}{3}x-\frac{2}{3})^2}} \\
&= -\frac{1}{2} \int (-2x+4)(-x^2+4x+5)^{-\frac{1}{2}} dx - \int \frac{\frac{1}{3}dx}{\sqrt{1-(\frac{1}{3}x-\frac{2}{3})^2}} \\
&= -\sqrt{-x^2+4x+5} - \sin^{-1}(\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}) + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(28) \int \frac{x}{\sqrt{-x^2+4x}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x}{\sqrt{-x^2+4x}} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4-4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{-(x^2-4x)}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{-(x^2-4x+4-4)}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{-[(x-2)^2-4]}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\
&= -\frac{1}{2} \int (-2x+4)(-x^2+4x)^{-\frac{1}{2}} dx + 2 \int \frac{\frac{1}{2} dx}{\sqrt{1-(\frac{1}{2}x-1)^2}} \\
&= -\sqrt{-x^2+4x} + 2 \sin^{-1}(\frac{1}{2}x-1) + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (29) \int \frac{x+1}{\sqrt{-x^2+4x}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x-2}{\sqrt{-x^2+4x}} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4-4-2}{\sqrt{-x^2+4x}} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{-(x^2-4x)}} \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{-(x^2-4x+4-4)}} \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{-[(x-2)^2-4]}} \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+4}{\sqrt{-x^2+4x}} dx + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\
 &= -\frac{1}{2} \int (-2x+4)(-x^2+4x)^{-\frac{1}{2}} dx + 3 \int \frac{\frac{1}{2} dx}{\sqrt{1-(\frac{1}{2}x-1)^2}} \\
 &= -\sqrt{-x^2+4x} + 3 \sin^{-1}(\frac{1}{2}x-1) + c
 \end{aligned}$$

$$(30) \int \frac{\cos x \, dx}{\sin^2 x + \sin x + 1} = \int \frac{\cos x \, dx}{\sin^2 x + \sin x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1}$$

$$\int \frac{\cos x \, dx}{(\sin x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \int \frac{\cos x \, dx}{\frac{(\sin x + \frac{1}{2})^2}{\frac{3}{4}} + 1}$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{\cos x \, dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{-\frac{2}{\sqrt{3}} \cos x \, dx}{[\frac{2}{\sqrt{3}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{3}}]^2 + 1}$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} [\frac{2}{\sqrt{3}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{3}}] + c$$

$$(31) \int \frac{\csc^2 x \, dx}{\cot^2 x + 2 \cot x + 2} = \int \frac{\csc^2 x \, dx}{\cot^2 x + 2 \cot x + 1 - 1 + 2}$$

$$= -\int \frac{-\csc^2 x \, dx}{(\cot x + 1)^2 + 1} = -\tan^{-1} [\cot x + 1] + c$$

$$(32) \int \frac{dx}{(\ln x^2)x + 2x \ln x + 2x} = \int \frac{dx}{x[(\ln x)^2 + 2 \ln x + 1 - 1 + 2]}$$

$$= \int \frac{\frac{1}{x} dx}{(\ln x + 1)^2 + 1} = -\tan^{-1} [\ln x + 1] + c$$

قوانين تكامل مشتقة الدوال الزائدية العكسية

$$(1) \int \frac{F'(x)}{\sqrt{[F(x)]^2 + 1}} dx = \sinh^{-1} F(x) + c$$

$$(2) \int \frac{F'(x)}{\sqrt{[F(x)]^2 - 1}} dx = \cosh^{-1} F(x) + c$$

$$(3) \int \frac{F'(x)}{1 - [F(x)]^2} dx = \tanh^{-1} F(x) + c, |F(x)| < 1$$

$$(4) \int \frac{F'(x)}{1 + [F(x)]^2} dx = \coth^{-1} F(x) + c, |F(x)| > 1$$

$$(5) \int \frac{-F'(x)}{F(x)\sqrt{1 - [F(x)]^2}} dx = \sec h^{-1} |F(x)| + c$$

$$(6) \int \frac{-F'(x)}{F(x)\sqrt{1 + [F(x)]^2}} dx = \csc h^{-1} |F(x)| + c$$

مسائل متنوعة على تكامل مشتقة الدوال الزائدية

$$\begin{aligned}
 (1) \int \frac{dx}{16-x^2} &= \frac{1}{16} \int \frac{dx}{1-\frac{x^2}{16}} = \frac{1}{16} \int \frac{dx}{1-(\frac{x}{4})^2} = \frac{1}{4} \int \frac{\frac{1}{4}dx}{1-(\frac{x}{4})^2} \\
 &= \frac{1}{4} \tanh^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) + c, \quad \left|\frac{x}{4}\right| < 1 \\
 &= \frac{1}{4} \coth^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) + c, \quad \left|\frac{x}{4}\right| > 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \int \frac{dx}{2x^2-9} &= \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\frac{2x^2}{9}-1} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{(\frac{\sqrt{2}x}{3})^2-1} = -\frac{1}{3\sqrt{2}} \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{3}dx}{1-(\frac{\sqrt{2}x}{3})^2} \\
 &= -\frac{1}{3\sqrt{2}} \tanh^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}x}{3}\right) + c, \quad \left|\frac{\sqrt{2}x}{3}\right| < 1 \\
 &= -\frac{1}{3\sqrt{2}} \coth^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}x}{3}\right) + c, \quad \left|\frac{\sqrt{2}x}{3}\right| > 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \int \frac{dx}{\sqrt{25+x^2}} &= \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{1+\frac{x^2}{25}}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{1+(\frac{x}{5})^2}} = \int \frac{\frac{1}{5}dx}{\sqrt{1+(\frac{x}{5})^2}} \\
 &= \sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-3}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{2x^2}{3}-1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}})^2-1}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} dx}{\sqrt{(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}})^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cosh^{-1}(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}}) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+25}} &= \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x\sqrt{\frac{x^2}{25}+1}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x\sqrt{(\frac{x}{5})^2+1}} \\
 &= -\frac{1}{5} \int \frac{-\frac{1}{5} dx}{\frac{1}{5} x \sqrt{(\frac{x}{5})^2+1}} = -\frac{1}{5} \csc h^{-1} \left| \frac{x}{5} \right| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \int \frac{dx}{x\sqrt{3-x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{x\sqrt{1-\frac{x^2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{x\sqrt{1-(\frac{x}{\sqrt{3}})^2}} \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}} dx}{\frac{1}{\sqrt{3}} x \sqrt{1-(\frac{x}{\sqrt{3}})^2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \sec h^{-1} \left| \frac{x}{\sqrt{3}} \right| + c
 \end{aligned}$$

مسائل متنوعة على استخدام إكمال مربع قبل التكامل

$$(1) \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 2} = \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 4 - 4 + 2} = \int \frac{dx}{(x-2)^2 - 2}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\frac{(x-2)^2}{2} - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left[\frac{x-2}{\sqrt{2}}\right]^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left[\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right]^2 - 1}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} dx}{1 - \left[\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right]^2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tanh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right) + c, \left|\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right| < 1$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \coth^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right) + c, \left|\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right| > 1$$

$$(2) \int \frac{dx}{-x^2 - 4x + 2} = \int \frac{dx}{-[x^2 + 4x + 4 - 4 - 2]} = \int \frac{dx}{-(x+2)^2 + 6}$$

$$= \frac{1}{6} \int \frac{dx}{1 - \frac{(x+2)^2}{6}} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{1 - \left[\frac{x+2}{\sqrt{6}}\right]^2} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{1 - \left[\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}\right]^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{6}} dx}{1 - \left[\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}\right]^2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \tanh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}\right) + c, \left|\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}\right| < 1$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \coth^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}\right) + c, \left|\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}\right| > 1$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 1 - 1 + 5}}$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 + 4}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{(x-1)^2}{4} + 1}}$$

$$= \int \frac{\frac{1}{2} dx}{\sqrt{(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2})^2 + 1}} = \sinh^{-1}(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}) + c$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x - 3}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 1 - 1 - 3}}$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 - 4}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{(x+1)^2}{4} - 1}}$$

$$= \int \frac{\frac{1}{2} dx}{\sqrt{(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})^2 - 1}} = \cosh^{-1}(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}) + c$$

$$(5) \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x+2}} = \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x+1-1+2}}$$

$$= -\int \frac{-dx}{(x+1)\sqrt{(x+1)^2+1}} = -\operatorname{csch}^{-1}|x+1| + c$$

$$(6) \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+2}} = \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{-[x^2-2x-2]}}$$

$$= \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{-[x^2-2x+1-1-2]}} = \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{3-(x-1)^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1-(\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{\sqrt{3}})^2}}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}}dx}{(\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{\sqrt{3}})\sqrt{1-(\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{\sqrt{3}})^2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{sech}^{-1}\left|\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{\sqrt{3}}\right| + c$$

$$\begin{aligned}
(7) \int \frac{x}{x^2+x-5} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1-1}{x^2+x-5} dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x-5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+x-5} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x-5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-5} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x-5} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 - \frac{21}{4}} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x-5} dx - \frac{2}{21} \int \frac{dx}{(\frac{2}{\sqrt{21}}x + \frac{1}{\sqrt{21}})^2 - 1} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x-5} dx + \frac{1}{\sqrt{21}} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{21}} dx}{1 - (\frac{2}{\sqrt{21}}x + \frac{1}{\sqrt{21}})^2} \\
&= \frac{1}{2} \ln|x^2+x-5| + \frac{1}{\sqrt{21}} \tanh^{-1}(\frac{2}{\sqrt{21}}x + \frac{1}{\sqrt{21}}) + C, \left| \frac{2}{\sqrt{21}}x + \frac{1}{\sqrt{21}} \right| < 1 \\
&= \frac{1}{2} \ln|x^2+x-5| + \frac{1}{\sqrt{21}} \coth^{-1}(\frac{2}{\sqrt{21}}x + \frac{1}{\sqrt{21}}) + C, \left| \frac{2}{\sqrt{21}}x + \frac{1}{\sqrt{21}} \right| > 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \int \frac{dx}{x^2+4x} &= \int \frac{dx}{x^2+4x+4-4} = \int \frac{dx}{(x+2)^2-4} \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\frac{(x+2)^2}{4}-1} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{[\frac{x+2}{2}]^2-1} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{[\frac{1}{2}x+1]^2-1} \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2}dx}{1-[\frac{1}{2}x+1]^2} = -\frac{1}{2} \tanh^{-1}(\frac{1}{2}x+1) + c, \left| \frac{1}{2}x+1 \right| < 1 \\
 &= -\frac{1}{2} \coth^{-1}(\frac{1}{2}x+1) + c, \left| \frac{1}{2}x+1 \right| > 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (9) \int \frac{dx}{-x^2+6x} &= \int \frac{dx}{-[x^2-6x+9-9]} = \int \frac{dx}{-(x-3)^2+9} \\
 &= \frac{1}{9} \int \frac{dx}{1-\frac{(x-3)^2}{9}} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{1-[\frac{x-3}{3}]^2} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{1-[\frac{1}{3}x-1]^2} \\
 &= \frac{1}{3} \int \frac{\frac{1}{3}dx}{1-[\frac{1}{3}x-1]^2} = \frac{1}{3} \tanh^{-1}(\frac{1}{3}x-1) + c, \left| \frac{1}{3}x-1 \right| < 1 \\
 &= \frac{1}{3} \coth^{-1}(\frac{1}{3}x-1) + c, \left| \frac{1}{3}x-1 \right| > 1
 \end{aligned}$$

طرق التكامل

طريقة التكامل بالتعويض:-

عند استخدام طريقة التعويض لإيجاد تكامل دالة نتبع الآتي :-

(1) نفرض أن جزءاً من مسألة التكامل يساوي متغير u وليكن u أي أن :-
مقدار u

(2) نفاضل الفرضية السابقة بالنسبة لـ x أي أن :-
 dx تفاضل المقدار du

(3) نعوض بالفرضية وتفاضلها du, u في مسألة التكامل

(4) نكامل المسألة بالنسبة لـ u ويجب أن تكون المسألة قبل تكاملها بدلالة u

(5) بعد اجراء عملية التكامل نعوض بقيمة u

ويعتمد نجاح الطالب في اجراء عملية التكامل على قدرته في تحديد جزء المسألة الذي يجب أن يفرضه u فإذا حدد u بمهارة فسيكون من السهل اجراء عملية التكامل

بعض الضوابط لاختيار u :-

(1) إذا كانت مسألة التكامل على أحد صور القوانين السابقة ففي هذه الحالة
نفرض أن $u =$ الدالة

$$\int [F(x)]^n F'(x) dx$$

نفرض أن $u=F(x)$

$$\int e^{F(x)} F'(x) dx$$

نفرض أن $u=F(x)$

$$\int a^{F(x)} F'(x) dx$$

نفرض أن $u=F(x)$

$$\int \sin F(x) F'(x) dx$$

نفرض أن $u=F(x)$

وهكذا بقية تكامل الدوال المثلثية والزاندية

$$\int \frac{F'(x)}{[F(x)]^2 + 1} dx$$

نفرض أن $u=F(x)$

وهكذا بقية تكامل مشتقة الدوال المثلثية والزاندية العكسية

(2) إذا كانت مسألة التكامل مرفوعة لأس n ففي هذه الحالة

نفرض أن :- ما بداخل القوس $u =$

$$\int [F(x)]^n g(x) dx \quad \text{نفرض أن } u=F(x)$$

(3) إذا كانت مسألة التكامل دالة قياسية ففي هذه الحالة
نفرض أن :- مقام الكسر $u =$

$$\int \frac{g(x)}{F(x)} dx \quad \text{نفرض أن } u=F(x)$$

مسائل متنوعة على طريقة التكامل بالتعويض

$$(1) \int [x^2 + 1]^9 x \, dx = \frac{1}{2} \int [x^2 + 1]^9 2x \, dx$$

(A) نفرض أن $u = x^2 + 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = 2x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = x^2 + 1$ ، $du = 2x \, dx$ في مسألة التكامل

$$\frac{1}{2} \int u^9 \, du = \frac{1}{20} u^{10} + c$$

$$= \frac{1}{20} (x^2 + 1)^{10} + c$$

(D) نعوض بـ $u = x^2 + 1$

$$(2) \int \left[\frac{1}{x} + 1\right]^5 \frac{1}{x^2} \, dx = - \int \left[\frac{1}{x} + 1\right]^5 \frac{-1}{x^2} \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \frac{1}{x} + 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\frac{1}{x^2} \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \frac{1}{x} + 1$ ، $du = -\frac{1}{x^2} \, dx$ في مسألة التكامل

$$- \int u^5 \, du = -\frac{1}{6} u^6 + c$$

$$= -\frac{1}{6} \left(\frac{1}{x} + 1\right)^6 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \frac{1}{x} + 1$

$$(3) \int \frac{x}{(x-1)^2} dx$$

(A) نفرض أن $u = x - 1$ ومنها $x = u + 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $dx = du$ ، $u = x - 1$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{u+1}{u^2} du = \int \left(\frac{1}{u} + u^{-2} \right) du$$

$$= \ln|u| - \frac{1}{u} + c$$

$$= \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + c$$

(D) نعوض بـ $u = x - 1$

$$(4) \int \frac{e^{4t}}{(1+e^{2t})^{\frac{2}{3}}} dt = \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2t}e^{2t}}{(1+e^{2t})^{\frac{2}{3}}} dt$$

(A) نفرض أن $u = 1 + e^{2t}$ ومنها $e^{2t} = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ t $du = 2e^{2t} dt$

(C) نعوض بـ $du = 2e^{2t} dt$ ، $u = 1 + e^{2t}$ في مسألة التكامل

$$\frac{1}{2} \int \frac{u-1}{u^{\frac{2}{3}}} du = \frac{1}{2} \int (u-1)u^{-\frac{2}{3}} du$$

$$= \frac{1}{2} \int (u^{\frac{1}{3}} - u^{-\frac{2}{3}}) du = \frac{3}{8}u^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{2}u^{\frac{1}{3}} + c$$

$$= \frac{3}{8}(e^{2t}+1)^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{2}(e^{2t}+1)^{\frac{1}{3}} + c \quad u = e^{2t} + 1 \rightarrow \text{نعوض بـ (D)}$$

$$(5) \int \frac{x^3}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x^2 x}{(1+x^2)^2} dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 + x^2$ ومنها $x^2 = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = 2x dx$

(C) نعوض بـ $u = 1 + x^2$ ، $du = 2x dx$ في مسألة التكامل

$$\frac{1}{2} \int \frac{u-1}{u^2} du = \frac{1}{2} \int (u-1)u^{-2} du$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{u} - u^{-2} \right) du = \frac{1}{2} \ln|u| + \frac{1}{2u} + c$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x^2 + 1| + \frac{1}{2x^2 + 2} + c \quad , \quad u = x^2 + 1 \text{ — (D) نعوض بـ}$$

$$(6) \int x [x+2]^7 dx$$

(A) نفرض أن $u = x + 2$ ومنها $x = u - 2$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $u = x + 2$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\int u^7 (u-2) du = \int (u^8 - 2u^7) du$$

$$= \frac{1}{9} u^9 - \frac{1}{4} u^8 + c$$

$$= \frac{1}{9} (x+2)^9 - \frac{1}{4} (x+2)^8 + c \quad u = x+2 \text{ — (D) نعوض بـ}$$

$$(7) \int x^2 [x+1]^7 dx$$

(A) نفرض أن $u = x+1$ ومنها $x = u-1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $u = x+1$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int u^7 (u-1)^2 du &= \int u^7 (u^2 - 2u + 1) du \\ &= \int (u^9 - 2u^8 + u^7) du = \frac{1}{10} u^{10} - \frac{2}{9} u^9 + \frac{1}{8} u^8 + c \end{aligned}$$

(D) نعوض بـ $u = x+1$

$$= \frac{1}{10} (x+1)^{10} - \frac{2}{9} (x+1)^9 + \frac{1}{8} (x+1)^8 + c$$

$$(8) \int [1 - x^{\frac{1}{3}}]^{\frac{3}{2}} dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$ ومنها $x^{\frac{1}{3}} = 1 - u$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx$

لا حظ أن:- $dx = -3(x^{\frac{1}{3}})^2 du \Leftarrow dx = -3x^{\frac{2}{3}} du$

$$dx = -3(1-u)^2 du$$

(C) نعوض بـ $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$ ، $dx = -3(1-u)^2 du$ في مسألة التكامل

$$= -3 \int u^{\frac{3}{2}} (1-u)^2 du$$

$$= -3 \int u^{\frac{3}{2}} (1 - 2u + u^2) du = -3 \int (u^{\frac{3}{2}} - 2u^{\frac{5}{2}} + u^{\frac{7}{2}}) du$$

$$= -\frac{6}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{12}{7} u^{\frac{7}{2}} - \frac{2}{3} u^{\frac{9}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$

$$= -\frac{6}{5} (1 - x^{\frac{1}{3}})^{\frac{5}{2}} + \frac{12}{7} (1 - x^{\frac{1}{3}})^{\frac{7}{2}} - \frac{2}{3} (1 - x^{\frac{1}{3}})^{\frac{9}{2}} + c$$

$$(9) \int \sqrt{x+2} \, dx$$

(A) نفرض أن $u = x + 2$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $u = x + 2$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\int \sqrt{u} \, du = \int u^{\frac{1}{2}} \, du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

$$= \frac{2}{3} (x+2)^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = x + 2$

$$(10) \int x^2 \sqrt{x+1} \, dx$$

(A) نفرض أن $u = x + 1$ ومنها $x = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $u = x + 1$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} & \int u^{\frac{1}{2}} (u-1)^2 du \\ &= \int u^{\frac{1}{2}} (u^2 - 2u + 1) du = \int (u^{\frac{5}{2}} - 2u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}}) du \\ &= \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + c \end{aligned}$$

(D) نعوض بـ $u = x+1$

$$= \frac{2}{7} (x+1)^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5} (x+1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(11) \int x\sqrt{2x-3} \, dx = \frac{1}{2} \int 2x\sqrt{2x-3} \, dx$$

(A) نفرض أن $u = 2x-3$ ومنها $x = \frac{u+3}{2}$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = 2dx$

(C) نعوض بـ $u = 2x-3$ ، $du = 2dx$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} & \int \left(\frac{u+3}{2}\right) u^{\frac{1}{2}} \frac{du}{2} \\ &= \frac{1}{4} \int (u^{\frac{3}{2}} + 3u^{\frac{1}{2}}) du = \frac{1}{10} u^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} u^{\frac{3}{2}} + c \end{aligned}$$

(D) نعوض بـ $u = 2x-3$

$$= \frac{1}{10} (2x-3)^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} (2x-3)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(12) \int e^{2x} \sqrt{e^x + 1} \, dx = \int e^x \sqrt{e^x + 1} \, e^x dx$$

(A) نفرض أن $u = e^x + 1$ ومنها $e^x = u-1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = e^x dx$ $u = e^x + 1$ نعوض بـ $du = e^x dx$ في مسألة التكامل

$$\int (u-1)u^{\frac{1}{2}} du$$

$$= \int (u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}}) du = \frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = e^x + 1$

$$= \frac{2}{5} (e^x + 1)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} (e^x + 1)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(13) \int x^3 \sqrt{x+2} dx$$

(A) نفرض أن $u = x + 2$ ومنها $x = u - 2$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعين $dx = du$:-

(D) نعوض بـ $u = x + 2$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\int u^{\frac{1}{2}} (u-2)^3 du$$

$$= \int u^{\frac{1}{2}} (u^3 - 6u^2 + 12u - 8) du = \int (u^{\frac{7}{2}} - 6u^{\frac{5}{2}} + 12u^{\frac{3}{2}} - 8u^{\frac{1}{2}}) du$$

$$= \frac{2}{9} u^{\frac{9}{2}} - \frac{12}{7} u^{\frac{7}{2}} + \frac{24}{5} u^{\frac{5}{2}} - \frac{16}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(E) نعوض بـ $u = x + 2$

$$= \frac{2}{9} (x+2)^{\frac{9}{2}} - \frac{12}{7} (x+2)^{\frac{7}{2}} + \frac{24}{5} (x+2)^{\frac{5}{2}} - \frac{16}{3} (x+2)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(14) \int 3^{2x} \sqrt{3^x + 1} \, dx = \frac{1}{\ln 3} \int 3^x \sqrt{3^x + 1} \, 3^x (\ln 3) dx$$

(A) نفرض أن $u = 3^x + 1$ ومنها $3^x = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = 3^x \ln 3 \, dx$

(C) نعوض بـ $u = 3^x + 1$ ، $du = 3^x \ln 3 \, dx$ في مسألة التكامل

$$\frac{1}{\ln 3} \int (u-1) u^{\frac{1}{2}} du$$

$$= \frac{1}{\ln 3} \int (u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}}) du = \frac{2}{5 \ln 3} u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3 \ln 3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = 3^x + 1$

$$= \frac{2}{5 \ln 3} (3^x + 1)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3 \ln 3} (3^x + 1)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(15) \int 2x^7 \sqrt{x^4 - 1} \, dx = \frac{1}{2} \int 4x^3 \sqrt{x^4 - 1} \, x^4 dx$$

(A) نفرض أن $u = x^4 - 1$ ومنها $x^4 = u + 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = 4x^3 \, dx$

(C) نعوض بـ $u = x^4 - 1$ ، $du = 4x^3 \, dx$ في مسألة التكامل

$$\frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} (u+1) du$$

$$= \frac{1}{2} \int (u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}}) du = \frac{1}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = x^4 - 1$

$$= \frac{1}{5} (x^4 - 1)^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{3} (x^4 - 1)^{\frac{3}{2}} + c$$

2 3

$$(16) \int e^{3x} \sqrt{e^x + 1} \, dx = \int e^x \sqrt{e^x + 1} \, e^{2x} dx$$

(A) نفرض أن $u = e^x + 1$ ومنها $e^x = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = e^x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = e^x + 1$ ، $du = e^x \, dx$ في مسألة التكامل

$$= \int (u-1)^2 u^{\frac{1}{2}} du$$

$$= \int (u^2 - 2u + 1) u^{\frac{1}{2}} du = \int (u^{\frac{5}{2}} - 2u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}}) du$$

$$= \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(E) نعوض بـ $u = e^x + 1$

$$= \frac{2}{7} (e^x + 1)^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5} (e^x + 1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (e^x + 1)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(17) \int \sqrt{1 + \sqrt{x}} \, dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 + \sqrt{x}$ ومنها $\sqrt{x} = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \frac{1}{2\sqrt{x}} \, dx$

لاحظ أن $dx = 2(u-1) \, du \Leftrightarrow dx = 2\sqrt{x} \, du$

(C) نعوض بـ $u = 1 + \sqrt{x}$ ، $dx = 2(u-1) \, du$ في مسألة التكامل

$$\int 2u^{\frac{1}{2}} (u-1) \, du = 2 \int (u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}}) du$$

$$= \frac{4}{5} u^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = 1 + \sqrt{x}$

$$= \frac{4}{5} (1 + \sqrt{x})^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3} (1 + \sqrt{x})^{\frac{3}{2}} + c$$

(18) $\int \frac{1+x}{\sqrt{1-x}} dx$

(A) نفرض أن $u = 1 - x$ ومنها $x = 1 - u$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -dx$

(C) نعوض بـ $u = 1 - x$ ، $dx = -du$ في مسألة التكامل

$$- \int \frac{1+1-u}{u^{\frac{1}{2}}} du = - \int \frac{2-u}{u^{\frac{1}{2}}} du$$

$$= - \int (2-u) u^{-\frac{1}{2}} du = - \int (2u^{-\frac{1}{2}} - u^{\frac{1}{2}}) du$$

$$= -4u^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = 1 - x$

$$= -4(1-x)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$= -4\sqrt{1-x} + \frac{2}{3}\sqrt{(1-x)^3} + c$$

(19) $\int \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$

(A) نفرض أن $u = x + 1$ ومنها $x = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $u = x + 1$, $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{u-1}{u^{\frac{1}{2}}} du = \int (u-1)u^{-\frac{1}{2}} du$$

$$= \int (u^{\frac{1}{2}} - u^{-\frac{1}{2}}) du = \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} - 2u^{\frac{1}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = x + 1$

$$= \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} - 2(x+1)^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3} - 2\sqrt{x+1} + c$$

$$(20) \int \frac{x^5}{\sqrt{4-x^3}} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{-3x^2 x^3}{\sqrt{4-x^3}} dx$$

(A) نفرض أن $u = 4 - x^3$ ومنها $x^3 = 4 - u$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -3x^2 dx$

(C) نعوض بـ $u = 4 - x^3$, $du = -3x^2 dx$ في مسألة التكامل

$$-\frac{1}{3} \int \frac{4-u}{u^{\frac{1}{2}}} du$$

$$= -\frac{1}{3} \int (4-u)u^{-\frac{1}{2}} du$$

$$= -\frac{1}{3} \int (4u^{-\frac{1}{2}} - u^{\frac{1}{2}}) du = -\frac{8}{3}u^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{9}u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = 4 - x^3$

$$= -\frac{8}{3}(4-x^3)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{9}(4-x^3)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$= -\frac{8}{3}\sqrt{4-x^3} + \frac{2}{9}\sqrt{(4-x^3)^3} + c$$

$$(21) \int \frac{e^{2x}}{\sqrt[3]{1+e^x}} dx = \int \frac{e^x e^x}{\sqrt[3]{1+e^x}} dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 + e^x$ ومنها $e^x = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = e^x dx$

(C) نعوض بـ $u = 1 + e^x$ ، $du = e^x dx$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{u-1}{u^{\frac{1}{3}}} du$$

$$= \int (u-1)u^{-\frac{1}{3}} du$$

$$= \int (u^{\frac{2}{3}} - u^{-\frac{1}{3}}) du = \frac{3}{5}u^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{2}u^{\frac{2}{3}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = 1 + e^x$

$$= \frac{3}{5}(1+e^x)^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{2}(1+e^x)^{\frac{2}{3}} + c$$

$$= \frac{3}{5}\sqrt[3]{(1+e^x)^5} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{(1+e^x)^2} + c$$

$$(22) \int \frac{dx}{\sqrt{1+\sqrt{x}}}$$

(A) نفرض أن $u = 1 + \sqrt{x}$ ومنها $\sqrt{x} = u - 1$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{لا أن: } dx = 2(u-1) du \Leftrightarrow dx = 2\sqrt{x} du$$

$$(C) \text{ نعوض بـ } u = 1 + \sqrt{x} \text{ ، } dx = 2(u-1) du \text{ في مسألة التكامل}$$

$$\int \frac{2u-2}{u^{\frac{1}{2}}} du = \int (2u-2)u^{-\frac{1}{2}} du$$

$$= \int (2u^{\frac{1}{2}} - 2u^{-\frac{1}{2}}) du = \frac{4}{3}u^{\frac{3}{2}} - 4u^{\frac{1}{2}} + c$$

$$(D) \text{ نعوض بـ } u = 1 + \sqrt{x}$$

$$= \frac{4}{3}(1 + \sqrt{x})^{\frac{3}{2}} - 4(1 + \sqrt{x})^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= \frac{4}{3}\sqrt{(1 + \sqrt{x})^3} - 4\sqrt{1 + \sqrt{x}} + c$$

$$(23) \int \frac{dx}{x^{\frac{1}{5}}\sqrt{1+x^{\frac{4}{5}}}} = \frac{5}{4} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^{\frac{4}{5}}}} \frac{4}{5} x^{-\frac{1}{5}} dx$$

$$(A) \text{ نفرض أن } u = 1 + x^{\frac{4}{5}} \text{ ومنها } x^{\frac{4}{5}} = u - 1$$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = \frac{4}{5} x^{-\frac{1}{5}} dx$$

$$(C) \text{ نعوض بـ } u = 1 + x^{\frac{4}{5}} \text{ ، } dx = \frac{5}{4} x^{\frac{1}{5}} du \text{ في مسألة التكامل}$$

$$= \frac{5}{4} \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{5}{2} u^{\frac{1}{2}} + c$$

$$(D) \text{ نعوض بـ } u = 1 + x^{\frac{4}{5}}$$

$$= \frac{5}{2}(1+x^{\frac{4}{5}})^{\frac{1}{2}} + c = \frac{5}{2}\sqrt{1+x^{\frac{4}{5}}} + c$$

$$(24) \int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x x^4}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 + x^2$ ومنها $x^2 = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = 2x dx$

(C) نعوض بـ $u = 1 + x^2$ ، $du = 2x dx$ في مسألة التكامل

$$\frac{1}{2} \int \frac{(u-1)^2}{u^{\frac{1}{2}}} du = \frac{1}{2} \int \frac{u^2 - 2u + 1}{u^{\frac{1}{2}}} du$$

$$= \frac{1}{2} \int (u^{\frac{3}{2}} - 2u^{\frac{1}{2}} + u^{-\frac{1}{2}}) du = \frac{1}{5}u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = 1 + x^2$

$$= \frac{1}{5}(1+x^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= \frac{1}{5}\sqrt{(1+x^2)^5} - \frac{2}{3}\sqrt{(1+x^2)^3} + \sqrt{1+x^2} + c$$

$$(25) \int x^3 \sqrt{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \int x^2 \sqrt{x^2-1} 2x dx$$

(A) نفرض أن $u = x^2 - 1$ ومنها $x^2 = u + 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = 2x dx$

(C) نعوض بـ $u = x^2 - 1$ ، $du = 2x dx$ في مسألة التكامل

$$= \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} (u+1) du$$

$$= \frac{1}{2} \int (u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}}) du = \frac{1}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = x^2 - 1$

$$= \frac{1}{5} (x^2 - 1)^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{3} (x^2 - 1)^{\frac{3}{2}} + c = \frac{1}{5} \sqrt{(x^2 - 1)^5} + \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - 1)^3} + c$$

$$(26) \int x \sqrt{x-1} dx$$

(A) نفرض أن $u = x - 1$ ومنها $x = u + 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $u = x - 1$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$= \int (u+1) u^{\frac{1}{2}} du$$

$$= \int (u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}}) du = \frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = x - 1$

$$= \frac{2}{5} (x-1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{5} \sqrt{(x-1)^5} + \frac{2}{3} \sqrt{(x-1)^3} + c$$

$$(27) \int x \sqrt[3]{x-1} dx$$

(A) نفرض أن $u = x - 1$ ومنها $x = u + 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$

(C) نعوض بـ $u = x - 1$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
 &= \int (u+1)u^{\frac{1}{5}} du \\
 &= \int (u^{\frac{6}{5}} + u^{\frac{1}{5}}) du = \frac{5}{11} u^{\frac{11}{5}} + \frac{5}{6} u^{\frac{6}{5}} + c \\
 &\quad u = x-1 \text{ نعوض بـ (D)} \\
 &= \frac{5}{11} (x-1)^{\frac{11}{5}} + \frac{5}{6} (x-1)^{\frac{6}{5}} + c = \frac{5}{11} \sqrt[5]{(x-1)^{11}} + \frac{5}{6} \sqrt[5]{(x-1)^6} + c
 \end{aligned}$$

$$(28) \int \frac{x+2}{x+1} dx$$

- (A) نفرض أن $u = x+1$ ومنها $x = u-1$
 (B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$
 (C) نعوض بـ $u = x+1$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{u-1+2}{u} du = \int \frac{u+1}{u} du \\
 &= \int (1 + \frac{1}{u}) du = u + \ln|u| + c \\
 &\quad u = x+1 \text{ نعوض بـ (D)} \\
 &= x+1 + \ln|x+1| + c
 \end{aligned}$$

$$(29) \int \frac{x}{x-1} dx$$

- (A) نفرض أن $u = x-1$ ومنها $x = u+1$
 (B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = dx$
 (C) نعوض بـ $u = x-1$ ، $dx = du$ في مسألة التكامل

$$= \int \frac{u+1}{u} du = \int (1 + \frac{1}{u}) du = u + \ln|u| + c$$

(D) نعوض بـ $u = x - 1$

$$= x - 1 + \ln|x - 1| + c$$

$$(30) \int \frac{1+e^x}{1-e^x} dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 - e^x$ ومنها $e^x = 1 - u$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -e^x dx$

$$dx = -\frac{du}{1-u} \Leftarrow dx = -\frac{du}{e^x} \text{ لا حظ أن :}$$

(C) نعوض بـ $u = 1 - e^x$ في مسألة التكامل $dx = -\frac{du}{1-u}$

$$= -\int \frac{1+1-u}{u(1-u)} du = -\int \frac{-(u-2)}{-(u^2-u)} du$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{2u-4}{u^2-u} du = -\frac{1}{2} \int \frac{2u-1}{u^2-u} du + \frac{3}{2} \int \frac{du}{u^2-u+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}}$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{2u-1}{u^2-u} du + \frac{3}{2} \int \frac{du}{(u-\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{2u-1}{u^2-u} du - 3 \int \frac{2du}{1-(2u-1)^2}$$

$$= -\frac{1}{2} \ln|u^2-u| - 3 \tanh^{-1}(2u-1) + c, |2u-1| < 1$$

$$= -\frac{1}{2} \ln|u^2-u| - 3 \coth^{-1}(2u-1) + c, |2u-1| > 1$$

(D) نعوض بـ $u = 1 - e^x$

$$= -\frac{1}{2} \ln |(1-e^x)^2 - 1 + e^x| - 3 \tanh^{-1}(1-2e^x) + c, |1-2e^x| < 1$$

$$= -\frac{1}{2} \ln |(1-e^x)^2 - 1 + e^x| - 3 \coth^{-1}(1-2e^x) + c, |1-2e^x| > 1$$

$$(31) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$$

(A) نفرض أن $u = 1 + \sqrt{x}$ ومنها $\sqrt{x} = u - 1$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$

لاحظ أن :- $dx = 2(u-1) du \Leftarrow dx = 2\sqrt{x} du$

(C) نعوض بـ $u = 1 + \sqrt{x}$ ، $dx = 2(u-1) du$ في مسألة التكامل

$$= \int \frac{2u-2}{u} du = \int (2 - \frac{2}{u}) du$$

$$= 2u - 2 \ln|u| + c$$

(D) نعوض بـ $u = 1 + \sqrt{x}$

$$= 2(1 + \sqrt{x}) - 2 \ln|1 + \sqrt{x}| + c$$

$$(32) \int \frac{e^{2x}}{1-e^x} dx = - \int \frac{e^x}{1-e^x} (-e^x) dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 - e^x$ ومنها $e^x = 1 - u$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -e^x dx$

(C) نعوض بـ $u = 1 - e^x$ ، $du = -e^x dx$ في مسألة التكامل

$$= - \int \frac{1-u}{u} du$$

$$= - \int \left(\frac{1}{u} - 1 \right) du = - \ln|u| + u + c$$

$$u = 1 - e^x \rightarrow \text{نعوض بـ (D)}$$

$$= - \ln|1 - e^x| + 1 - e^x + c$$

$$(33) \int \frac{x}{1+\sqrt{x}} dx$$

$$(A) \text{ نفرض أن } u = 1 + \sqrt{x} \text{ ومنها } x = (u-1)^2, \sqrt{x} = u-1$$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{لا حظ أن :- } dx = 2(u-1) du \Leftarrow dx = 2\sqrt{x} du$$

$$(C) \text{ نعوض بـ } u = 1 + \sqrt{x}, \quad dx = 2(u-1) du \text{ في مسألة التكامل}$$

$$= 2 \int \frac{(u-1)^2(u-1)}{u} du$$

$$2 \int \frac{(u-1)^3}{u} du = 2 \int \left(\frac{u^3 - 3u^2 + 3u - 1}{u} \right) du$$

$$2 \int \left(u^2 - 3u + 3 - \frac{1}{u} \right) du = \frac{2}{3}u^3 - 3u^2 + 6u - 2 \ln|u| + c$$

$$u = 1 + \sqrt{x} \rightarrow \text{نعوض بـ (D)}$$

$$= \frac{2}{3}(1 + \sqrt{x})^3 - 3(1 + \sqrt{x})^2 + 6(1 + \sqrt{x}) - 2 \ln|1 + \sqrt{x}| + c$$

$$(34) \int \frac{dx}{1-\sqrt[3]{x}}$$

$$(A) \text{ نفرض أن } u = 1 - x^{\frac{1}{3}} \text{ ومنها } x^{\frac{1}{3}} = 1 - u$$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} dx$

لاحظ أن :- $dx = -3(x^{\frac{1}{3}})^2 du \Leftarrow dx = -3x^{\frac{2}{3}} du$

$dx = -3(1-u)^2 du \Leftarrow$

(C) نعوض بـ $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$ في مسألة التكامل

$= -3 \int \frac{(1-u)^2}{u} du$

$= -3 \int \frac{1-2u+u^2}{u} du = -3 \int (\frac{1}{u} - 2 + u) du$

$= -3 \ln|u| + 6u - \frac{3}{2}u^2 + c$

(D) نعوض بـ $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$

$= -3 \ln \left| 1 - x^{\frac{1}{3}} \right| + 6(1 - x^{\frac{1}{3}}) - \frac{3}{2}(1 - x^{\frac{1}{3}})^2 + c$

(35) $\int \frac{1+\sqrt[3]{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx$

(A) نفرض أن $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$ ومنها $x^{\frac{1}{3}} = 1 - u$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} dx$

لاحظ أن :- $dx = -3(x^{\frac{1}{3}})^2 du \Leftarrow dx = -3x^{\frac{2}{3}} du$

$dx = -3(1-u)^2 du \Leftarrow$

(C) نعوض بـ $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
 & - \int \frac{-u+1+1}{u} 3(1-u)^2 du = -3 \int \frac{(2-u)(1-u)^2}{u} du \\
 & = -3 \int \left(\frac{-u^3 + 4u^2 - 5u + 2}{u} \right) du \\
 & = -3 \int \left(-u^2 + 4u - 5 + \frac{2}{u} \right) du = u^3 - 6u^2 + 15u - 6 \ln|u| + c
 \end{aligned}$$

(D) نعوض بـ $u = 1 - x^{\frac{1}{3}}$

$$= (1 - x^{\frac{1}{3}})^3 - 6(1 - x^{\frac{1}{3}})^2 + 15(1 - x^{\frac{1}{3}}) - 6 \ln|1 - x^{\frac{1}{3}}| + c$$

$$(36) \int \frac{x^2}{1-x} dx$$

(A) نفرض أن $u = 1 - x$ ومنها $x = 1 - u$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -dx$

(C) نعوض بـ $u = 1 - x$ ، $dx = -du$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
 & - \int \frac{(1-u)^2}{u} du = - \int \frac{u^2 - 2u + 1}{u} du \\
 & = - \int \left(u - 2 + \frac{1}{u} \right) du = - \frac{1}{2} u^2 + 2u - \ln|u| + c
 \end{aligned}$$

(D) نعوض بـ $u = 1 - x$

$$= - \frac{1}{2} (1-x)^2 + 2(1-x) - \ln|1-x| + c$$

$$(37) \int \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)}$$

(A) نفرض أن $u = \sqrt{x}$ ومنها $x = u^2$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$

لاحظ أن :- $dx = 2u du \Leftrightarrow dx = 2\sqrt{x} du$

(C) نعوض بـ $u = \sqrt{x}$ ، $dx = 2u du$ في مسألة التكامل

$$= \int \frac{2u}{u(u^2 + 1)} du$$

$$= 2 \int \frac{1}{(u^2 + 1)} du = 2 \tan^{-1} u + c$$

(D) نعوض بـ $u = \sqrt{x}$

$$= 2 \tan^{-1} \sqrt{x} + c$$

$$(38) \int \frac{dx}{x(\sqrt[3]{x} + 1)}$$

(A) نفرض أن $u = \sqrt[3]{x} + 1$ ومنها $x^{\frac{1}{3}} = u - 1$ ومنها $x = (u - 1)^3$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx$

لاحظ أن :- $dx = 3(x^{\frac{1}{3}})^2 du \Leftrightarrow dx = 3x^{\frac{2}{3}} du$

$$dx = 3(u - 1)^2 du \Leftrightarrow$$

(C) نعوض بـ $u = \sqrt[3]{x} + 1$ ، $dx = 3(u - 1)^2 du$ في مسألة التكامل

$$= 3 \int \frac{(u - 1)^2 du}{u(u - 1)^3} = 3 \int \frac{1}{u(u - 1)} du$$

$$= 3 \int \frac{du}{u^2 - u + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}} = 3 \int \frac{du}{(u - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}$$

$$= 12 \int \frac{du}{(2u-1)^2 - 1} = -6 \int \frac{2du}{1 - (2u-1)^2}$$

$$= -6 \tanh^{-1}(2u-1) + c, |2u-1| < 1$$

$$= -6 \coth^{-1}(2u-1) + c, |2u-1| > 1$$

$$u = \sqrt[3]{x} + 1 \rightarrow \text{نعوض بـ (D)}$$

$$= -6 \tanh^{-1}(2\sqrt[3]{x} + 1) + c, |2\sqrt[3]{x} + 1| < 1$$

$$= -6 \coth^{-1}(2\sqrt[3]{x} + 1) + c, |2\sqrt[3]{x} + 1| > 1$$

$$(39) \int \frac{dx}{x + \sqrt{x}}$$

$$(A) \text{ نفرض أن } u = \sqrt{x} \text{ ومنها } x = u^2$$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{لاحظ أن :- } dx = 2u \, du \Leftarrow dx = 2\sqrt{x} \, du$$

$$(C) \text{ نعوض بـ } u = \sqrt{x}, \quad dx = 2\sqrt{x} \, du \text{ في مسألة التكامل}$$

$$= \int \frac{2u}{u(u+1)} \, du = \int \frac{2}{u+1} \, du = 2 \ln|u+1| + c$$

$$u = \sqrt{x} \rightarrow \text{نعوض بـ (D)}$$

$$= 2 \ln|\sqrt{x} + 1| + c$$

طريقة التعويض لتكامل الدوال المثلثية والزائدية

إذا كانت مسألة التكامل على أحد الصور الآتية :-

$$(1) \int \sin^n x \cos^m x dx$$

$$(2) \int \sec^n x \tan^m x dx$$

$$(3) \int \csc^n x \cot^m x dx$$

ففي هذه الحالة نجعل مسألة التكامل على صورة

$$\int dx \text{ (تفاضل النسبة المثلثية) (النسبة المثلثية)}$$

وذلك باستخدام المتطابقات ثم نفرض أن النسبة المثلثية $u =$

ملاحظة :- إذا فرضنا أن $u = \sec x$ أو $u = \csc x$ ففي هذه الحالة ليس من الضروري أن نوفر $\sec x$ أو $\csc x$ في تفاضل كلا منهما وأيضاً إذا كانت مسألة التكامل على أحد الصور الآتية :-

$$(1) \int \sinh^n x \cosh^m x dx$$

$$(2) \int \operatorname{sech}^n x \tanh^m x dx$$

$$(3) \int \operatorname{csch}^n x \coth^m x dx$$

ففي هذه الحالة نجعل مسألة التكامل على صورة

$$\int dx \text{ (تفاضل النسبة الزائدية) (النسبة الزائدية)}$$

وذلك باستخدام المتطابقات ثم نفرض أن النسبة الزائدية $u =$

ملاحظة :- إذا فرضنا أن $u = \operatorname{sech} x$ أو $u = \operatorname{csch} x$ ففي هذه الحالة ليس من الضروري أن نوفر $\operatorname{sech} x$ أو $\operatorname{csch} x$ في تفاضل كلا منهما

مسائل على طريقة التعويض لتكامل الدوال المثلثية والزائدية

$$(1) \int \sin^3 x \cos^{\frac{1}{2}} x dx$$

$$\int \sin^2 x \sin x \cos^{\frac{1}{2}} x dx = - \int (1 - \cos^2 x) \sin x \cos^{\frac{1}{2}} x dx$$

(A) نفرض أن $u = \cos x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\sin x dx$

(C) نعوض بـ $u = \cos x$ ، $du = -\sin x dx$ في مسألة التكامل

$$- \int (1 - u^2) u^{\frac{1}{2}} du = - \int (u^{\frac{1}{2}} - u^{\frac{5}{2}}) du$$

$$= -\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} + c \quad \checkmark$$

(D) نعوض بـ $u = \cos x$

$$= -\frac{2}{3} \cos^{\frac{3}{2}}(x) + \frac{2}{7} \cos^{\frac{7}{2}}(x) + c$$

$$(2) \int \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx$$

$$\int \cos^2 x \cos x \sin^{\frac{1}{2}} x dx = \int (1 - \sin^2 x) \cos x \sin^{\frac{1}{2}} x dx$$

(A) نفرض أن $u = \sin x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \cos x dx$

(D) نعوض بـ $u = \sin x$ ، $du = \cos x dx$ في مسألة التكامل

$$\int (1-u^2) u^{\frac{1}{2}} du = \int (u^{\frac{1}{2}} - u^{\frac{5}{2}}) du$$

$$= \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} + c$$

(E) نعوض بـ $u = \sin x$

$$= \frac{2}{3} \sin^{\frac{3}{2}} x - \frac{2}{7} \sin^{\frac{7}{2}} x + c$$

$$(3) \int \sinh^3 x \cosh^{\frac{1}{3}} x dx$$

$$\int \sinh^2 x \sinh x \cosh^{\frac{1}{3}} x dx = \int (\cosh^2 x - 1) \sinh x \cosh^{\frac{1}{3}} x dx$$

(A) نفرض أن $u = \cosh x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sinh x dx$

(C) نعوض بـ $u = \cosh x$ ، $du = \sinh x dx$ في مسألة التكامل

$$\int (u^2 - 1) u^{\frac{1}{3}} du = \int (u^{\frac{7}{3}} - u^{\frac{1}{3}}) du$$

$$= \frac{3}{10} u^{\frac{10}{3}} - \frac{3}{4} u^{\frac{4}{3}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = \cosh x$

$$= \frac{3}{10} \cosh^{\frac{10}{3}} x - \frac{3}{4} \cosh^{\frac{4}{3}} x + c$$

$$(4) \int \cosh^3 x \sqrt{\sinh x} dx$$

$$\int \cosh^2 x \cosh x \sinh^{\frac{1}{2}} x dx = \int (1 + \sinh^2 x) \cosh x \sinh^{\frac{1}{2}} x dx$$

(A) نفرض أن $u = \sinh x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \cosh x dx$

(C) نعوض بـ $u = \sinh x$ ، $du = \cosh x dx$ في مسألة التكامل

$$\int (1+u^2) u^{\frac{1}{2}} du = \int (u^{\frac{1}{2}} + u^{\frac{5}{2}}) du$$

$$= \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = \sinh x$

$$= \frac{2}{3} \sinh^{\frac{3}{2}} x + \frac{2}{7} \sinh^{\frac{7}{2}} x + c$$

$$(5) \int \sin^3 x \cos^2 x dx$$

$$\int \sin^2 x \sin x \cos^2 x dx = - \int (1 - \cos^2 x) \sin x \cos^2 x dx$$

(A) نفرض أن $u = \cos x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\sin x dx$

(C) نعوض بـ $u = \cos x$ ، $du = -\sin x dx$ في مسألة التكامل

$$- \int (1-u^2) u^2 du = - \int (u^2 - u^4) du$$

$$= -\frac{1}{3} u^3 + \frac{1}{5} u^5 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \cos x$

$$= -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{5} \cos^5 x + c$$

$$(6) \int \cos^5 x \sin^2 x dx$$

$$\int \cos^2 x \cos^2 x \cos x \sin^2 x dx = \int (1 - \sin^2 x)^2 \cos x \sin^2 x dx$$

(A) نفرض أن $u = \sin x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \cos x dx$

(C) نعوض بـ $u = \sin x$ ، $du = \cos x dx$ في مسألة التكامل

$$\int (1-u^2)^2 u^2 du$$

$$\int (1-2u^2+u^4) u^2 du = \int (u^2-2u^4+u^6) du$$

$$= \frac{1}{3}u^3 - \frac{2}{5}u^5 + \frac{1}{7}u^7 + c$$

(E) نعوض بـ $u = \sin x$

$$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{2}{5}\sin^5 x + \frac{1}{7}\sin^7 x + c$$

$$(7) \int \tan^5 x \sec^4 x dx$$

$$\int \tan^5 x \sec^2 x \sec^2 x dx = \int \tan^5 x (1+\tan^2 x) \sec^2 x dx$$

(A) نفرض أن $u = \tan x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec^2 x dx$

(C) نعوض بـ $u = \tan x$ ، $du = \sec^2 x dx$ في مسألة التكامل

$$\int u^5 (1+u^2) du$$

$$= \int (u^5 + u^7) du$$

$$= \frac{1}{6}u^6 + \frac{1}{8}u^8 + c$$

(E) نعوض بـ $u = \tan x$

$$= \frac{1}{6}\tan^6 x + \frac{1}{8}\tan^8 x + c$$

$$(8) \int \tan^3 x \sec^5 x \, dx$$

$$\int \tan x \tan^2 x \sec^5 x \, dx = \int \tan x \sec x (\sec^2 x - 1) \sec^4 x \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \sec x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec x \tan x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \sec x$ ، $du = \sec x \tan x \, dx$ في مسألة التكامل

$$\int u^4 (u^2 - 1) \, du = \int (u^6 - u^4) \, du$$

$$= \frac{1}{7} u^7 - \frac{1}{5} u^5 + c$$

(E) نعوض بـ $u = \sec x$

$$= \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{1}{5} \sec^5 x + c$$

$$(9) \int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$$

$$\int \tan x \tan^2 x \sec^3 x \, dx = \int \tan x \sec x (\sec^2 x - 1) \sec^2 x \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \sec x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec x \tan x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \sec x$ ، $du = \sec x \tan x \, dx$ في مسألة التكامل

$$\int u^2 (u^2 - 1) \, du = \int (u^4 - u^2) \, du$$

$$= \frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{3} u^3 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \sec x$

$$= \frac{1}{5} \sec^5 x - \frac{1}{3} \sec^3 x + c$$

$$(10) \int \cot^3 x \csc^5 x \, dx$$

$$\int \cot x \cot^2 x \csc^5 x \, dx = - \int -\cot x \csc x (\csc^2 x - 1) \csc^4 x \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \csc x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\csc x \cot x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \csc x$ ، $du = -\csc x \cot x \, dx$ في مسألة التكامل

$$- \int u^4 (u^2 - 1) \, du = \int (-u^4 + u^6) \, du = -\frac{1}{5}u^5 + \frac{1}{7}u^7 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \csc x$

$$= -\frac{1}{5}\csc^5 x + \frac{1}{7}\csc^7 x + c$$

$$(11) \int \cot^5 x \csc^4 x \, dx$$

$$\int \cot^5 x \csc^2 x \csc^2 x \, dx = - \int -\cot^5 x (1 + \cot^2 x) \csc^2 x \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \cot x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\csc^2 x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \cot x$ ، $du = -\csc^2 x \, dx$ في مسألة التكامل

$$- \int u^5 (1 + u^2) \, du$$

$$= - \int (u^5 + u^7) \, du$$

$$= -\frac{1}{6}u^6 - \frac{1}{8}u^8 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \cot x$

$$= -\frac{1}{6}\cot^6 x - \frac{1}{8}\cot^8 x + c$$

$$(12) \int \cos x \sin^2 2x \, dx$$

$$\int \cos x (2 \cos x \sin x)^2 \, dx = 4 \int \cos^3 x \sin^2 x \, dx$$

$$4 \int \cos^2 x \cos x \sin^2 x \, dx = 4 \int (1 - \sin^2 x) \cos x \sin^2 x \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \sin x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \cos x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \sin x$ ، $du = \cos x \, dx$ في مسألة التكامل

$$4 \int u^2 (1 - u^2) \, du$$

$$4 \int (u^2 - u^4) \, du = \frac{4}{3} u^3 - \frac{4}{5} u^5 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \sin x$

$$= \frac{4}{3} \sin^3 x - \frac{4}{5} \sin^5 x + c$$

$$(13) \int \frac{\sec^4 x}{\tan^2 x} \, dx$$

$$\int \frac{\sec^2 x \sec^2 x}{\tan^2 x} \, dx = \int \frac{(1 + \tan^2 x) \sec^2 x}{\tan^2 x} \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \tan x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec^2 x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \tan x$ ، $du = \sec^2 x \, dx$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{(1 + u^2)}{u^2} \, du$$

$$= \int \left(\frac{1}{u^2} + 1 \right) \, du = -\frac{1}{u} + u + c$$

(E) نعوض بـ $u = \tan x$

$$= -\frac{1}{\tan x} + \tan x + c$$

$$(14) \int \frac{\cot^3 x}{\csc^2 x} dx$$

$$\int \frac{\cot x \cot^2 x}{\csc^2 x} dx = - \int \frac{\cot x (\csc^2 x - 1)}{\csc^2 x} dx$$

(A) نفرض أن $u = \csc x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\csc x \cot x dx$

لاحظ أن: $-\cot x dx = \frac{du}{u} \Leftarrow du = -u \cot x dx$

(C) نعوض بـ $u = \csc x$ ، $-\cot x dx = \frac{du}{u}$ في مسألة التكامل

$$= \int \frac{-(u^2 - 1)}{u^2} \cdot \frac{du}{u}$$

$$= - \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u^3} \right) du = -\ln|u| - \frac{1}{2u^2} + c$$

(E) نعوض بـ $u = \csc x$

$$= -\ln|\csc x| - \frac{1}{2\csc^2 x} + c$$

$$(15) \int \frac{\sin^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx$$

$$\int \frac{\sin x \sin^2 x}{\sqrt{\cos x}} dx = - \int \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)}{\sqrt{\cos x}} dx$$

(A) نفرض أن $u = \cos x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\sin x dx$

(C) نعوض بـ $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$ في مسألة التكامل

$$= - \int \frac{(1-u^2)}{u^{\frac{1}{2}}} du$$

$$= - \int (u^{-\frac{1}{2}} - u^{\frac{3}{2}}) du = -2u^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{5}u^{\frac{5}{2}} + c$$

(D) نعوض بـ $u = \cos x$

$$= -2\cos^{\frac{1}{2}} x + \frac{2}{5}\cos^{\frac{5}{2}} x + c$$

$$(16) \int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx$$

$$\int \frac{\sin x \sin^2 x}{\cos^2 x} dx = - \int \frac{\sin x (1-\cos^2 x)}{\cos^2 x} dx$$

(A) نفرض أن $u = \cos x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\sin x dx$

(C) نعوض بـ $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$ في مسألة التكامل

$$= - \int \frac{(1-u^2)}{u^2} du$$

$$= - \int (u^{-2} - 1) du = \frac{1}{u} + u + c$$

(D) نعوض بـ $u = \cos x$

$$= \frac{1}{\cos x} + \cos x + c$$

$$(17) \int \frac{\sin 2x}{2+\cos x} dx = - \int \frac{2\sin x \cos x}{2+\cos x} dx$$

(A) نفرض أن $u = 2+\cos x$ ومنها $\cos x = u-2$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\sin x dx$
 (C) نعوض بـ $u = 2 + \cos x$, $du = -\sin x dx$ في مسألة التكامل

$$= -2 \int \frac{(u-2)}{u} du = \int -2 du + \int \frac{4}{u} du$$

$$= -2u + 4 \ln|u| + c$$

(D) نعوض بـ $u = 2 + \cos x$

$$= -4 - 2 \cos x + 4 \ln|2 + \cos x| + c$$

$$(18) \int \frac{\sin x}{\tan x + \cos x} dx = \int \frac{\sin x}{\frac{\sin x}{\cos x} + \cos x} dx$$

$$\int \frac{\sin x}{\frac{\sin x + \cos^2 x}{\cos x}} dx = \int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos^2 x} dx$$

$$= \int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + 1 - \sin^2 x} dx = \int \frac{-\sin x \cos x}{\sin^2 x - \sin x - 1} dx$$

(A) نفرض أن $u = \sin x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \cos x dx$

(C) نعوض بـ $u = \sin x$, $du = \cos x dx$ في مسألة التكامل

$$= \int \frac{-u}{u^2 - u - 1} du = -\frac{1}{2} \int \frac{2u - 1 + 1}{u^2 - u - 1} du$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{2u - 1}{u^2 - u - 1} du - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 - u - 1}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \int \frac{2u-1}{u^2-u-1} du - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2-u+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-1} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{2u-1}{u^2-u-1} du - \frac{1}{2} \int \frac{du}{(u-\frac{1}{2})^2-\frac{5}{4}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{2u-1}{u^2-u-1} du + \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{5}} du}{1-(\frac{2}{\sqrt{5}}u-\frac{1}{\sqrt{5}})^2} \\
&= -\frac{1}{2} \ln|u^2-u-1| + \frac{1}{\sqrt{5}} \tanh^{-1}(\frac{2}{\sqrt{5}}u-\frac{1}{\sqrt{5}}) + c, \left|\frac{2}{\sqrt{5}}u-\frac{1}{\sqrt{5}}\right| < 1 \\
&= -\frac{1}{2} \ln|u^2-u-1| + \frac{1}{\sqrt{5}} \coth^{-1}(\frac{2}{\sqrt{5}}u-\frac{1}{\sqrt{5}}) + c, \left|\frac{2}{\sqrt{5}}u-\frac{1}{\sqrt{5}}\right| > 1
\end{aligned}$$

(E) عوض بـ $u = \sin x$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \ln|\sin^2 x - \sin x - 1| + \frac{1}{\sqrt{5}} \tanh^{-1}(\frac{2}{\sqrt{5}}\sin x - \frac{1}{\sqrt{5}}) + c, \left|\frac{2}{\sqrt{5}}\sin x - \frac{1}{\sqrt{5}}\right| < 1 \\
&= -\frac{1}{2} \ln|\sin^2 x - \sin x - 1| + \frac{1}{\sqrt{5}} \coth^{-1}(\frac{2}{\sqrt{5}}\sin x - \frac{1}{\sqrt{5}}) + c, \left|\frac{2}{\sqrt{5}}\sin x - \frac{1}{\sqrt{5}}\right| > 1
\end{aligned}$$

(19) $\int \cos^5 x \, dx$

$$\int \cos^2 x \cos^2 x \cos x \, dx = \int (1 - \sin^2 x)^2 \cos x \, dx$$

(A) نفرض أن $u = \sin x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \cos x \, dx$

(C) نعوض بـ $u = \sin x$, $du = \cos x \, dx$ في مسألة التكامل

$$\int (1-u^2)^2 du$$

$$\int (1-2u^2+u^4) du = u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \sin x$

$$= \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + c$$

$$(20) \int \sin^5 x dx$$

$$\int \sin^2 x \sin^2 x \sin x dx = - \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx$$

(A) نفرض أن $u = \cos x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\sin x dx$

(C) نعوض بـ $u = \cos x$ ، $du = -\sin x dx$ في مسألة التكامل

$$- \int (1-u^2)^2 du$$

$$- \int (1-2u^2+u^4) du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \cos x$

$$= -\cos x + \frac{2}{3} \cos^3 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + c$$

$$(21) \int \sec^6 x dx$$

$$\int \sec^2 x \sec^2 x \sec^2 x dx = \int (1 + \tan^2 x)^2 \sec^2 x dx$$

(A) نفرض أن $u = \tan x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec^2 x dx$

(C) نعوض بـ $u = \tan x$ ، $du = \sec^2 x dx$ في مسألة التكامل

$$\int (1+u^2)^2 du$$

$$= \int (1+2u^2+u^4) du = u + \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5 + c$$

(D) نعوض بـ $u = \tan x$

$$= \tan x + \frac{2}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + c$$

$$(22) \int \csc^6 x dx$$

$$\int \csc^2 x \csc^2 x \csc^2 x dx = - \int -(1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x dx$$

(A) نفرض أن $u = \cot x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = -\csc^2 x dx$

(C) نعوض بـ $u = \cot x$, $du = -\csc^2 x dx$ في مسألة التكامل

$$= - \int (1+u^2)^2 du$$

$$= - \int (1+2u^2+u^4) du = -u - \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + c$$

(E) نعوض بـ $u = \cot x$

$$= -\cot x - \frac{2}{3}\cot^3 x - \frac{1}{5}\cot^5 x + c$$

$$(23) \int \tan^5 x dx$$

$$\int \tan x \tan^2 x \tan^2 x dx = \int \tan x (\sec^2 x - 1)^2 dx$$

(A) نفرض أن $u = \sec x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec x \tan x dx$

لاحظ أن $dx = \frac{du}{\tan x} \Leftrightarrow du = u \tan x dx$

(C) نعوض بـ $u = \sec x$ في مسألة التكامل $dx = \frac{du}{\tan x}$

$$\int (u^2 - 1)^2 du = \int (u^4 - 2u^2 + 1) \frac{du}{u}$$

$$= \int (u^3 - 2u + \frac{1}{u}) du = \frac{1}{4}u^4 - u^2 + \ln|u| + c$$

(D) نعوض بـ $u = \sec x$

$$= \frac{1}{4} \sec^4 x - \sec^2 x + \ln|\sec x| + c$$

$$(24) \int \tan^6 x dx$$

$$\int \tan^2 x \tan^4 x dx = \int (\sec^2 x - 1) \tan^4 x dx$$

$$= \int \sec^2 x \tan^4 x dx - \int \tan^4 x dx$$

$$= \int \sec^2 x \tan^4 x dx - \int \tan^2 x \tan^2 x dx$$

$$= \int \sec^2 x \tan^4 x dx - \int (\sec^2 x - 1) \tan^2 x dx$$

$$= \int \sec^2 x \tan^4 x dx - \int \sec^2 x \tan^2 x dx + \int \tan^2 x dx$$

$$= \int \sec^2 x \tan^4 x dx - \int \sec^2 x \tan^2 x dx + \int (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \int \sec^2 x \tan^4 x dx - \int \sec^2 x \tan^2 x dx + \int \sec^2 x dx - \int x dx$$

(A) نفرض أن $u = \tan x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec^2 x dx$

(C) نعين $dx = \frac{du}{\sec^2 x}$

(D) نعوض بـ $du = \sec^2 x dx$ في مسألة التكامل $dx = \frac{du}{\sec^2 x}$

$$\begin{aligned}
 &= \int \sec^2 x u^4 \frac{du}{\sec^2 x} - \int \sec^2 x u^2 \frac{du}{\sec^2 x} + \int \sec^2 x dx - \int x dx \\
 &= \int u^4 du - \int u^2 du + \int \sec^2 x dx - \int x dx \\
 &= \frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{3} u^3 + \tan x - \frac{1}{2} x^2 + c
 \end{aligned}$$

$u = \tan x \rightarrow$ نعوض (E)


$$= \frac{1}{5} \tan^5 x - \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x - \frac{1}{2} x^2 + c$$

طريقة التجزيء

هي عبارة عن تحويل التكامل المعطى والذي لا يمكن حسابه بالقوانين المباشرة ولا بطريقة التعويض إلى تكامل آخر يمكن حسابه

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

أي أننا نقوم بتقسيم مسألة التكامل إلى الجزأين :-



ثم نعوض بـ u, du, v, dv في القانون السابق

مسائل على طريقة التجزيء

$$(1) \int x e^x dx$$

$$u = x, \quad dv = e^x dx$$

$$du = dx, \quad v = e^x$$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c$$

$$(2) \int x e^{2x} dx$$

$$u = x, \quad dv = e^{2x} dx$$

$$du = dx, \quad v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + c$$

$$(3) \int x 2^x dx$$

$$u = x, \quad dv = 2^x dx$$

$$du = dx, \quad v = \frac{2^x}{\ln 2}$$

$$\int x 2^x dx = \frac{1}{\ln 2} x 2^x - \frac{1}{\ln 2} \int 2^x dx = \frac{1}{\ln 2} x 2^x - \frac{1}{(\ln 2)^2} 2^x + c$$

$$(4) \int x \sin x \, dx$$

$$u = x, \quad dv = \sin x \, dx$$

$$du = dx, \quad v = -\cos x$$

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + c$$

$$(5) \int x \sec^2 x \, dx$$

$$u = x, \quad dv = \sec^2 x \, dx$$

$$du = dx, \quad v = \tan x$$

$$\int x \sec^2 x \, dx = x \tan x - \int \tan x \, dx = x \tan x - \ln |\sec x| + c$$

$$(6) \int x \ln x \, dx$$

$$u = \ln x, \quad dv = x \, dx$$

$$du = \frac{1}{x} \, dx, \quad v = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned} \int x \ln x \, dx &= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{x} \frac{1}{2} x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + c \end{aligned}$$

$$(7) \int (x+1)e^{-x} dx$$

$$u = x+1, \quad dv = e^{-x} dx$$

$$du = dx, \quad v = -e^{-x}$$

$$\begin{aligned} \int (x+1)e^{-x} dx &= -(x+1)e^{-x} - \int -e^{-x} dx \\ &= -(x+1)e^{-x} - e^{-x} + c \end{aligned}$$

$$(8) \int x^2 \ln x dx$$

$$u = \ln x, \quad dv = x^2 dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx, \quad v = \frac{1}{3} x^3$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln x dx &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \int \frac{1}{x} \frac{1}{3} x^3 dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + c \end{aligned}$$

$$(9) \int \ln x dx$$

$$u = \ln x, \quad dv = dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx, \quad v = x$$



$$\begin{aligned}\int \ln x \, dx &= x \ln x - \int dx \\ &= x \ln x - x + c\end{aligned}$$

$$\checkmark (10) \int \ln(x+1) \, dx$$

$$\begin{aligned}u &= \ln(x+1) \quad , \quad dv = dx \\ du &= \frac{1}{x+1} dx \quad , \quad v = x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \ln(x+1) \, dx &= x \ln(x+1) - \int \frac{x}{x+1} dx \\ &= x \ln(x+1) - \int \frac{x+1-1}{x+1} dx \\ &= x \ln(x+1) - \int \frac{x+1}{x+1} dx + \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= x \ln(x+1) - \int dx + \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= x \ln(x+1) - x + \ln|x+1| + c\end{aligned}$$

$$(11) \int \ln(x^2+1) \, dx$$

$$\begin{aligned}u &= \ln(x^2+1) \quad , \quad dv = dx \\ du &= \frac{2x}{x^2+1} dx \quad , \quad v = x\end{aligned}$$

$$\int \ln(x^2+1) dx = x \ln(x^2+1) - 2 \int \frac{x^2}{x^2+1} dx$$

$$= x \ln(x^2+1) - 2 \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx$$

$$= x \ln(x^2+1) - 2 \int \frac{x^2+1}{x^2+1} dx + 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx$$

$$= x \ln(x^2+1) - \int 2 dx + 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx$$

$$= x \ln(x^2+1) - 2x + 2 \tan^{-1} x + c$$

$$\frac{x^2}{x^2+1}$$

$$(12) \int \ln \sqrt{x-1} dx = \int \ln(x-1)^{\frac{1}{2}} dx = \int \frac{1}{2} \ln(x-1) dx$$

$$u = \ln(x-1) \quad , \quad dv = \frac{1}{2} dx$$

$$du = \frac{1}{x-1} dx \quad , \quad v = \frac{1}{2} x$$

$$\int \frac{1}{2} \ln(x-1) dx = \frac{1}{2} x \ln(x-1) - \frac{1}{2} \int \frac{x}{x-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} x \ln(x-1) - \frac{1}{2} \int \frac{x-1+1}{x-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} x \ln(x-1) - \frac{1}{2} \int \frac{x-1}{x-1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} x \ln(x-1) - \int \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} x \ln(x-1) - \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \ln|x-1| + c$$

$$(13) \int x \ln \sqrt{x+1} \, dx = \int x \ln(x+1)^{\frac{1}{2}} \, dx = \int \frac{1}{2} x \ln(x+1) \, dx$$

$$u = \ln(x+1) \quad , \quad dv = \frac{1}{2} x \, dx$$

$$du = \frac{1}{x+1} \, dx \quad , \quad v = \frac{1}{4} x^2$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2} x \ln(x+1) \, dx &= \frac{1}{4} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} \int \frac{x^2}{x+1} \, dx \\ &= \frac{1}{4} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} \int \frac{x^2 - 1 + 1}{x+1} \, dx \\ &= \frac{1}{4} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} \int \frac{x^2 - 1}{x+1} \, dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} \, dx \\ &= \frac{1}{4} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} \int \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} \, dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} \, dx \\ &= \frac{1}{4} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} \int (x-1) \, dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} \, dx \\ &= \frac{1}{4} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{8} x^2 + \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \ln|x+1| + c \end{aligned}$$

$$(14) \int x \ln \sqrt[3]{x+1} \, dx = \int x \ln(x+1)^{\frac{1}{3}} \, dx = \int \frac{1}{3} x \ln(x+1) \, dx$$

$$u = \ln(x+1) \quad , \quad dv = \frac{1}{3} x \, dx$$

$$du = \frac{1}{x+1} \, dx \quad , \quad v = \frac{1}{6} x^2$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{3} x \ln(x+1) dx &= \frac{1}{6} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{6} \int \frac{x^2}{x+1} dx \\
&= \frac{1}{6} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{6} \int \frac{x^2 - 1 + 1}{x+1} dx \\
&= \frac{1}{6} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{6} \int \frac{x^2 - 1}{x+1} dx - \frac{1}{6} \int \frac{1}{x+1} dx \\
&= \frac{1}{6} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{6} \int \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} dx - \frac{1}{6} \int \frac{1}{x+1} dx \\
&= \frac{1}{6} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{6} \int (x-1) dx - \frac{1}{6} \int \frac{1}{x+1} dx \\
&= \frac{1}{6} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{12} x^2 + \frac{1}{6} x - \frac{1}{6} \ln|x+1| + c
\end{aligned}$$

$$(15) \int \ln(x^2+1) dx$$

$$u = \ln(x^2+1) \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{2x}{x^2+1} dx \quad , \quad v = x$$

$$\int \ln(x^2+1) dx = x \ln(x^2+1) - 2 \int \frac{x^2}{x^2+1} dx$$

$$= x \ln(x^2+1) - 2 \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx$$

$$= x \ln(x^2+1) - 2 \int \frac{x^2+1}{x^2+1} dx + 2 \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= x \ln(x^2+1) - 2 \int dx + 2 \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= x \ln(x^2+1) - 2x + 2 \tan^{-1} x + c$$

$$(16) \int \ln(2x^2 + 4) \, dx$$

$$u = \ln(2x^2 + 4) \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{4x}{2x^2 + 4} dx \quad , \quad v = x$$

$$\begin{aligned} \int \ln(2x^2 + 4) \, dx &= x \ln(2x^2 + 4) - \int \frac{4x^2}{2x^2 + 4} dx \\ &= x \ln(2x^2 + 4) - 2 \int \frac{2x^2 + 4 - 4}{2x^2 + 4} dx \\ &= x \ln(2x^2 + 4) - 2 \int \frac{2x^2 + 4}{2x^2 + 4} dx + \int \frac{8}{2x^2 + 4} dx \\ &= x \ln(2x^2 + 4) - \int 2 dx + \frac{8}{4} \int \frac{1}{\frac{1}{2}x^2 + 1} dx \\ &= x \ln(2x^2 + 4) - \int 2 dx + 2 \int \frac{1}{(\frac{1}{\sqrt{2}}x)^2 + 1} dx \\ &= x \ln(2x^2 + 4) - \int 2 dx + 2\sqrt{2} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{(\frac{1}{\sqrt{2}}x)^2 + 1} dx \\ &= x \ln(2x^2 + 4) - 2x + 2\sqrt{2} \tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}}x) + c \end{aligned}$$

$$(17) \int \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}] \, dx$$

$$u = \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}] \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad , \quad v = x$$

$$\begin{aligned}
\int \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}] dx &= x \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}] - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\
&= x \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}] - \frac{1}{2} \int 2x (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\
&= x \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}] - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= x \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}] - \sqrt{1+x^2} + C
\end{aligned}$$

$$(18) \int \ln[x + \sqrt{x}] dx$$

$$u = \ln[x + \sqrt{x}] \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{2\sqrt{x}+1}{2x(\sqrt{x}+1)} dx \quad , \quad v = x$$

$$\begin{aligned}
\int \ln[x + \sqrt{x}] dx &= x \ln[x + \sqrt{x}] - \int \frac{x(2\sqrt{x}+1)}{2x(\sqrt{x}+1)} dx \\
&= x \ln[x + \sqrt{x}] - \int \frac{(2\sqrt{x}+1)}{2(\sqrt{x}+1)} dx
\end{aligned}$$

التكامل بالتعويض :-

$$(A) \text{ نفرض أن } u = 1 + \sqrt{x} \text{ ومنها } \sqrt{x} = u - 1$$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

$$(C) \text{ نعين } dx = 2\sqrt{x} du \quad \text{:-}$$

$$(D) \text{ نعوض بـ } u = 1 + \sqrt{x} \quad , \quad dx = 2\sqrt{x} du \text{ في مسألة التكامل}$$

$$\begin{aligned}
&= x \ln[x + \sqrt{x}] - \int \frac{2u-2+1}{2u} (2u-2) du \\
&= x \ln[x + \sqrt{x}] - \int \frac{(2u-1)(2u-2)}{2u} du \\
&= x \ln[x + \sqrt{x}] - \int \frac{4u^2 - 6u + 2}{2u} du \\
&= x \ln[x + \sqrt{x}] - \int (2u - 3 + \frac{1}{u}) du \\
&= x \ln[x + \sqrt{x}] - u^2 + 3u - \ln|u| + c
\end{aligned}$$

$$u = 1 + \sqrt{x} \rightarrow \text{نعوض بـ (E)}$$

$$= x \ln[x + \sqrt{x}] - (1 + \sqrt{x})^2 + 3 + 3\sqrt{x} - \ln|1 + \sqrt{x}| + c$$

$$(19) \int x^2 e^x dx$$

$$\begin{aligned}
u &= x^2, & dv &= e^x dx \\
du &= 2x dx, & v &= e^x
\end{aligned}$$

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int 2x e^x dx$$

$$\begin{aligned}
u &= 2x, & dv &= e^x dx \\
du &= 2 dx, & v &= e^x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - [2x e^x - \int 2 e^x dx] \\
&= x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x + c
\end{aligned}$$

$$(20) \int (x^2 + 2x - 5)e^{-x} dx$$

$$u = x^2 + 2x - 5, \quad dv = e^{-x} dx$$

$$du = (2x + 2) dx, \quad v = -e^{-x}$$

$$\int (x^2 + 2x - 5)e^{-x} dx = -(x^2 + 2x - 5)e^{-x} + \int (2x + 2)e^{-x} dx$$

$$u = 2x + 2, \quad dv = e^{-x} dx$$

$$du = 2 dx, \quad v = -e^{-x}$$

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 5)e^{-x} dx &= -(x^2 + 2x - 5)e^{-x} - (2x + 2)e^{-x} - \int -2e^{-x} dx \\ &= -(x^2 + 2x - 5)e^{-x} - (2x + 2)e^{-x} - 2e^{-x} + c \end{aligned}$$

$$(21) \int (\ln x)^2 dx$$

$$u = (\ln x)^2, \quad dv = dx$$

$$du = 2(\ln x) \frac{1}{x} dx, \quad v = x$$

$$\begin{aligned} \int (\ln x)^2 dx &= x(\ln x)^2 - 2 \int \frac{\ln x}{x} x dx \\ &= x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx \end{aligned}$$

$$u = \ln x, \quad dv = dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx, \quad v = x$$

$$\begin{aligned}\int (\ln x)^2 dx &= x(\ln x)^2 - 2[x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx] \\ &= x(\ln x)^2 - 2[x \ln x - \int dx] = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c\end{aligned}$$

$$(22) \int x^2 \sin x \, dx$$

$$\begin{aligned}u &= x^2, & dv &= \sin x \, dx \\ du &= 2x \, dx, & v &= -\cos x\end{aligned}$$

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx$$

$$\begin{aligned}u &= 2x, & dv &= \cos x \, dx \\ du &= 2 \, dx, & v &= \sin x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int x^2 \sin x \, dx &= -x^2 \cos x + 2x \sin x - \int 2 \sin x \, dx \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c\end{aligned}$$

$$(23) \int \tan^{-1} x \, dx$$

$$\begin{aligned}u &= \tan^{-1} x, & dv &= dx \\ du &= \frac{dx}{1+x^2}, & v &= x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + c\end{aligned}$$

$$(24) \int \cot^{-1} x \, dx$$

$$u = \cot^{-1} x, \quad dv = dx$$

$$du = \frac{-dx}{1+x^2}, \quad v = x$$

$$\begin{aligned}\int \cot^{-1} x \, dx &= x \cot^{-1} x + \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \cot^{-1} x + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = x \cot^{-1} x + \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + c\end{aligned}$$

$$(25) \int \sin^{-1} x \, dx$$

$$u = \sin^{-1} x, \quad dv = dx$$

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad v = x$$

$$\begin{aligned}\int \sin^{-1} x \, dx &= x \sin^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= x \sin^{-1} x + \frac{1}{2} \int -2x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= x \sin^{-1} x + (1-x^2)^{\frac{1}{2}} + c = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c\end{aligned}$$

$$(26) \int \sec^{-1} 2x \, dx$$

$$u = \sec^{-1} 2x, \quad dv = dx$$

$$du = \frac{2dx}{2x\sqrt{4x^2-1}}, \quad v = x$$

$$\begin{aligned} \int \sec^{-1} 2x \, dx &= x \sec^{-1} 2x - \int \frac{2x}{2x\sqrt{4x^2-1}} dx \\ &= x \sec^{-1} 2x - \int \frac{1}{\sqrt{4x^2-1}} dx = x \sec^{-1} 2x - \frac{1}{2} \int \frac{2}{\sqrt{(2x)^2-1}} dx \\ &= x \sec^{-1} 2x - \frac{1}{2} \cosh^{-1}(2x) + c \end{aligned}$$

$$(27) \int \csc^{-1} 2x \, dx$$

$$u = \csc^{-1} 2x, \quad dv = dx$$

$$du = \frac{-2dx}{2x\sqrt{4x^2-1}}, \quad v = x$$

$$\begin{aligned} \int \csc^{-1} 2x \, dx &= x \csc^{-1} 2x + \int \frac{2x}{2x\sqrt{4x^2-1}} dx \\ &= x \csc^{-1} 2x + \int \frac{1}{\sqrt{4x^2-1}} dx = x \csc^{-1} 2x + \frac{1}{2} \int \frac{2}{\sqrt{(2x)^2-1}} dx \\ &= x \csc^{-1} 2x + \frac{1}{2} \cosh^{-1}(2x) + c \end{aligned}$$

$$(28) \int x \tan^{-1} x \, dx$$

$$u = \tan^{-1} x \quad , \quad dv = x \, dx$$

$$du = \frac{dx}{1+x^2} \quad , \quad v = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int x \tan^{-1} x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 + 1 - 1}{1+x^2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 + 1}{1+x^2} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$$

$$(29) \int x \sec^{-1} 2x \, dx$$

$$u = \sec^{-1} 2x \quad , \quad dv = x \, dx$$

$$du = \frac{2dx}{2x\sqrt{4x^2-1}} \quad , \quad v = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned}
\int x \sec^{-1} 2x \, dx &= \frac{1}{2} x^2 \sec^{-1} 2x - \int \frac{2x^2}{4x\sqrt{4x^2-1}} \, dx \\
&= \frac{1}{2} x^2 \sec^{-1} 2x - \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{4x^2-1}} \, dx \\
&= \frac{1}{2} x^2 \sec^{-1} 2x - \frac{1}{16} \int 8x(4x^2-1)^{-\frac{1}{2}} \, dx \\
&= \frac{1}{2} x^2 \sec^{-1} 2x - \frac{1}{8} (4x^2-1)^{\frac{1}{2}} + c \\
&= \frac{1}{2} x^2 \sec^{-1} 2x - \frac{1}{8} \sqrt{4x^2-1} + c
\end{aligned}$$

$$(30) \int x(\ln x)^2 \, dx$$

$$u = (\ln x)^2, \quad dv = x \, dx$$

$$du = 2(\ln x) \frac{1}{x} \, dx, \quad v = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned}
\int x(\ln x)^2 \, dx &= \frac{1}{2} x^2 (\ln x)^2 - \int \frac{\ln x}{x} x^2 \, dx \\
&= \frac{1}{2} x^2 (\ln x)^2 - \int x \ln x \, dx
\end{aligned}$$

$$u = \ln x, \quad dv = x \, dx$$

$$du = \frac{1}{x} \, dx, \quad v = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned}
 \int x(\ln x)^2 dx &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2 - \left[\frac{1}{2}x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} \frac{1}{x} x^2 dx \right] \\
 &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2 - \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{1}{2} \int x dx \\
 &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2 - \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{1}{4}x^2 + c
 \end{aligned}$$

$$(31) \int \sqrt{x} \ln x \, dx$$

$$u = \ln x, \quad dv = x^{\frac{1}{2}} dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx, \quad v = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{x} \ln x \, dx &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \int \frac{1}{x} \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} dx \\
 &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{2}{3} \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{4}{9} x^{\frac{3}{2}} + c
 \end{aligned}$$

$$(32) \int x \sin x \cos x \, dx$$

$$u = x, \quad dv = \sin x \cos x \, dx$$

$$du = dx, \quad v = \frac{1}{2} \sin^2 x$$

$$\begin{aligned}
 \int x \sin x \cos x \, dx &= \frac{1}{2} x \sin^2 x - \frac{1}{2} \int \sin^2 x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x \sin^2 x - \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x \sin^2 x - \int \frac{1}{4} dx + \frac{1}{8} \int 2 \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x \sin^2 x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{8} \sin 2x + c
 \end{aligned}$$

$$(33) \int x \tan^2 x \, dx = \int x (\sec^2(x) - 1) \, dx \\ = \int (x \sec^2(x) - x) \, dx = \int x \sec^2 x \, dx - \int x \, dx$$

$$u = x \quad , \quad dv = \sec^2 x \, dx \\ du = dx \quad , \quad v = \tan x$$

$$\int x \sec^2 x \, dx - \int x \, dx = x \tan x - \int \tan x \, dx - \int x \, dx \\ = x \tan x - \ln|\sec x| - \frac{1}{2}x^2 + c$$

$$(34) \int \sin x \ln \cos x \, dx$$

$$u = \ln \cos x \quad , \quad dv = \sin x \, dx \\ du = -\frac{\sin x}{\cos x} \, dx \quad , \quad v = -\cos x$$

$$\int \sin x \ln \cos x \, dx = -\cos x \ln \cos x - \int \frac{\sin x}{\cos x} \cos x \, dx \\ = -\cos x \ln \cos x - \int \sin x \, dx \\ = -\cos x \ln \cos x + \cos x + c$$

$$(35) \int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$$

$$u = \ln x \quad , \quad dv = \frac{1}{x^2} \, dx \\ du = \frac{1}{x} \, dx \quad , \quad v = -\frac{1}{x}$$

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx$$

$$= -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + c$$

$$(36) \int x^3 e^{-x^2} dx = \int x^2 x e^{-x^2} dx$$

$$u = x^2, \quad dv = x e^{-x^2} dx$$

$$du = 2x dx, \quad v = -\frac{1}{2} e^{-x^2}$$

$$\int x^2 x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} x^2 e^{-x^2} - \frac{1}{2} \int -2x e^{-x^2} dx$$

$$= -\frac{1}{2} x^2 e^{-x^2} - \frac{1}{2} e^{-x^2} + c$$

$$(37) \int \sec^{-1} \sqrt{x} dx$$

$$u = \sec^{-1} \sqrt{x}, \quad dv = dx$$

$$du = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}} = \frac{dx}{2x\sqrt{x-1}}, \quad v = x$$

$$\begin{aligned}
 \int \sec^{-1} \sqrt{x} \, dx &= x \sec^{-1} \sqrt{x} - \int \frac{x}{2x\sqrt{x-1}} \, dx \\
 &= x \sec^{-1} \sqrt{x} - \int \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \, dx = x \sec^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \int (x-1)^{-\frac{1}{2}} \, dx \\
 &= x \sec^{-1} \sqrt{x} - (x-1)^{\frac{1}{2}} + c = x \sec^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-1} + c
 \end{aligned}$$

$$(38) \int \tan^{-1} \sqrt{x} \, dx$$

$$u = \tan^{-1} \sqrt{x} \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} dx}{1+x} = \frac{dx}{2\sqrt{x}(1+x)} \quad , \quad v = x$$

$$\begin{aligned}
 \int \tan^{-1} \sqrt{x} \, dx &= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{x}(1+x)} \, dx \\
 &= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{(1+x)} \, dx
 \end{aligned}$$

التكامل بالتعويض :-

$$(A) \text{ نفرض أن } u = \sqrt{x} \text{ ومنها } x = u^2 \text{ ، } \sqrt{x} = u$$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

$$(C) \text{ نعين } dx :- dx = 2\sqrt{x} du \quad \Leftarrow dx = 2u du$$

$$(D) \text{ نعوض بـ } u = \sqrt{x} \text{ ، } dx = 2u du \text{ في مسألة التكامل}$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{x} \, dx = x \tan^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \int \frac{u}{(1+u^2)} 2u \, du$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \int \frac{2u^2}{(1+u^2)} \, du$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \int \frac{u^2}{1+u^2} \, du$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \int \frac{u^2+1-1}{1+u^2} \, du$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \int \frac{u^2+1}{1+u^2} \, du + \int \frac{1}{1+u^2} \, du$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \int 1 \, du + \int \frac{1}{1+u^2} \, du$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x} - u + \tan^{-1} u + c$$

$$u = \sqrt{x} \rightarrow \text{نعوض بـ (E)}$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x} + \tan^{-1} \sqrt{x} + c$$

$$(39) \int \cos^{-1} \sqrt{x} \, dx$$

$$u = \cos^{-1} \sqrt{x} \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{-1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{-dx}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}} \quad , \quad v = x$$

$$\begin{aligned}
\int \cos^{-1} \sqrt{x} \, dx &= x \cos^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x} \sqrt{1-x}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{x-x^2}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int \frac{-2x}{\sqrt{x-x^2}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int \frac{-2x+1-1}{\sqrt{x-x^2}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int \frac{-2x+1}{\sqrt{x-x^2}} \, dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int \frac{-2x+1}{\sqrt{x-x^2}} \, dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sqrt{-[x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}]}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int \frac{-2x+1}{\sqrt{x-x^2}} \, dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sqrt{-(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int \frac{-2x+1}{\sqrt{x-x^2}} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-(2x-1)^2}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int (x-x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x+1) \, dx + \frac{1}{4} \int \frac{2}{\sqrt{1-(2x-1)^2}} \, dx \\
&= x \cos^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} (x-x^2)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{4} \sin^{-1}(2x-1) + c
\end{aligned}$$

$$(40) \int x^2 \tan^{-1} x \, dx$$

$$u = \tan^{-1} x, \quad dv = x^2 \, dx$$

$$du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = \frac{1}{3} x^3$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x \, dx = \frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2} \, dx$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x \, dx = \frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x - \frac{1}{6} \int \frac{2x x^2}{1+x^2} \, dx$$

التكامل بالتعويض :-

$$(A) \text{ نفرض أن } u = 1 + x^2 \text{ ومنها } x^2 = u - 1$$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = 2x \, dx$$

$$(C) \text{ نعوض بـ } u = 1 + x^2, \quad du = 2x \, dx \text{ في مسألة التكامل}$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x - \frac{1}{6} \int \frac{x^2}{u} \, du = \frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x - \frac{1}{6} \int \frac{u-1}{u} \, du$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x - \frac{1}{6} \int \left(1 - \frac{1}{u}\right) \, du$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x - \frac{1}{6} u + \frac{1}{6} \ln|u| + c$$

$$(D) \text{ نعوض بـ } u = 1 + x^2$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x - \frac{1}{6} (1 + x^2) + \frac{1}{6} \ln|1 + x^2| + c$$

$$(41) \int \tan^{-1} \sqrt{x+1} \, dx$$

$$u = \tan^{-1} \sqrt{x+1} \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+1}} dx}{x+2} = \frac{dx}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \quad , \quad v = x$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{x+1} \, dx = x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{x+1}(x+2)} \, dx$$

التكامل بالتعويض :-

$$(A) \text{ نفرض أن } u = \sqrt{x+1} \text{ ومنها } x = u^2 - 1 \Leftarrow \sqrt{x+1} = u$$

$$(B) \text{ نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ } x \quad du = \frac{dx}{2\sqrt{x+1}}$$

$$(C) \text{ نعين } dx :- dx = 2\sqrt{x+1} \, du \Leftarrow dx = 2u \, du$$

$$(D) \text{ نعوض بـ } dx = 2u \, du, u = \sqrt{x+1} \text{ في مسألة التكامل}$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{x+1} \, dx = x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{u^2 - 1}{(u^2 - 1 + 2)u} 2u \, du$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - \int \frac{u^2 - 1}{(u^2 + 1)} \, du$$

$$\begin{aligned}
&= x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - \int \frac{u^2 + 1 - 1 - 1}{u^2 + 1} du \\
&= x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - \int \frac{u^2 + 1}{u^2 + 1} du + 2 \int \frac{1}{u^2 + 1} du \\
&= x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - \int du + 2 \int \frac{1}{u^2 + 1} du \\
&= x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - u + 2 \tan^{-1} u + c \\
&\quad u = \sqrt{x+1} \rightarrow \text{نعوض (E)}
\end{aligned}$$

$$= x \tan^{-1} \sqrt{x+1} - \sqrt{x+1} + 2 \tan^{-1} \sqrt{x+1} + c$$

$$(42) \int e^{-x} \tan^{-1} e^x dx$$

$$u = \tan^{-1} e^x, \quad dv = e^{-x} dx$$

$$du = \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx, \quad v = -e^{-x}$$

$$\int e^{-x} \tan^{-1} e^x dx = -e^{-x} \tan^{-1} e^x + \int \frac{e^x e^{-x}}{1+e^{2x}} dx$$

$$= -e^{-x} \tan^{-1} e^x + \int \frac{1}{1+e^{2x}} dx$$

$$= -e^{-x} \tan^{-1} e^x + \int \frac{e^{-2x}}{e^{-2x} + e^{-2x} e^{2x}} dx$$

$$= -e^{-x} \tan^{-1} e^x + \int \frac{e^{-2x}}{e^{-2x} + e^0} dx$$

$$\begin{aligned}
&= -e^{-x} \tan^{-1} e^x + \int \frac{e^{-2x}}{e^{-2x} + 1} dx \\
&= -e^{-x} \tan^{-1} e^x - \frac{1}{2} \int \frac{-2e^{-2x}}{e^{-2x} + 1} dx \\
&= -e^{-x} \tan^{-1} e^x - \frac{1}{2} \ln |e^{-2x} + 1| + c
\end{aligned}$$

$$(43) \int e^{2x} \sin e^x dx = \int e^x e^x \sin e^x dx$$

$$\begin{aligned}
u &= e^x, & dv &= e^x \sin e^x dx \\
du &= e^x dx, & v &= -\cos e^x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int e^{2x} \sin e^x dx &= -e^x \cos e^x + \int e^x \cos e^x dx \\
&= -e^x \cos e^x + \sin e^x + c
\end{aligned}$$

$$(44) \int \left(\frac{x-1}{x}\right) e^{\frac{1}{x}} dx = \int e^{\frac{1}{x}} dx - \int \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} dx$$

$$u = e^{\frac{1}{x}}, \quad dv = dx$$

$$du = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx, \quad v = x$$

$$\begin{aligned}
\int e^{\frac{1}{x}} dx - \int \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} dx &= x e^{\frac{1}{x}} + \int x \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx - \int \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} dx + c \\
&= x e^{\frac{1}{x}} + \int \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} dx - \int \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} dx + c = x e^{\frac{1}{x}} + c
\end{aligned}$$

$$(45) \int \sinh^{-1} x \, dx$$

$$u = \sinh^{-1} x \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \quad , \quad v = x$$

$$\int \sinh^{-1} x \, dx = x \sinh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \, dx$$

$$= x \sinh^{-1} x - \frac{1}{2} \int 2x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \, dx$$

$$= x \sinh^{-1} x - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + c = x \sinh^{-1} x - \sqrt{1+x^2} + c$$

$$(46) \int \tanh^{-1} x \, dx$$

$$u = \tanh^{-1} x \quad , \quad dv = dx$$

$$du = \frac{dx}{1-x^2} \quad , \quad v = x$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x - \int \frac{x}{1-x^2} \, dx$$

$$= x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \int \frac{-2x}{1-x^2} \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln|1-x^2| + c$$

$$(47) \int e^x \cos x \, dx$$

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx$$

$$du = e^x \, dx, \quad v = \sin x$$

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx$$

$$du = e^x \, dx, \quad v = -\cos x$$

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - [-e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx] + k$$

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx + k$$

$$\int e^x \cos x \, dx + \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + k$$

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + k$$

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{1}{2} e^x \sin x + \frac{1}{2} e^x \cos x + c, \quad c = \frac{1}{2} k$$

$$(48) \int \frac{\sin x}{e^x} \, dx = \int e^{-x} \sin x \, dx$$

$$u = e^{-x}, \quad dv = \sin x \, dx$$

$$du = -e^{-x} \, dx, \quad v = -\cos x$$

$$\int e^{-x} \sin x \, dx = -e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \cos x \, dx$$

$$u = e^{-x}, \quad dv = \cos x \, dx$$

$$du = -e^{-x} dx, \quad v = \sin x$$

$$\int e^{-x} \sin x \, dx = -e^{-x} \cos x - [e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x \, dx] + k$$

$$\int e^{-x} \sin x \, dx = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x - \int e^{-x} \sin x \, dx + k$$

$$\int e^{-x} \sin x \, dx + \int e^{-x} \sin x \, dx = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x + k$$

$$2 \int e^{-x} \sin x \, dx = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x + k$$

$$\int e^{-x} \sin x \, dx = -\frac{1}{2} e^{-x} \cos x - \frac{1}{2} e^{-x} \sin x + c, \quad c = \frac{1}{2} k$$

$$(49) \int \sin(\ln x) \, dx$$

$$u = \sin(\ln x), \quad dv = dx$$

$$du = \frac{1}{x} \cos \ln x \, dx, \quad v = x$$

$$\int \sin(\ln x) \, dx = x \sin(\ln x) - \int \frac{1}{x} \cos(\ln x) x \, dx$$

$$\int \sin(\ln x) \, dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) \, dx$$

$$u = \cos(\ln x), \quad dv = dx$$

$$du = -\frac{\sin(\ln x)}{x} dx, \quad v = x$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - [x \cos(\ln x) + \int \frac{\sin(\ln x)}{x} x dx] + k$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \sin(\ln x) dx + k$$

$$\int \sin(\ln x) dx + \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) + k$$

$$2 \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) + k$$

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{1}{2} x \sin(\ln x) - \frac{1}{2} x \cos(\ln x) + c, c = \frac{1}{2} k$$

$$(50) \int \cos(\ln x) dx$$

$$u = \cos(\ln x), \quad dv = dx$$

$$du = -\frac{1}{x} \sin(\ln x) dx, \quad v = x$$

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + \int \frac{1}{x} \sin(\ln x) x dx$$

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx$$

$$u = \sin(\ln x), \quad dv = dx$$

$$du = \frac{1}{x} \cos(\ln x) dx, \quad v = x$$

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + [x \sin(\ln x) - \int \frac{\cos(\ln x)}{x} x dx] + k$$

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx + k$$

$$\int \cos(\ln x) dx + \int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) + k$$

$$2 \int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) + k$$

$$\int \cos(\ln x) dx = \frac{1}{2} x \cos(\ln x) + \frac{1}{2} x \sin(\ln x) + c, c = \frac{1}{2} k$$

$$(51) \int \sec^3 x dx = \int \sec^2 x \sec x dx$$

$$u = \sec x, \quad dv = \sec^2 x dx$$

$$du = \sec x \tan x dx, \quad v = \tan x$$

$$\int \sec^3 x dx = \tan x \sec x - \int \sec x \tan^2 x dx$$

$$\int \sec^3 x dx = \tan x \sec x - \int \sec x (\sec^2(x) - 1) dx$$

$$\int \sec^3 x dx = \tan x \sec x - \int (\sec^3 x - \sec x) dx$$

$$\int \sec^3 x dx = \tan x \sec x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx$$

$$\int \sec^3 x dx + \int \sec^3 x dx = \tan x \sec x + \ln|\sec x + \tan x| + k$$

$$2 \int \sec^3 x dx = \tan x \sec x + \ln|\sec x + \tan x| + k$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \tan x \sec x + \frac{1}{2} \ln|\sec x + \tan x| + c, c = \frac{1}{2} k$$

$$(52) \int \csc^3 x \, dx = \int \csc^2 x \csc x \, dx$$

$$u = \csc x, \quad dv = \csc^2 x \, dx$$

$$du = -\csc x \cot x \, dx, \quad v = -\cot x$$

$$\int \csc^3 x \, dx = -\cot x \csc x - \int \csc x \cot^2 x \, dx$$

$$\int \csc^3 x \, dx = -\cot x \csc x - \int \csc x (\csc^2(x) - 1) \, dx$$

$$\int \csc^3 x \, dx = -\cot x \csc x - \int (\csc^3 x - \csc x) \, dx$$

$$\int \csc^3 x \, dx \stackrel{\curvearrowright}{=} -\cot x \csc x - \int \csc^3 x \, dx + \int \csc x \, dx$$

$$\int \csc^3 x \, dx + \int \csc^3 x \, dx = -\cot x \csc x + \ln|\csc x - \cot x| + k$$

$$2 \int \csc^3 x \, dx = -\cot x \csc x + \ln|\csc x - \cot x| + k$$

$$\int \csc^3 x \, dx = -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln|\csc x - \cot x| + c, \quad c = \frac{1}{2}k$$

$$(53) \int \sec^5 x \, dx = \int \sec^3 x \sec^2 x \, dx$$

$$u = \sec^3 x, \quad dv = \sec^2 x \, dx$$

$$du = 3\sec^2 x \sec x \tan x \, dx, \quad v = \tan x$$

$$du = 3\sec^3 x \tan x \, dx$$

$$\int \sec^5 x \, dx = \tan x \sec^3 x - \int 3\sec^3 x \tan^2 x \, dx$$

$$\int \sec^5 x \, dx = \tan x \sec^3 x - \int 3\sec^3 x (\sec^2 x - 1) \, dx$$

$$\int \sec^5 x \, dx = \tan x \sec^3 x - \int (3\sec^5 x - 3\sec^3 x) \, dx$$

$$\int \sec^5 x \, dx = \tan x \sec^3 x - 3 \int \sec^5 x \, dx + \int 3\sec^3 x \, dx$$

$$4 \int \sec^5 x \, dx = \tan x \sec^3 x + \frac{3}{2} \tan x \sec x + \frac{3}{2} \ln |\sec x + \tan x| + k$$

$$\int \sec^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan x \sec^3 x + \frac{3}{8} \tan x \sec x + \frac{3}{8} \ln |\sec x + \tan x| + c$$

$$, c = \frac{1}{4}k$$

$$(54) \int \tan^2 x \sec x \, dx = \int (\sec^2(x) - 1) \sec x \, dx$$

$$\int (\sec^3 x - \sec x) \, dx = \int \sec^3 x \, dx - \int \sec x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \tan x \sec x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| - \ln |\sec x + \tan x| + c$$

$$= \frac{1}{2} \tan x \sec x - \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + c$$

تکامل $\int \sec^3 x \, dx$ انظر مسألة (51)

$$(55) \int \cot^2 x \csc x \, dx = \int (\csc^2(x) - 1) \csc x \, dx$$

$$\int (\csc^3 x - \csc x) \, dx = \int \csc^3 x \, dx - \int \csc x \, dx$$

$$= -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln |\csc x - \cot x| - \ln |\csc x - \cot x| + c$$

$$= -\frac{1}{2} \cot x \csc x - \frac{1}{2} \ln |\csc x - \cot x| + c$$

تکامل $\int \csc^3 x \, dx$ انظر مسألة (52)

$$(56) \int \sin \sqrt{x} \, dx$$

التكامل بالتعويض :-

(A) نفرض أن $w = \sqrt{x}$ ومنها $\sqrt{x} = w$ ،

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $dw = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$

(C) نعين dx :- $dx = 2\sqrt{x} \, dw \Leftrightarrow dx = 2w \, dw$

(D) نعوض بـ $w = \sqrt{x}$ ، $dx = 2w \, dw$ في مسألة التكامل

$$\int \sin \sqrt{x} \, dx = \int \sin w \, 2w \, dw$$

$$dv = \sin w \, dw \quad , \quad u = 2w$$

$$v = -\cos w \quad , \quad du = 2 \, dw$$

$$\int \sin w \, 2w \, dw = -2w \cos w + 2 \int \cos w \, dw$$

$$\int \sin w \, 2w \, dw = -2w \cos w + 2 \sin w + c$$

(E) نعوض بـ $w = \sqrt{x}$

$$\int \sin \sqrt{x} \, dx = -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2 \sin(\sqrt{x}) + c$$

$$(57) \int \cos \sqrt{x+1} \, dx$$

التكامل بالتعويض :-

(A) نفرض أن $w = \sqrt{x+1}$ ومنها $\sqrt{x+1} = w$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $dw = \frac{dx}{2\sqrt{x+1}}$

(C) نعين dx :- $dx = 2w dw \Leftrightarrow dx = 2\sqrt{x+1} dw$

(D) نعوض بـ $w = \sqrt{x+1}$ ، $dx = 2w dw$ في مسألة التكامل

$$\int \cos \sqrt{x+1} dx = \int \cos w 2w dw$$

$$dv = \cos w dw, u = 2w$$

$$v = \sin w, du = 2dw$$

$$\int \cos w 2w dw = 2w \sin w - 2 \int \sin w dw$$

$$\int \cos w 2w dw = 2w \sin w + 2 \cos w + c$$

(E) نعوض بـ $w = \sqrt{x+1}$

$$\int \cos \sqrt{x+1} dx = 2\sqrt{x+1} \sin \sqrt{x+1} + 2 \cos \sqrt{x+1} + c$$

$$(58) \int e^{\sqrt{x}} dx$$

التكامل بالتعويض :-

(A) نفرض أن $w = \sqrt{x}$ ومنها $\sqrt{x} = w$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $dw = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$

(C) نعين dx :- $dx = 2w dw \Leftrightarrow dx = 2\sqrt{x} dw$

(D) نعوض بـ $w = \sqrt{x}$ ، $dx = 2w dw$ في مسألة التكامل

$$\int e^{\sqrt{x}} dx = \int e^w 2\sqrt{x} dw = \int e^w 2w dw$$

$$dv = e^w dw \quad , \quad u = 2w$$

$$v = e^w dw \quad , \quad du = 2dw$$

$$\int e^w 2w dw = 2we^w - 2 \int e^w dw$$

$$= 2we^w - 2e^w + c$$

(E) نعوض بـ $w = \sqrt{x}$

$$\int e^{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} e^{\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} + c$$

(59) $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$

التكامل بالتعويض :-

(A) نفرض أن $w = \ln x$

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $dw = \frac{dx}{x}$

(C) نعين dx :- $dx = x dw$

(D) نعوض بـ $w = \ln x$ ، $dx = x dw$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{\ln w}{x} x dw = \int \ln w dw$$

$$u = \ln w \quad , \quad dv = dw$$

$$du = \frac{1}{w} dw \quad , \quad v = w$$

$$\int \ln w \, dw = w \ln w - \int \frac{1}{w} w \, dw$$

$$= w \ln w - \int dw = w \ln w - w + c$$

$w = \ln x \rightarrow$ نعوض بـ (E)

$$\int \frac{\ln(\ln x)}{x} \, dx = \ln x \ln(\ln x) - \ln x + c$$

$$(60) \int x \sin^2 x \, dx$$

$$\int x \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \, dx = \int \frac{1}{2} x \, dx - \frac{1}{2} \int x \cos 2x \, dx$$

$$u = x, \quad dv = \cos 2x \, dx$$

$$du = dx, \quad v = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$= \int \frac{1}{2} x \, dx - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x \, dx \right]$$

$$= \int \frac{1}{2} x \, dx - \frac{1}{4} x \sin 2x + \frac{1}{8} \int 2 \sin 2x \, dx$$

$$= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + c$$

طريقة التعويضات المثلثية

من الممكن أحياناً تغيير المتغير المستقل في مسألة التكامل وتحويل الدالة المراد تكاملها إلى دالة أخرى مثلثية يمكن تكاملها ويسمى هذا التكامل بالتعويضات المثلثية ونستخدم لذلك التعويضات المثلثية المناسبة ونستخدم هذه الطريقة إذا كانت مسألة التكامل تحتوي على أحد الصور الآتية :-

$$[F(x)]^2 - a^2, [F(x)]^2 + a^2, a^2 - [F(x)]^2$$

ولإيجاد تكامل المسائل التي تحتوي على هذه الصور نتبع الآتي :-

(1) نفرض أن الدالة $F(x)$ تساوي أحد النسب المثلثية الآتية :-

صورة المسألة

الفرضية

$$[F(x)]^2 + a^2$$

$$F(x) = a \tan \theta$$

$$[F(x)]^2 - a^2$$

$$F(x) = a \sec \theta$$

$$a^2 - [F(x)]^2$$

$$F(x) = a \sin \theta$$

(2) من الفرضية نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة الزاوية θ

(3) من النسبة المثلثية نكوّن المثلث القائم الزاوية ونعين الضلع المجهول

(4) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ لنحصل على $dx = \square$

(5) نعوض بالفرضية $F(x) = \square$ وتفاضلها $dx = \square$ في مسألة التكامل

(6) نقوم بإخراج a^2 عامل مشترك فنحصل على صورة أحد المتطابقات

$$(1) 1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$$

$$(2) \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$

$$(3) \csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$$

(7) نكامل المسألة بالنسبة لـ θ

(8) نكتب المسألة بعد تكاملها بدلالة x وذلك بالاستفادة من الخطوة

رقم (2)+(3)

مسائل على طريقة التعويضات المثلثية


$$(1) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 9}}$$

(A) نفرض أن $x = 3 \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = \frac{x}{3}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$$



$$dx = 3 \sec^2 \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = 3 \tan \theta$ وتفاضلها $dx = 3 \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int \frac{3 \sec^2 \theta d\theta}{9 \tan^2 \theta \sqrt{9 \tan^2 \theta + 9}} &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{3 \tan^2 \theta \sqrt{9 [\tan^2 \theta + 1]}} \\ &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{9 \tan^2 \theta \sqrt{\sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{9 \tan^2 \theta \sec \theta} = \int \frac{\sec \theta d\theta}{9 \tan^2 \theta} \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{1}{\cos \theta} \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{9} \int \cos \theta (\sin \theta)^{-2} d\theta \\ &= -\frac{1}{9} (\sin \theta)^{-1} + c = -\frac{1}{9 \sin \theta} + c = -\frac{1}{9} \csc \theta + c \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= -\frac{\sqrt{9+x^2}}{9x} + c$$


$$(2) \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 25}}$$

(A) نفرض أن $x = 5 \sec \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sec \theta = \frac{x}{5}$$

$$\theta = \sec^{-1}\left(\frac{x}{5}\right)$$



$$dx = 5 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = 5 \sec \theta$ ونفاضلها $dx = 5 \sec \theta \tan \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int \frac{5 \sec \theta \tan \theta d\theta}{125 \sec^3 \theta \sqrt{25 \sec^2 \theta - 25}} &= \int \frac{\tan \theta d\theta}{125 \sec^2 \theta \sqrt{[\sec^2 \theta - 1]}} \\ &= \int \frac{\tan \theta d\theta}{125 \sec^2 \theta \sqrt{\tan^2 \theta}} = \int \frac{\tan \theta d\theta}{125 \sec^2 \theta \tan \theta} = \frac{1}{125} \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{125} \int \frac{1}{2} [1 + \cos 2\theta] d\theta = \int \frac{1}{250} d\theta + \frac{1}{250} \int \cos 2\theta d\theta \end{aligned}$$

$$= \int \frac{1}{250} d\theta + \frac{1}{500} \int 2 \cos 2\theta d\theta$$

$$= \frac{1}{250} \theta + \frac{1}{500} \sin 2\theta + c$$

$$= \frac{1}{250} \theta + \frac{1}{500} 2 \sin \theta \cos \theta + c$$

$$= \frac{1}{250} \theta + \frac{1}{250} \sin \theta \cos \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{250} \sec^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + \frac{1}{250} \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x} \cdot \frac{5}{x} + c$$

$$= \frac{1}{250} \sec^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + \frac{1}{50} \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x^2} + c$$


$$(3) \int \sqrt{4 - x^2} dx$$

(A) نفرض أن $x = 2 \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$$



$$dx = 2 \cos \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = 2 \sin \theta$ وتفاضلها

في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{4-4\sin^2 \theta} \cdot 2\cos \theta \, d\theta &= 2 \int \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cdot 2\cos \theta \, d\theta \\
 &= 2 \int \sqrt{\cos^2 \theta} \cdot 2\cos \theta \, d\theta = 4 \int \cos^2 \theta \, d\theta \\
 &= 4 \int \frac{1}{2}(1+\cos 2\theta) \, d\theta = \int (2+2\cos 2\theta) \, d\theta \\
 &= 2\theta + \sin 2\theta + c = 2\theta + 2\sin \theta \cos \theta + c
 \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned}
 &= 2 \sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \frac{x}{2} \frac{\sqrt{4-x^2}}{2} + c \\
 &= 2 \sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{x \sqrt{4-x^2}}{2} + c
 \end{aligned}$$


$$(4) \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$$

(A) نفرض أن $x = \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = x$$

$$\theta = \sin^{-1}(x)$$



$$dx = \cos \theta \, d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \sin \theta$ ونفاضلها $dx = \cos \theta \, d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1-\sin^2 \theta}}{\sin^2 \theta} \cos \theta d\theta &= \int \frac{\sqrt{\cos^2 \theta}}{\sin^2 \theta} \cos \theta d\theta \\ &= \int \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \int \cot^2 \theta d\theta = \int (\csc^2 \theta - 1) d\theta \\ &= -\cot \theta - \theta + c \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \sin^{-1}(x) + c$$


$$(5) \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x^2} dx$$

(A) نفرض أن $x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = x$$

$$\theta = \tan^{-1}(x)$$



$$dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \tan \theta$ وتفاضلها $dx = \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
& \int \frac{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}}{\tan^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int \frac{\sec \theta}{\tan^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta \\
& = \int \frac{\sec^3 \theta}{\tan^2 \theta} d\theta = \int \frac{1}{\cos^3 \theta} \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta \\
& \int \frac{d\theta}{\cos \theta \sin^2 \theta} = \int \sec \theta \csc^2 \theta d\theta \\
& = \int \sec \theta (\cot^2 \theta + 1) d\theta = \int (\sec \theta \cot^2 \theta + \sec \theta) d\theta \\
& = \int \frac{1}{\cos \theta} \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta + \int \sec \theta d\theta = \int \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} d\theta + \int \sec \theta d\theta \\
& = \int \frac{1}{\sin \theta} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta + \int \sec \theta d\theta \\
& = \int \csc \theta \cot \theta d\theta + \int \sec \theta d\theta = -\csc \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + \ln \left| \sqrt{1+x^2} + x \right| + c$$


$$(6) \int x^3 \sqrt{4-x^2} dx$$

(A) نفرض أن $x = 2 \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{x}{2} \right)$$



$$dx = 2 \cos \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x=2\sin\theta$ وتفاضلها $dx = 2 \cos \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int 8 \sin^3 \theta \sqrt{4-4\sin^2 \theta} 2 \cos \theta d\theta &= 32 \int \sin^3 \theta \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cos \theta d\theta \\ &= 32 \int \sin^3 \theta \sqrt{\cos^2 \theta} \cos \theta d\theta = 32 \int \sin^3 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= 32 \int \sin \theta \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = 32 \int \sin \theta (1-\cos^2 \theta) \cos^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

(1) نفرض أن $u = \cos \theta$

(2) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ $du = -\sin \theta d\theta$

(3) نعين $d\theta = \frac{-du}{\sin \theta}$

(4) نعوض بـ $u = \cos \theta$ في مسألة التكامل $d\theta = \frac{-du}{\sin \theta}$

$$\begin{aligned} &= -32 \int \sin \theta (1-u^2) u^2 \frac{du}{\sin \theta} \\ &= -32 \int (1-u^2) u^2 du = -32 \int (u^2 - u^4) du \\ &= -\frac{32}{3} u^3 + \frac{32}{5} u^5 + c \end{aligned}$$

(5) نعوض بـ $u = \cos \theta$

$$= -\frac{32}{3} \cos^3 \theta + \frac{32}{5} \cos^5 \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= -\frac{32}{3} \left[\frac{\sqrt{4-x^2}}{2} \right]^3 + \frac{32}{5} \left[\frac{\sqrt{4-x^2}}{2} \right]^5 + c$$


$$(7) \int x^3 \sqrt{9 + 4x^2} dx = \int x^3 \sqrt{9 + (2x)^2} dx$$

(A) نفرض أن $2x = 3 \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = \frac{2x}{3}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{3}\right)$$



$$2dx = 3 \sec^2 \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

$$dx = \frac{3}{2} \sec^2 \theta d\theta$$

$$dx = \frac{3}{2} \sec^2 \theta d\theta \quad \text{(D) نعوض بالفرضية } 2x = 3 \tan \theta \text{ وتفاضلها}$$

في مسألة التكامل $x = \frac{3}{2} \tan \theta$

$$\int \frac{27}{8} \tan^3 \theta \sqrt{9 + 9 \tan^2 \theta} \frac{3}{2} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{243}{16} \int \tan^3 \theta \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{243}{16} \int \tan^3 \theta \sqrt{\sec^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \frac{243}{16} \int \tan^3 \theta \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{243}{16} \int \tan \theta \tan^2 \theta \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{243}{16} \int \tan \theta \sec \theta (\sec^2 \theta - 1) \sec^2 \theta d\theta$$

(1) نفرض أن $u = \sec \theta$

(2) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ $du = \sec \theta \tan \theta d\theta$

(3) نعوض بـ $u = \sec \theta$ في مسألة التكامل $du = \sec \theta \tan \theta d\theta$

$$= \frac{243}{16} \int u^2(u^2-1) du = \frac{243}{16} \int (u^4 - u^2) du$$

$$= \frac{243}{80} u^5 - \frac{243}{48} u^3 + c$$

(5) نعوض بـ $u = \sec \theta$

$$= \frac{243}{80} \sec^5 \theta - \frac{243}{48} \sec^3 \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{243}{80} \left[\frac{\sqrt{9+4x^2}}{3} \right]^5 - \frac{243}{80} \left[\frac{\sqrt{9+4x^2}}{3} \right]^3 + c$$


$$(8) \int \sqrt{1+4x^2} dx = \int \sqrt{1+(2x)^2} dx$$

(A) نفرض أن $2x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = 2x$$

$$\theta = \tan^{-1}(2x)$$



$$2dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

$$dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta$$

(D) نعوض بالفرضية $2x = \tan \theta$ وتفاضلها $dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta$

في مسألة التكامل

$$\int \frac{1}{2} \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int \sec \theta \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{4} \tan \theta \sec \theta + \frac{1}{4} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

$$= \frac{1}{4} \tan \theta \sec \theta + \frac{1}{4} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{2} x \sqrt{1 + 4x^2} + \frac{1}{4} \ln |\sqrt{1 + 4x^2} + 2x| + c$$


$$(9) \int \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} dx$$

(A) نفرض أن $x = 5 \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x}{5}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{x}{5} \right)$$



$$dx = 5 \cos \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = 5 \sin \theta$ ونفاضلها $dx = 5 \cos \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int \frac{25 \sin^2 \theta}{\sqrt{25 - 25 \sin^2 \theta}} 5 \cos \theta d\theta &= \int \frac{25 \sin^2 \theta}{5 \sqrt{1 - \sin^2 \theta}} 5 \cos \theta d\theta \\ &= 25 \int \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \cos \theta d\theta = 25 \int \sin^2 \theta d\theta \\ &= 25 \int \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta) d\theta = \int \frac{25}{2} d\theta - \frac{25}{4} \int 2 \cos 2\theta d\theta \\ &= \frac{25}{2} \theta - \frac{25}{4} \sin 2\theta + c \\ &= \frac{25}{2} \theta - \frac{25}{4} 2 \sin \theta \cos \theta + c \\ &= \frac{25}{2} \theta - \frac{25}{2} \sin \theta \cos \theta + c \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned} &= \frac{25}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x}{5} \right) - \frac{25}{2} \frac{x}{5} \frac{\sqrt{25 - x^2}}{5} + c \\ &= \frac{25}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x}{5} \right) - \frac{x}{2} \sqrt{25 - x^2} + c \end{aligned}$$


$$(10) \int \frac{x^2}{\sqrt{1 + x^2}} dx$$

(A) نفرض أن $x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = x$$

$$\theta = \tan^{-1}(x)$$



$$dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \tan \theta$ وتفاضلها $dx = \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{\tan^2 \theta}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \sec^2 \theta d\theta = \int \frac{\tan^2 \theta}{\sqrt{\sec^2 \theta}} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \int \frac{\tan^2 \theta}{\sec \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int \tan^2 \theta \sec \theta d\theta$$

$$= \int (\sec^2 \theta - 1) \sec \theta d\theta = \int (\sec^3 \theta - \sec \theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \tan \theta \sec \theta + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| - \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

$$= \frac{1}{2} \tan \theta \sec \theta - \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{2} x \sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2} \ln |\sqrt{1+x^2} + x| + c$$


$$(11) \int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x^2} dx$$

(A) نفرض أن $x = 2\sec\theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sec\theta = \frac{x}{2}$$

$$\theta = \sec^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$$



(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ $dx = 2\sec\theta \tan\theta d\theta$

(D) نعوض بالفرضية $x = 2\sec\theta$ ونفاضلها $dx = 2\sec\theta \tan\theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{\sqrt{4\sec^2\theta - 4}}{4\sec^2\theta} 2\sec\theta \tan\theta d\theta = \int \frac{\sqrt{\sec^2\theta - 1}}{\sec^2\theta} \sec\theta \tan\theta d\theta$$

$$= \int \frac{\tan\theta}{\sec^2\theta} \sec\theta \tan\theta d\theta = \int \frac{\tan^2\theta d\theta}{\sec\theta} = \int \frac{\sec^2\theta - 1}{\sec\theta} d\theta$$

$$= \int \sec\theta d\theta - \int \cos\theta d\theta = \ln|\sec\theta + \tan\theta| - \sin\theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \ln \left| \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} \right| - \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} + c$$


$$(12) \int \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x} dx$$

(A) نفرض أن $x = 5 \sec \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sec \theta = \frac{x}{5}$$

$$\theta = \sec^{-1}\left(\frac{x}{5}\right)$$



$$dx = 5 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = 5 \sec \theta$ ونفاضلها $dx = 5 \sec \theta \tan \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{\sqrt{25 \sec^2 \theta - 25}}{5 \sec \theta} 5 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= 5 \int \frac{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}{\sec \theta} \sec \theta \tan \theta d\theta = 5 \int \frac{\sqrt{\tan^2 \theta}}{\sec \theta} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= 5 \int \frac{\tan \theta}{\sec \theta} \sec \theta \tan \theta d\theta = 5 \int \tan^2 \theta d\theta$$

$$= 5 \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta = 5 \tan \theta - 5\theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \sqrt{x^2 - 25} - 5 \sec^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + c$$


$$(13) \int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$$

(A) نفرض أن $x = \sec \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sec \theta = x$$

$$\theta = \sec^{-1}(x)$$



$$dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \sec \theta$ ونفاضلها في مسألة التكامل

$$\int \frac{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}{\sec \theta} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= \int \frac{\sqrt{\tan^2 \theta}}{\sec \theta} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= \int \frac{\tan \theta}{\sec \theta} \sec \theta \tan \theta d\theta = \int \tan^2 \theta d\theta$$

$$= \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta = \tan \theta - \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \sqrt{x^2 - 1} - \sec^{-1}(x) + c$$


$$(14) \int \frac{(1-4x^2)^{\frac{1}{2}}}{x} dx = \int \frac{\sqrt{1-4x^2}}{x} dx$$

(A) نفرض أن $x = \frac{1}{2} \sin \theta$, $2x = \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = 2x$$

$$\theta = \sin^{-1}(2x)$$



$$dx = \frac{1}{2} \cos \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

$$dx = \frac{1}{2} \cos \theta d\theta \quad \text{و نفاضلها} \quad 2x = \sin \theta \quad \text{(D) نعوض بالفرضية}$$

في مسألة التكامل

$$2 \int \frac{\sqrt{1-\sin^2 \theta}}{\sin \theta} \cdot \frac{1}{2} \cos \theta d\theta = \int \frac{\sqrt{\cos^2 \theta}}{\sin \theta} \cos \theta d\theta$$

$$= \int \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} d\theta = \int \frac{1-\sin^2 \theta}{\sin \theta} d\theta = \int \csc \theta d\theta - \int \sin \theta d\theta$$

$$= \ln |\csc \theta - \cot \theta| + \cos \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \ln \left| \frac{1}{2x} - \frac{\sqrt{1-4x^2}}{2x} \right| + \sqrt{1-4x^2} + c$$


$$(15) \int \frac{dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

(A) نفرض أن $x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = x$$

$$\theta = \tan^{-1}(x)$$



$$dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \tan \theta$ وتفاضلها $dx = \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int \frac{\sec^2 \theta}{(\tan^2 \theta + 1)^{\frac{3}{2}}} d\theta &= \int \frac{\sec^2 \theta}{(\sec^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta \\ &= \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec^3 \theta} d\theta = \int \frac{1}{\sec \theta} d\theta = \int \cos \theta d\theta \\ &= \sin \theta + c \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + c$$


$$(16) \int \frac{dx}{(4-x^2)^2}$$

(A) نفرض أن $x=2\sin\theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$$



$$dx = 2\cos\theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x=2\sin\theta$ ونفاضلها $dx=2\cos\theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{2\cos\theta}{(4-4\sin^2\theta)^2} d\theta = \int \frac{2\cos\theta}{16(1-\sin^2\theta)^2} d\theta$$

$$= \frac{1}{8} \int \frac{\cos\theta}{\cos^4\theta} d\theta = \frac{1}{8} \int \frac{1}{\cos^3\theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{8} \int \sec^3\theta d\theta = \frac{1}{16} \tan\theta \sec\theta + \frac{1}{16} \ln|\sec\theta + \tan\theta|$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{16} \left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{4-x^2}} \right) + \frac{1}{16} \ln \left| \frac{2}{\sqrt{4-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \right| + c$$

$$= \frac{x}{32-8x^2} + \frac{1}{16} \ln \left| \frac{2+x}{\sqrt{4-x^2}} \right| + c$$


$$(17) \int \frac{dx}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

(A) نفرض أن $x=2\sin\theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$$



$$dx = 2\cos\theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x=2\sin\theta$ ونفاضلها $dx=2\cos\theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int \frac{2\cos\theta}{(4-4\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta &= \int \frac{2\cos\theta}{(4)^{\frac{3}{2}} (1-\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{\cos\theta}{(\cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta = \frac{1}{4} \int \frac{\cos\theta}{\cos^3\theta} d\theta \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \int \sec^2\theta d\theta = \frac{1}{4} \tan\theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \right) + c$$


$$(18) \int \frac{x^2 dx}{(9 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

(A) نفرض أن $x = 3\sin\theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x}{3}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$$



(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ $dx = 3\cos\theta d\theta$

(D) نعوض بالفرضية $x = 3\sin\theta$ ونفاضلها $dx = 3\cos\theta d\theta$

$$\int \frac{3\cos\theta \cdot 9\sin^2\theta}{(9 - 9\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta = \int \frac{3\cos\theta \cdot 9\sin^2\theta}{(9)^{\frac{3}{2}} (1 - \sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta$$

$$= \int \frac{\cos\theta \sin^2\theta}{(\cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta = \int \frac{\cos\theta \sin^2\theta}{\cos^3\theta} d\theta$$

$$= \int \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} d\theta = \int \tan^2\theta d\theta = \int (\sec^2\theta - 1) d\theta = \tan\theta - \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}} - \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + c$$


$$(19) \int \frac{x^2}{(16 + x^2)^2} dx$$

(A) نفرض أن $x = 4 \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = \frac{x}{4}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{x}{4}\right)$$



$$dx = 4 \sec^2 \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = 4 \tan \theta$ ونفاضلها

$$\int \frac{4 \sec^2 \theta \cdot 16 \tan^2 \theta}{(16 \tan^2 \theta + 16)^2} d\theta = \int \frac{4 \sec^2 \theta \cdot 16 \tan^2 \theta}{(16)^2 \sec^4 \theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{\tan^2 \theta}{\sec^2 \theta} d\theta = \frac{1}{4} \int \frac{(\sec^2 \theta - 1)}{\sec^2 \theta} d\theta$$

$$\frac{1}{4} \int d\theta - \frac{1}{4} \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{4} \int d\theta - \frac{1}{4} \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \int d\theta - \int \frac{1}{8} d\theta - \frac{1}{16} \int 2 \cos 2\theta d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \theta - \frac{1}{8} \theta - \frac{1}{16} \sin 2\theta + c$$

$$= \frac{1}{4} \theta - \frac{1}{8} \theta - \frac{1}{16} 2 \sin \theta \cos \theta + c$$

$$= \frac{1}{8} \theta - \frac{1}{8} \sin \theta \cos \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{8} \tan^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) - \frac{1}{8} \frac{x}{\sqrt{16+x^2}} \frac{4}{\sqrt{16+x^2}} + c$$

$$= \frac{1}{8} \tan^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) - \frac{x}{32+2x^2} + c$$


(20) $\int \frac{x-1}{(1+x^2)^2} dx$

(A) نفرض أن $x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = x$$

$$\theta = \tan^{-1}(x)$$



$$dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \tan \theta$ ونفاضلها $dx = \sec^2 \theta d\theta$

$$\int \frac{\tan \theta - 1}{(\tan^2 \theta + 1)^2} \sec^2 \theta d\theta = \int \frac{\sec^2 \theta (\tan \theta - 1)}{\sec^4 \theta} d\theta$$

$$= \int \frac{(\tan \theta - 1)}{\sec^2 \theta} d\theta = \int \frac{\tan \theta}{\sec^2 \theta} d\theta - \int \frac{1}{\sec^2 \theta} d\theta$$

$$= \int \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cos^2 \theta d\theta - \int \cos^2 \theta d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \int \sin \theta \cos \theta \, d\theta - \int \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\
&= \int \sin \theta \cos \theta \, d\theta - \int \frac{1}{2} \, d\theta - \frac{1}{4} \int 2 \cos 2\theta \, d\theta \\
&= \frac{1}{2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \theta - \frac{1}{4} \sin 2\theta + c \\
&= \frac{1}{2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \theta - \frac{1}{4} 2 \sin \theta \cos \theta + c \\
&= \frac{1}{2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \theta - \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + c
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 - \frac{1}{2} \tan^{-1}(x) - \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + c \\
&= \frac{x^2}{2+2x^2} - \frac{1}{2} \tan^{-1}(x) - \frac{x}{2+2x^2} + c
\end{aligned}$$


$$(21) \int \frac{x^3 dx}{(1-x^2)^4}$$

(A) نفرض أن $x = \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = x$$

$$\theta = \sin^{-1}(x)$$



(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ $dx = \cos \theta d\theta$

(D) نعوض بالفرضية $x = \sin \theta$ وتفاضلها $dx = \cos \theta d\theta$

$$\int \frac{\cos \theta \sin^3 \theta}{(1 - \sin^2 \theta)^4} d\theta = \int \frac{\cos \theta \sin^3 \theta}{(\cos^2 \theta)^4} d\theta = \int \frac{\cos \theta \sin^3 \theta}{\cos^8 \theta} d\theta$$

$$= \int \frac{\sin^3 \theta}{\cos^7 \theta} d\theta = \int \frac{\sin^3 \theta}{\cos^3 \theta} \frac{1}{\cos^4 \theta} d\theta = \int \tan^3 \theta \sec^4 \theta d\theta$$

$$= \int \tan \theta \tan^2 \theta \sec^4 \theta d\theta = \int \tan \theta (\sec^2 \theta - 1) \sec^4 \theta d\theta$$

(1) نفرض أن $u = \sec \theta$

(2) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ $du = \sec \theta \tan \theta d\theta$

(3) نعين $d\theta$:- $d\theta = \frac{du}{\sec \theta \tan \theta}$

(4) نعوض بـ $u = \sec \theta$ في مسألة التكامل $d\theta = \frac{du}{\sec \theta \tan \theta}$

$$\int \tan \theta (u^2 - 1) u^4 \frac{du}{\sec \theta \tan \theta} = \int u^4 (u^2 - 1) \frac{du}{\sec \theta}$$

$$\int u^4 (u^2 - 1) \frac{du}{u} = \int u^3 (u^2 - 1) du = \int (u^5 - u^3) du$$

$$= \frac{1}{6} u^6 - \frac{1}{4} u^4 + c$$

(5) نعوض بـ $u = \sec \theta$

$$= \frac{1}{6} \sec^6 \theta - \frac{1}{4} \sec^4 \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{6} \left[\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right]^6 - \frac{1}{4} \left[\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right]^4 + c$$


$$(22) \int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$$

(A) نفرض أن $x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = x$$

$$\theta = \tan^{-1}(x)$$



$$dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \tan \theta$ ونفاضلها $dx = \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\tan \theta \sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \sec^2 \theta d\theta &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\tan \theta \sqrt{\sec^2 \theta}} \\ &= \int \frac{1}{\tan \theta \sec \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int \frac{\sec \theta}{\tan \theta} d\theta \\ &= \int \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{1}{\cos \theta} d\theta = \int \csc \theta d\theta = \ln |\csc \theta - \cot \theta| + c \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} - \frac{1}{x} \right| + c$$


$$(23) \int x \sqrt{4 - x^4} dx = \int x \sqrt{4 - (x^2)^2} dx$$

(A) نفرض أن $x^2 = 2 \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x^2}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{x^2}{2} \right)$$



$$dx = \frac{\cos \theta}{x} d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

$$dx = \frac{\cos \theta}{x} d\theta \quad \text{و نفاضلها} \quad x^2 = 2 \sin \theta \quad \text{نعوض بالفرضية}$$

في مسألة التكامل

$$\int x \sqrt{4 - 4 \sin^2 \theta} \frac{\cos \theta}{x} d\theta = 2 \int \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cos \theta d\theta$$

$$= 2 \int \sqrt{\cos^2 \theta} \cos \theta d\theta = 2 \int \cos^2 \theta d\theta$$

$$= 2 \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \int (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta + c = \theta + \sin \theta \cos \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \sin^{-1} \left(\frac{x^2}{2} \right) + \frac{x^2}{2} \frac{\sqrt{4 - x^4}}{2} + c$$


$$(24) \int \frac{(\ln x)^2}{x} \sqrt{1 + (\ln x)^2} dx$$

(A) نفرض أن $\ln x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = \ln x$$

$$\theta = \tan^{-1}(\ln x)$$



$$\frac{1}{x} dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

$$dx = x \sec^2 \theta d\theta$$

(D) نعوض بالفرضية $\ln x = \tan \theta$ ونفاضلها $dx = x \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{(\tan \theta)^2}{x} \sqrt{1 + \tan^2 \theta} x \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \int \tan^2 \theta \sec \theta \sec^2 \theta d\theta = \int \tan^2 \theta \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \int (\sec^2 \theta - 1) \sec^3 \theta d\theta = \int \sec^5 \theta d\theta - \int \sec^3 \theta d\theta$$

التكامل بالتجزئ:-

$$= \int \sec^5 \theta d\theta - \int \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \tan \theta \sec^3 \theta + \frac{3}{8} \tan \theta \sec \theta + \frac{3}{8} \ln |\sec \theta + \tan \theta| - \frac{1}{2} \tan \theta \sec \theta - \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

$$= \frac{1}{4} \tan \theta \sec^3 \theta - \frac{1}{8} \tan \theta \sec \theta - \frac{1}{8} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{4} (\ln x) (\sqrt{1 + (\ln x)^2})^3 - \frac{1}{8} (\ln x) \sqrt{1 + (\ln x)^2} - \frac{1}{8} \ln |\sqrt{1 + (\ln x)^2} + \ln x| + c$$


$$(25) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^6 - 25}} = \int \frac{dx}{x\sqrt{(x^3)^2 - 25}}$$

(A) نفرض أن $x^3 = 5 \sec \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sec \theta = \frac{x^3}{5}$$

$$\theta = \sec^{-1} \left(\frac{x^3}{5} \right)$$



$$dx = \frac{5}{3x^2} \sec \theta \tan \theta d\theta \quad \text{(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ } \theta$$

$$dx = \frac{5}{3x^2} \sec \theta \tan \theta d\theta \quad \text{(D) نعوض بالفرضية } x^3 = 5 \sec \theta \text{ وتفاضلها}$$

في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} & \int \frac{5 \sec \theta \tan \theta}{x \sqrt{25 \sec^2 \theta - 25}} \cdot \frac{1}{3x^2} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{5 \sec \theta \tan \theta}{5 \sqrt{\sec^2 \theta - 1}} \cdot \frac{1}{x^3} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{\sec \theta \tan \theta}{\tan \theta} \cdot \frac{1}{5 \sec \theta} d\theta = \frac{1}{15} \int d\theta \\ &= \frac{1}{15} \theta + c \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{15} \sec^{-1} \left(\frac{x^3}{3} \right) + c$$


$$(26) \int x^8 \sqrt{4x^6 - 1} dx = \int x^8 \sqrt{(2x^3)^2 - 1} dx$$

(A) نفرض أن $2x^3 = \sec \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sec \theta = 2x^3$$

$$\theta = \sec^{-1}(2x^3)$$



$$6x^2 dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$dx = \frac{1}{6x^2} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

$$dx = \frac{1}{6x^2} \sec \theta \tan \theta d\theta \text{ ونفاضلها } 2x^3 = \sec \theta \text{ (D) نعوض بالفرضية}$$

في مسألة التكامل

$$\int x^8 \sqrt{\sec^2 \theta - 1} \frac{\tan \theta \sec \theta}{6x^2} d\theta$$

$$= \frac{1}{6} \int x^8 \sqrt{\tan^2 \theta} \frac{\tan \theta \sec \theta}{x^2} d\theta$$

$$= \frac{1}{6} \int x^6 \tan^2 \theta \sec \theta d\theta = \frac{1}{6} \int \frac{\sec^2 \theta}{4} \tan^2 \theta \sec \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{24} \int \tan^2 \theta \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{24} \int (\sec^2 \theta - 1) \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{24} \int (\sec^5 \theta - \sec^3 \theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{24} \int \sec^5 \theta d\theta - \frac{1}{24} \int \sec^3 \theta d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{96} \tan \theta \sec^3 \theta + \frac{1}{64} \tan \theta \sec \theta + \frac{1}{64} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \\
&\quad - \frac{1}{48} \tan \theta \sec \theta - \frac{1}{48} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c \\
&= \frac{1}{96} \tan \theta \sec^3 \theta - \frac{1}{192} \tan \theta \sec \theta - \frac{1}{192} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{96} 8x^9 \sqrt{4x^6 - 1} - \frac{1}{192} 2x^3 \sqrt{4x^6 - 1} - \frac{1}{192} \ln |2x^3 + \sqrt{4x^6 - 1}| + c \\
&= \frac{1}{12} x^9 \sqrt{4x^6 - 1} - \frac{1}{96} x^3 \sqrt{4x^6 - 1} - \frac{1}{192} \ln |2x^3 + \sqrt{4x^6 - 1}| + c
\end{aligned}$$


$$(27) \int e^x \sqrt{1 + e^{2x}} dx$$

(A) نفرض أن $e^x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = e^x$$

$$\theta = \tan^{-1}(e^x)$$



$$dx = \frac{1}{e^x} \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $e^x = \tan \theta$ وتفاضلها $dx = \frac{1}{e^x} \sec^2 \theta d\theta$

في مسألة التكامل

$$= \int \tan \theta \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \frac{1}{\tan \theta} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \int \sec \theta \sec^2 \theta d\theta = \int \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \tan \theta \sec \theta + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{2} e^x \sqrt{1 + e^{2x}} + \frac{1}{2} \ln \left| \sqrt{1 + e^{2x}} + e^x \right| + c$$

$$(28) \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{(\tan^2 x + 9)^3}} dx$$

التكامل بالتعويض :-

(1) نفرض أن $u = \tan x$

(2) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \sec^2 x dx$

(3) نعوض بـ $u = \tan x$, $du = \sec^2 x dx$ في مسألة التكامل

$$= \int \frac{du}{(u^2 + 9)^{\frac{3}{2}}}$$


التكامل بالتعويضات المثلثية :-

(A) نفرض أن $u = 3 \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = \frac{u}{3}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{u}{3}\right)$$



$$du = 3 \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $u = 3 \tan \theta$ وتفاضلها $du = 3 \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{3 \sec^2 \theta d\theta}{(9 + 9 \tan^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(9)^{\frac{3}{2}}} \int \frac{3 \sec^2 \theta d\theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} =$$

$$\frac{1}{9} \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{(\sec^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{9} \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^3 \theta}$$

$$= \frac{1}{9} \int \frac{d\theta}{\sec \theta} = \frac{1}{9} \int \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{9} \sin \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة u

$$= \frac{1}{9} \frac{u}{\sqrt{9 + u^2}} + c$$

(5) نعوض بـ $u = \tan x$

$$= \frac{1}{9} \frac{\tan x}{\sqrt{9 + \tan^2 x}} + c$$

$$(29) \int \cos x \sqrt{4 - \sin^2 x} dx$$

التكامل بالتعويض :-

(1) نفرض أن $u = \sin x$

(2) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ x $du = \cos x dx$

(3) نعوض بـ $u = \sin x$ $du = \cos x dx$ وفي مسألة التكامل

$$= \int \sqrt{4 - u^2} du$$


التكامل بالتعويضات المثلثية :-

(A) نفرض أن $u = 2 \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{u}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right)$$



$$du = 2 \cos \theta d\theta$$

(C) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $u = 2 \sin \theta$ وتفاضلها $du = 2 \cos \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \sqrt{4 - 4 \sin^2 \theta} 2 \cos \theta d\theta = 2 \int \sqrt{1 - \sin^2 \theta} 2 \cos \theta d\theta$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int \sqrt{\cos^2 \theta} \, 2 \cos \theta \, d\theta = 4 \int \cos^2 \theta \, d\theta \\
 &= 4 \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta = \int (2 + 2 \cos 2\theta) \, d\theta \\
 &= 2\theta + \sin 2\theta + c = 2\theta + 2 \sin \theta \cos \theta + c
 \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة u

$$\begin{aligned}
 &= 2 \sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right) + 2 \frac{u}{2} \frac{\sqrt{4-u^2}}{2} + c \\
 &= 2 \sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right) + \frac{u \sqrt{4-u^2}}{2} + c
 \end{aligned}$$

(5) نعوض بـ $u = 2 \sin x$

$$= 2 \sin^{-1}\left(\frac{2 \sin x}{2}\right) + \frac{\sin x \sqrt{4-4 \sin^2 x}}{2} + c$$


$$(30) \int \frac{3x+2}{(x^2+4)^{\frac{3}{2}}} \, dx$$

(A) نفرض أن $x = 2 \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = \frac{x}{2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$$



(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ $dx = 2 \sec^2 \theta d\theta$

(D) نعوض بالفرضية $x = 2 \tan \theta$ وتفاضلها $dx = 2 \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{6 \tan \theta + 2}{(4 \tan^2 \theta + 4)^{\frac{3}{2}}} 2 \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{8} \int \frac{2 \sec^2 \theta (6 \tan \theta + 2)}{\sec^3 \theta} d\theta = \frac{1}{4} \int \frac{6 \tan \theta + 2}{\sec \theta} d\theta$$

$$= \frac{6}{4} \int \frac{\tan \theta}{\sec \theta} d\theta + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sec \theta} d\theta$$

$$= \frac{3}{2} \int \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cos \theta d\theta + \frac{1}{2} \int \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{3}{2} \int \sin \theta d\theta + \frac{1}{2} \int \cos \theta d\theta$$

$$= -\frac{3}{2} \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{-3}{\sqrt{4+x^2}} + \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{4+x^2}} + c$$

$$(31) \int (x - x^2)^{\frac{3}{2}} dx$$


$$\begin{aligned} \int [-(x^2 - x)]^{\frac{3}{2}} dx &= \int [-(x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4})]^{\frac{3}{2}} dx \\ &= \int [-(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}]^{\frac{3}{2}} dx = \int [\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2]^{\frac{3}{2}} dx \end{aligned}$$

(A) نفرض أن $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin \theta, x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = 2x - 1$$

$$\theta = \sin^{-1}(2x - 1)$$



$$dx = \frac{1}{2} \cos \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ x

(D) نعوض بالفرضية $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin \theta$ ونفاضلها $dx = \frac{1}{2} \cos \theta d\theta$

في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
& \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \sin^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{2} \cos \theta d\theta = \frac{1}{16} \int (1 - \sin^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \cos \theta d\theta \\
& \frac{1}{16} \int (\cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \cos \theta d\theta = \frac{1}{16} \int \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{16} \int (\cos^2 \theta)^2 d\theta \\
& = \frac{1}{64} \int (1 + \cos 2\theta)^2 d\theta = \frac{1}{64} \int (1 + 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta) d\theta \\
& = \frac{1}{64} \int d\theta + \frac{1}{64} \int 2\cos 2\theta d\theta + \frac{1}{64} \int \cos^2 2\theta d\theta \\
& = \frac{1}{64} \int d\theta + \frac{1}{64} \int 2\cos 2\theta d\theta + \frac{1}{64} \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4\theta) d\theta \\
& = \frac{1}{64} \int d\theta + \frac{1}{64} \int 2\cos 2\theta d\theta + \int \frac{1}{128} d\theta + \frac{1}{128} \int \cos 4\theta d\theta \\
& = \frac{3}{128} \int d\theta + \frac{1}{64} \int 2\cos 2\theta d\theta + \frac{1}{512} \int 4\cos 4\theta d\theta \\
& = \frac{3}{128} \theta + \frac{1}{64} \sin 2\theta + \frac{1}{512} \sin 4\theta + c \\
& = \frac{3}{128} \theta + \frac{2}{64} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{512} \sin 4\theta + c \\
& = \frac{3}{128} \theta + \frac{1}{32} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{512} \sin 4\theta + c
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{3}{128} \sin^{-1}(2x+1) + \frac{1}{32} (2x+1) \sqrt{1-(2x-1)^2} + \frac{1}{512} \sin[4\sin^{-1}(2x+1)] + c$$

$$(32) \int \frac{x+4}{(6x-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$


$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{[-(x^2-6x)]^{\frac{3}{2}}} dx &= \int \frac{x+4}{[-(x^2-6x+9-9)]^{\frac{3}{2}}} dx \\ &= \int \frac{x+4}{[-((x-3)^2-9)]^{\frac{3}{2}}} dx = \int \frac{x+4}{[9-(x-3)^2]^{\frac{3}{2}}} dx \end{aligned}$$

(A) نفرض أن $x=3\sin\theta + 3$, $x-3=3\sin\theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x-3}{3}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x-3}{3}\right)$$



$$dx = 3 \cos \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x-3=3\sin\theta$ وتفاضلها $dx = 3 \cos \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
& \int \frac{3\sin\theta + 3 + 4}{(9 - 9\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} 3\cos\theta d\theta = \frac{1}{(9)^{\frac{3}{2}}} \int \frac{3\sin\theta + 7}{(1 - \sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} 3\cos\theta d\theta \\
& = \frac{1}{9} \int \frac{3\sin\theta + 7}{(1 - \sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} \cos\theta d\theta = \frac{1}{9} \int \frac{3\sin\theta + 7}{(\cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}} \cos\theta d\theta \\
& \frac{1}{9} \int \frac{3\sin\theta + 7}{\cos^3\theta} \cos\theta d\theta = \frac{1}{9} \int \frac{3\sin\theta + 7}{\cos^2\theta} d\theta \\
& \frac{1}{9} \int \frac{3\sin\theta}{\cos^2\theta} d\theta + \frac{1}{9} \int \frac{7}{\cos^2\theta} d\theta \\
& \frac{1}{3} \int \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \frac{1}{\cos\theta} d\theta + \frac{7}{9} \int \sec^2\theta d\theta \\
& \frac{1}{3} \int \tan\theta \sec\theta d\theta + \frac{7}{9} \int \sec^2\theta d\theta \\
& = \frac{1}{3} \sec\theta + \frac{7}{9} \tan\theta + c
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned}
& = \frac{1}{3} \frac{3}{\sqrt{9 - (x-3)^2}} + \frac{7}{9} \frac{x-3}{\sqrt{9 - (x-3)^2}} + c \\
& = \frac{1}{\sqrt{9 - (x-3)^2}} + \frac{7x-21}{9\sqrt{9 - (x-3)^2}} + c
\end{aligned}$$

$$(33) \int \sqrt{2x - x^2} dx$$

$$\int \sqrt{-(x^2 - 2x)} dx = \int \sqrt{-(x^2 - 2x + 1 - 1)} dx$$


$$= \int \sqrt{-[(x-1)^2 - 1]} dx = \int \sqrt{1 - (x-1)^2} dx$$

(A) نفرض أن $x-1 = \sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = x - 1$$

$$\theta = \sin^{-1}(x-1)$$



$$dx = \cos \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x-1 = \sin \theta$ ونفاضلها $dx = \cos \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cos \theta d\theta &= \int \cos \theta \cos \theta d\theta \\
&= \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \int (1+\cos 2\theta) d\theta \\
&= \int \frac{1}{2} d\theta + \frac{1}{2} \int \cos 2\theta d\theta \\
&= \int \frac{1}{2} d\theta + \frac{1}{4} \int 2\cos 2\theta d\theta \\
&= \frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta + c \\
&= \frac{1}{2} \theta + \frac{2}{4} \sin \theta \cos \theta + c \\
&= \frac{1}{2} \theta + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + c
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{1}{2} \sin^{-1}(x-1) + \frac{1}{2} (x-1) \sqrt{1-(x-1)^2} + c$$

$$(34) \int x \sqrt{2x-x^2} dx$$


$$\begin{aligned}
\int x \sqrt{-(x^2-2x)} dx &= \int x \sqrt{-(x^2-2x+1-1)} dx \\
&= \int x \sqrt{-[(x-1)^2-1]} dx = \int x \sqrt{1-(x-1)^2} dx
\end{aligned}$$

(A) نفرض أن $x=\sin \theta +1$, $x-1=\sin \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = x - 1$$

$$\theta = \sin^{-1}(x - 1)$$



$$dx = \cos \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x-1=\sin\theta$ وتفاضلها $dx = \cos \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} & \int (\sin \theta + 1) \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cos \theta d\theta \\ &= \int (\sin \theta + 1) \cos^2 \theta d\theta = \int (\sin \theta \cos^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int (\sin \theta \cos^2 \theta d\theta + \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= -\int \sin \theta (\cos \theta)^2 d\theta + \int \frac{1}{2} d\theta + \frac{1}{4} \int 2 \cos 2\theta d\theta \\ &= -\frac{1}{3} \cos^3 \theta + \frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta + c \\ &= -\frac{1}{3} \cos^3 \theta + \frac{1}{2} \theta + \frac{2}{4} \sin \theta \cos \theta + c \\ &= -\frac{1}{3} \cos^3 \theta + \frac{1}{2} \theta + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + c \end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= -\frac{1}{3} [\sqrt{1 - (x-1)^2}]^3 + \frac{1}{2} \sin^{-1}(x-1) + \frac{1}{2} (x-1) \sqrt{1 - (x-1)^2} + c$$

$$(35) \int \frac{x}{\sqrt{4x - x^2}} dx$$


$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{-(x^2 - 4x)}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{-(x^2 - 4x + 4 - 4)}} dx \\ &= \int \frac{x}{\sqrt{-[(x-2)^2 - 4]}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{4 - (x-2)^2}} dx \end{aligned}$$

(A) نفرض أن $x-2=2\sin\theta$, $x=2\sin\theta+2$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sin \theta = \frac{x-2}{2}$$


$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)$$



$$dx = 2 \cos \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x-2=2\sin\theta$ ونفاضلها $dx = 2 \cos \theta d\theta$ في مسألة التكامل



$$= -\sqrt{4-(x-2)^2} + 2\sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + c$$

$$\int \frac{\sqrt{4-4\sin^2\theta}}{(2\sin\theta+2)} 2\cos\theta d\theta = \int \frac{\cos\theta}{(2\sin\theta+2)} \cos\theta d\theta$$

(E) X is a $\mathbb{Q}$ -algebra

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta \quad \text{(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ } \theta$$

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta \quad \text{(D) نعوض بالفرضية } x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta \text{ وتفاضلها}$$

في مسألة التكامل

$$\int \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} \tan \theta - \frac{3-1}{2}}{[\frac{3}{4} \tan^2 \theta + \frac{3}{4}]^2} \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{16}{9} \int \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} \tan \theta - \frac{5}{2}}{[\tan^2 \theta + 1]^2} \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{16}{9} \int \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} \tan \theta - \frac{5}{2}}{(\sec \theta)^4} \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta = \frac{8\sqrt{3}}{9} \int \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} \tan \theta - \frac{5}{2}}{(\sec \theta)^2} d\theta$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{9} \frac{3\sqrt{3}}{2} \int \frac{\tan \theta}{(\sec \theta)^2} d\theta - \frac{8\sqrt{3}}{9} \frac{5}{2} \int \cos^2 \theta d\theta$$

$$= 4 \int \tan \theta \cos^2 \theta d\theta - \frac{20\sqrt{3}}{9} \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= 4 \int \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cos^2 \theta d\theta - \frac{10\sqrt{3}}{9} \int d\theta - \frac{10\sqrt{3}}{9} \int \cos 2\theta d\theta$$

$$= 4 \int \sin \theta \cos \theta d\theta - \frac{10\sqrt{3}}{9} \int d\theta - \frac{5\sqrt{3}}{9} \int 2 \cos 2\theta d\theta$$

$$= 2 \sin^2 \theta - \frac{10\sqrt{3}}{9} \theta - \frac{5\sqrt{3}}{9} \sin 2\theta + c$$

$$= 2\sin^2 \theta - \frac{10\sqrt{3}}{9}\theta - \frac{10\sqrt{3}}{9}\sin\theta \cos\theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned} &= 2 \left(\frac{2x+1}{\sqrt{(2x+1)^2+3}} \right)^2 - \frac{10\sqrt{3}}{9} \tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) \\ &\quad - \frac{10\sqrt{3}}{9} \frac{2x+1}{\sqrt{(2x+1)^2+3}} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{(2x+1)^2+3}} + c \\ &= \frac{2(2x+1)^2}{(2x+1)^2+3} - \frac{10\sqrt{3}}{9} \tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{60x+30}{9(2x+1)^2+27} + c \end{aligned}$$

$$(37) \int (x-2)\sqrt{9x^2+12x+8} \, dx$$

$$\int (x-2)\sqrt{9\left[x^2+\frac{4}{3}x+\frac{8}{9}\right]} \, dx$$

$$= 3 \int (x-2)\sqrt{x^2+\frac{4}{3}x+\frac{4}{9}-\frac{4}{9}+\frac{8}{9}} \, dx$$


$$= 3 \int (x-2)\sqrt{\left(x+\frac{2}{3}\right)^2+\frac{4}{9}} \, dx$$

$$(A) \text{ نفرض أن } x = \frac{2}{3}\tan\theta - \frac{2}{3}, \quad x + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}\tan\theta$$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = \frac{3x+2}{2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3x+2}{2}\right)$$



(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

$$dx = \frac{2}{3} \sec^2 \theta d\theta$$

(D) نعوض بالفرضية $x + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \tan \theta$ ونفاضلها

$$dx = \frac{2}{3} \sec^2 \theta d\theta$$

في مسألة التكامل

$$= 3 \int \left[\frac{2}{3} \tan \theta - \frac{2}{3} - 2 \right] \sqrt{\frac{4}{9} \tan^2 \theta + \frac{4}{9}} \cdot \frac{2}{3} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{4}{3} \int \left[\frac{2}{3} \tan \theta - \frac{8}{3} \right] \sqrt{\tan^2 \theta + 1} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{4}{3} \int \left[\frac{2}{3} \tan \theta - \frac{8}{3} \right] \sec \theta \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{4}{3} \int \left[\frac{2}{3} \tan \theta - \frac{8}{3} \right] \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{2}{3} \tan \theta \sec^3 \theta d\theta - \frac{4}{3} \cdot \frac{8}{3} \int \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{8}{9} \int \tan \theta \sec^3 \theta d\theta - \frac{32}{9} \int \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{8}{9} \int \tan \theta \sec \theta \sec^2 \theta d\theta - \frac{32}{9} \int \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{8}{27} \sec^3 \theta - \frac{16}{9} \tan \theta \sec \theta - \frac{16}{9} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{8}{27} \left(\frac{\sqrt{(3x+2)^2 + 4}}{2} \right)^3 - \frac{16}{9} \left(\frac{3x+2}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{(3x+2)^2 + 4}}{2} \right)$$

$$- \frac{16}{9} \ln \left| \frac{3x+2}{2} + \frac{\sqrt{(3x+2)^2 + 4}}{2} \right| + c$$

$$= \frac{8}{27} \left(\frac{\sqrt{(3x+2)^2 + 4}}{2} \right)^3 - \left(\frac{12x+8}{9} \right) \left(\frac{\sqrt{(3x+2)^2 + 4}}{2} \right)$$

$$- \frac{16}{9} \ln \left| \frac{3x+2}{2} + \frac{\sqrt{(3x+2)^2 + 4}}{2} \right| + c$$

$$(38) \int \frac{x+1}{[x^2 + 2x - 3]^{\frac{2}{3}}} dx$$

$$\int \frac{x+1}{(x^2 + x + 1 - 1 - 3)^{\frac{2}{3}}} dx = \int \frac{x+1}{[(x+1)^2 - 4]^{\frac{2}{3}}} dx$$


(A) نفرض أن $x+1=2\sec\theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\sec \theta = \frac{x+1}{2}$$

$$\theta = \sec^{-1}\left(\frac{x+1}{2}\right)$$

$$\sqrt{(x+1)^2 - 4}$$



$$dx = 2 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x+1=2\sec\theta$ ونفاضلها $dx=2\sec\theta \tan\theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\int \frac{2 \sec \theta}{[4 \sec^2 \theta - 4]^{\frac{2}{3}}} 2 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= \frac{4}{(4)^{\frac{2}{3}}} \int \frac{\sec \theta}{[\sec^2 \theta - 1]^{\frac{2}{3}}} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= \frac{2}{\sqrt[3]{2}} \int \frac{\sec^2 \theta}{[\tan \theta]^{\frac{4}{3}}} \tan \theta d\theta = \frac{2}{\sqrt[3]{2}} \int \sec^2 \theta \tan^{-\frac{1}{3}} \theta d\theta$$

$$= \frac{2}{\sqrt[3]{2}} \frac{3}{2} \tan^{\frac{2}{3}} \theta + c = \frac{3}{\sqrt[3]{2}} \tan^{\frac{2}{3}} \theta + c$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$= \frac{3}{\sqrt[3]{2}} \left(\frac{\sqrt{(x+1)^2 - 4}}{2} \right)^{\frac{2}{3}} + c$$

$$(39) \int \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx$$


$$\int \frac{x}{(x^2 + 2x + 1 - 1 + 2)^2} dx = \int \frac{x}{[(x+1)^2 + 1]^2} dx$$

(A) نفرض أن $x = \tan \theta - 1$, $x+1 = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = x + 1$$

$$\theta = \tan^{-1}(x+1)$$



$$dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \tan \theta$ وتفاضلها $dx = \sec^2 \theta d\theta$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
& \int \frac{\tan \theta - 1}{(\tan^2 \theta + 1)^2} \sec^2 \theta \, d\theta \\
&= \int \frac{\sec^2 \theta (\tan \theta - 1)}{\sec^4 \theta} \, d\theta = \int \frac{\tan \theta - 1}{\sec^2 \theta} \, d\theta \\
&= \int \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 1 \right) \cos^2 \theta \, d\theta \\
&= \int (\sin \theta \cos \theta - \cos^2 \theta) \, d\theta \\
&= \int \sin \theta \cos \theta \, d\theta - \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\
&= \int \sin \theta \cos \theta \, d\theta - \frac{1}{2} \int d\theta - \frac{1}{4} \int 2 \cos 2\theta \, d\theta \\
&= \frac{1}{2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \theta - \frac{1}{4} \sin 2\theta + c \\
&= \frac{1}{2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \theta - \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + c
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} \right)^2 - \frac{1}{2} \tan^{-1}(x+1) + \frac{1}{2} \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} + c \\
&= \frac{(x+1)^2}{2(x+1)^2 + 2} - \frac{1}{2} \tan^{-1}(x+1) + \frac{x+1}{2(x+1)^2 + 2} + c
\end{aligned}$$

طريقة تكامل الدوال القياسية

أولاً إذا كانت درجة المقام أكبر من درجة البسط (الكسور الجزئية):-

عند تجزئة أي كسر إلى كسور جزئية نتبع الآتي :-

(1) نحلل المقام بأحد طرق التحليل إن أمكن والمقادير التي لا تحلل هي :

(A) مجموع مربعين $x^2 + a^2$ لا يمكن تحليله في نطاق الأعداد الحقيقية نحو:-

$$Ex: \quad x^2 + 4, \quad x^2 + 25, \quad x^2 + 1$$

(B) المقدار الثلاثي $ax^2 + bx + c$ الذي مميزه أصغر من الصفر $b^2 - 4ac < 0$ لا يمكن تحليله في نطاق الأعداد الحقيقية نحو:

$$EX: \quad x^2 + x + 2 \Rightarrow a=1, b=1, c=2$$

$$(1)^2 - 4(1)(2) = 1 - 8 = -7 < 0$$

(2) نقوم بتجزئة الكسر إلى كسور جزئية على النحو التالي :-

(A) إذا كان المقام عبارة عن عوامل خطية مختلفة ففي هذه الحالة نجزئ هذا المقام كما يلي :

$$\int \frac{F(x)}{(ax+b)(cx+d) \dots} dx = \int \frac{A}{ax+b} dx + \int \frac{B}{cx+d} dx + \dots$$

Ex:-

$$\int \frac{3x-2}{(x+2)(x+3)} dx = \int \frac{A}{x+2} dx + \int \frac{B}{x+3} dx$$

(B) إذا كان المقام عبارة عن عوامل خطية مكررة (متساوية) ففي هذه الحالة نجزئ هذا المقام كما يلي :

$$\int \frac{F(x)}{(ax+b)^n} dx = \int \frac{A}{ax+b} dx + \int \frac{B}{(ax+b)^2} dx + \dots + \int \frac{H}{(ax+b)^n} dx$$

EX :-

$$\int \frac{x-2}{(x+2)^3} dx = \int \frac{A}{x+2} dx + \int \frac{B}{(x+2)^2} dx + \int \frac{C}{(x+2)^3} dx$$

(C) إذا كان المقام عبارة عن عوامل غير خطية مختلفة ففي هذه الحالة نجزئ هذا المقام كما يلي :

$$\int \frac{F(x)}{(ax^2+b)(cx^2+dx+h)\dots} dx = \int \frac{Ax+B}{ax^2+b} dx + \int \frac{Cx+D}{cx^2+dx+h} dx + \dots$$

Ex:-

$$\int \frac{3x-2}{(x^2+1)(x^2+x+1)} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+1} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+x+1} dx$$

(D) إذا كان المقام عبارة عن عوامل غير خطية مكررة (متساوية) ففي هذه الحالة نجزئ هذا المقام كما يلي :

$$\int \frac{F(x)}{(ax^2+b)^n} dx = \int \frac{Ax+B}{ax^2+b} dx + \int \frac{Cx+D}{(ax^2+b)^2} dx + \dots + \int \frac{Kx+H}{(ax^2+b)^n} dx$$

Ex :-

$$\int \frac{3x-2}{(x^2+1)^2} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+1} dx + \int \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2} dx$$

(E) إذا كان المقام عبارة عن خليط من العوامل الخطية والغير خطية المختلفة والمكررة ففي هذه الحالة نعامل كل عامل بطريقة تجزيته الخاصة به التي أوضحناها سابقاً.

Ex:-

$$\int \frac{3x-2}{(x+2)(x^2+1)x^2} dx = \int \frac{A}{x+2} dx + \int \frac{Bx+C}{x^2+1} dx + \int \frac{D}{x} dx + \int \frac{K}{x^2} dx$$

(3) نقوم بتوحيد مقامات الطرف الأيمن على أن يكون المقام المشترك لهذه المقامات هو مقام الطرف الأيسر لأنه يقبل القسمة على كل المقامات

(4) نساوي بسط الطرف الأيسر ببسط الطرف الأيمن لإيجاد المجاهيل

A , B , C

$$x + 2 = A(x+1) + B(x-2)$$

فإذا كانت

فيوجد ثلاثة طرق لإيجاد هذه المجاهيل :-

الطريقة الأولى :- نفرض قيم لـ x تجعل بعض حدود الطرف الأيمن تساوي صفراً وذلك في كل فرضية لـ x

Ex :-

$$x + 2 = A(x + 1) + B(x - 2)$$

$$-1 + 2 = A(-1 + 1) + B(-1 - 2) \quad , \quad x = -1$$

$$\therefore B = -\frac{1}{3}$$

$$2 + 2 = A(2 + 1) + B(2 - 2) \quad , \quad x = 2$$

$$\therefore A = \frac{4}{3}$$

الطريقة الثانية :- نفرض قيم عشوائية لـ x ونكوّن معادلات لإيجاد المجاهيل وذلك بحل هذه المعادلات بطريقة الحذف أو التعويض

Ex :-

$$x + 2 = A(x + 1) + B(x - 2)$$

$$0 + 2 = A(0 + 1) + B(0 - 2) \quad , \quad x = 0$$

$$A - 2B = 2 \longrightarrow (1)$$

$$1 + 2 = A(1 + 1) + B(1 - 2) \quad , \quad x = 1$$

$$2A - B = 3 \longrightarrow (2)$$

نستخدم طريقة الحذف لحل المعادلتين وذلك بضرب المعادلة (1) في العدد 2 ثم طرح المعادلتين

$$2A - 4B = 4 \quad (1)$$

$$2A - B = 3 \quad (2)$$

$$\begin{array}{r} 2A - 4B = 4 \\ 2A - B = 3 \\ \hline -3B = 1 \end{array} \quad \therefore B = -\frac{1}{3}$$

وبالتعويض في المعادلة (1) نحصل على $\therefore A = \frac{4}{3}$

الطريقة الثالثة :- وذلك بأن نساوي معاملات المتغيرات في الطرفين

Ex :-

$$x + 2 = A(x + 1) + B(x - 2)$$

بمساواة معاملات x في الطرفين $A + B = 1 \longrightarrow (1)$

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين $A - 2B = 2 \longrightarrow (2)$
نستخدم طريقة الحذف لحل المعادلتين وذلك بطرح المعادلتين

$$A + B = 1 \longrightarrow (1)$$

$$A - 2B = 2 \longrightarrow (2)$$

$$\begin{array}{r} A + B = 1 \\ A - 2B = 2 \\ \hline 3B = -1 \end{array} \quad \therefore B = -\frac{1}{3}$$

وبالتعويض في المعادلة (1) نحصل على $\therefore A = \frac{4}{3}$

(5) نعوض بالقيم التي حصلنا عليها في الكسور المجزئة ونكامل هذه الكسور كل كسر على حدة بقوانين أو بطرق التكامل المناسبة

مسائل على الكسور الجزئية

$$(1) \int \frac{5x-12}{x^2+4x} dx$$

$$(A) \int \frac{5x-12}{x(x+4)} dx$$

$$(B) \int \frac{5x-12}{x(x+4)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x+4} dx$$

$$(C) \frac{5x-12}{x(x+4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+4}$$

$$(D) \frac{5x-12}{x(x+4)} = \frac{A(x+4) + Bx}{x(x+4)}$$

$$(E) 5x-12 = A(x+4) + Bx$$

$$(F) 5(0)-12 = A(0+4) + B(0) \quad , x=0$$

$$\therefore A = -3$$

$$5(-4)-12 = A(-4+4) + B(-4) \quad , x=-4$$

$$\therefore B = 8$$

$$(g) \int \frac{5x-12}{x(x+4)} dx = -\int \frac{3}{x} dx + \int \frac{8}{x+4} dx$$

$$\int \frac{5x-12}{x(x+4)} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx + 8 \int \frac{1}{x+4} dx$$

$$= -3 \ln|x| + 8 \ln|x+4| + c$$

$$(2) \int \frac{x+34}{x^2-4x-12} dx$$

$$(A) \int \frac{x+34}{(x-6)(x+2)} dx$$

$$(B) \int \frac{x+34}{(x-6)(x+2)} dx = \int \frac{A}{x-6} dx + \int \frac{B}{x+2} dx$$

$$(C) \frac{x+34}{(x-6)(x+2)} = \frac{A}{x-6} + \frac{B}{x+2}$$

$$(D) \frac{x+34}{(x-6)(x+2)} = \frac{A(x+2)+B(x-6)}{(x-6)(x+2)}$$

$$(E) x+34 = A(x+2)+B(x-6)$$

$$(F) -2+34 = A(-2+2)+B(-2-6) \quad , \quad x = -2$$

$$\therefore B = -4$$

$$6+34 = A(6+2)+B(6-6) \quad , \quad x = 6$$

$$\therefore A = 5$$

$$(g) \int \frac{x+34}{(x-6)(x+2)} dx = \int \frac{5}{x-6} dx - \int \frac{4}{x+2} dx$$

$$\int \frac{x+34}{(x-6)(x+2)} dx = 5 \int \frac{1}{x-6} dx - 4 \int \frac{1}{x+2} dx$$

$$= 5 \ln|x-6| - 4 \ln|x+2| + c$$

$$(3) \int \frac{2x-4}{x^2-x} dx$$

$$(A) \int \frac{2x-4}{x(x-1)} dx$$

$$(B) \int \frac{2x-4}{x(x-1)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x-1} dx$$

$$(C) \frac{2x-4}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1}$$

$$(D) \frac{2x-4}{x(x-1)} = \frac{A(x-1) + Bx}{x(x-1)}$$

$$(E) 2x-4 = A(x-1) + Bx$$

$$(F) 2(0)-4 = A(0-1) + B(0) \quad , \quad x=0$$

$$\therefore A = 4$$

$$2(1)-4 = A(1-1) + B(1) \quad , \quad x=1$$

$$\therefore B = -2$$

$$(g) \int \frac{2x-4}{x(x-1)} dx = \int \frac{4}{x} dx - \int \frac{2}{x-1} dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-4}{x(x-1)} dx &= 4 \int \frac{1}{x} dx - 2 \int \frac{1}{x-1} dx \\ &= 4 \ln|x| - 2 \ln|x-1| + c \end{aligned}$$

$$(4) \int \frac{x+10}{2x^2+5x-3} dx$$

$$(A) \int \frac{x+10}{(2x-1)(x+3)} dx$$

$$(B) \int \frac{x+10}{(2x-1)(x+3)} dx = \int \frac{A}{2x-1} dx + \int \frac{B}{x+3} dx$$

$$(C) \frac{x+10}{(2x-1)(x+3)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{x+3}$$

$$(D) \frac{x+10}{(2x-1)(x+3)} = \frac{A(x+3)+B(2x-1)}{(2x-1)(x+3)}$$

$$(E) x+10 = A(x+3) + B(2x-1)$$

$$(F) \frac{1}{2} + 10 = A\left(\frac{1}{2} + 3\right) + B\left(2\left(\frac{1}{2}\right) - 1\right) \quad , \quad x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore A = 3$$

$$-3 + 10 = A(-3 + 3) + B(2(-3) - 1) \quad , \quad x = -3$$

$$\therefore B = -1$$

$$(g) \int \frac{x+10}{(2x-1)(x+3)} dx = \int \frac{3}{2x-1} dx - \int \frac{1}{x+3} dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x+10}{(2x-1)(x+3)} dx &= \frac{3}{2} \int \frac{2}{2x-1} dx - \int \frac{1}{x+3} dx \\ &= \frac{3}{2} \ln|2x-1| - \ln|x+3| + c \end{aligned}$$

$$(5) \int \frac{x^2-2}{x^3-x^2-2x} dx$$

$$(A) \int \frac{x^2-2}{x(x^2-x-2)} dx = \int \frac{x^2-2}{x(x-2)(x+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{x^2-2}{x(x-2)(x+1)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x-2} dx + \int \frac{C}{x+1} dx$$

$$(C) \frac{x^2-2}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+1}$$

$$(D) \frac{x^2-2}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A(x+1)(x-2) + B(x+1)x + C(x-2)x}{x(x-2)(x+1)}$$

$$(E) x^2-2 = A(x-2)(x+1) + B(x+1)x + C(x-2)x$$

$$(F) 1-2 = A(-1-2)(-1+1) + B(-1+1)(-1) + C(-1-2)(-1), x=-1$$

$$\therefore C = -\frac{1}{3}$$

$$4-2 = A(2-2)(2+1) + B(2+1)(2) + C(2-2)(2), x=2$$

$$\therefore B = \frac{1}{3}$$

$$0-2 = A(0-2)(0+1) + B(0+1)(0) + C(0-2)(0), x=0$$

$$\therefore A = 1$$

$$(g) \int \frac{x^2-2}{x(x-2)(x+1)} dx = \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{3} \int \frac{1}{x-2} dx - \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$\int \frac{x^2-2}{x(x-2)(x+1)} dx = \ln|x| + \frac{1}{3} \ln|x-2| - \frac{1}{3} \ln|x+1| + C$$

$$(6) \int \frac{4x^3 - 7x}{x^4 - 5x^2 + 4} dx$$

$$(A) \int \frac{4x^3 - 7x}{(x^2 - 4)(x^2 - 1)} dx = \int \frac{4x^3 - 7x}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)} dx$$

$$(B) \int \frac{4x^3 - 7x}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)} dx$$

$$= \int \frac{A}{x-2} dx + \int \frac{B}{x+2} dx + \int \frac{C}{x+1} dx + \int \frac{D}{x-1} dx$$

$$(C) \frac{4x^3 - 7x}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{x-1}$$

$$(D) \frac{4x^3 - 7x}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)} =$$

$$\frac{A(x+1)(x+2)(x-1) + B(x+1)(x-2)(x-1) + C(x-2)(x+2)(x-1) + D(x-2)(x+2)(x+1)}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)}$$

$$(E) 4x^3 - 7x =$$

$$A(x+1)(x+2)(x-1) + B(x+1)(x-2)(x-1) + C(x-2)(x+2)(x-1) + D(x-2)(x+2)(x+1)$$

$$(F) 4-7 = D(1-2)(1+2)(1+1) , x=1$$

$$\therefore D = \frac{1}{2}$$

$$-4+7 = C(-1-2)(-1+2)(-1-1) , x=-1$$

$$\therefore C = \frac{1}{2}$$

$$32-14 = A(2+1)(2+2)(2-1) , x=2$$

$$\therefore A = \frac{3}{2}$$

$$-32+14 = B(-2+1)(-2-2)(-2-1) , x=-2$$

$$\therefore B = \frac{3}{2}$$

$$(g) \int \frac{4x^3 - 7x}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)} dx$$

$$= \frac{3}{2} \int \frac{1}{x-2} dx + \frac{3}{2} \int \frac{1}{x+2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx$$

$$= \frac{3}{2} \ln|x-2| + \frac{3}{2} \ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|x-1| + c$$

$$(7) \int \frac{5x^2-10x-8}{x^3-4x} dx$$

$$(A) \int \frac{5x^2-10x-8}{x(x^2-4)} dx = \int \frac{5x^2-10x-8}{x(x-2)(x+2)} dx$$

$$(B) \int \frac{5x^2-10x-8}{x(x-2)(x+2)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x-2} dx + \int \frac{C}{x+2} dx$$

$$(C) \frac{5x^2-10x-8}{x(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2}$$

$$(D) \frac{5x^2-10x-8}{x(x-2)(x+2)} = \frac{A(x+2)(x-2) + B(x+2)x + C(x-2)x}{x(x-2)(x+2)}$$

$$(E) 5x^2-10x-8 = A(x+2)(x-2) + B(x+2)x + C(x-2)x$$

$$(F) -8 = A(0-2)(0+2), x=0$$

$$\therefore A=2$$

$$-8 = B(2+2)(2), x=2$$

$$\therefore B=-1$$

$$32 = C(-2-2)(-2), x=-2$$

$$\therefore C=4$$

$$(g) \int \frac{5x^2-10x-8}{x(x-2)(x+2)} dx = 2 \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x-2} dx + 4 \int \frac{1}{x+2} dx$$

$$\int \frac{5x^2-10x-8}{x(x-2)(x+2)} dx = 2\ln|x| - \ln|x-2| + 4\ln|x+2| + c$$

$$(8) \int \frac{x^2+x}{(x^2-4)(x+4)} dx$$

$$(A) \int \frac{x^2+x}{(x-2)(x+2)(x+4)} dx$$

$$(B) \int \frac{x^2+x}{(x-2)(x+2)(x+4)} dx = \int \frac{A}{x-2} dx + \int \frac{B}{x+2} dx + \int \frac{C}{x+4} dx$$

$$(C) \frac{x^2+x}{(x-2)(x+2)(x+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+4}$$

$$(D) \frac{x^2+x}{(x-2)(x+2)(x+4)} = \frac{A(x+2)(x+4) + B(x-2)(x+4) + C(x-2)(x+2)}{(x+4)(x-2)(x+2)}$$

$$(E) x^2+x = A(x+2)(x+4) + B(x-2)(x+4) + C(x-2)(x+2)$$

$$(F) 6 = A(2+2)(2+4) \quad , \quad x=2$$

$$\therefore A = \frac{1}{4}$$

$$2 = B(-2-2)(-2+4) \quad , \quad x=-2$$

$$\therefore B = -\frac{1}{4}$$

$$12 = C(-4-2)(-4+2) \quad , \quad x=-4$$

$$\therefore C = 1$$

$$(g) \int \frac{x^2+x}{(x-2)(x+2)(x+4)} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-2} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+2} dx + \int \frac{1}{x+4} dx$$

$$\int \frac{x^2+x}{(x-2)(x+2)(x+4)} dx = \frac{1}{4} \ln|x-2| - \frac{1}{4} \ln|x+2| + \ln|x+4| + c$$

$$(9) \int \frac{2x-3}{(x^2-x-2)(x+2)} dx$$

$$(A) \int \frac{2x-3}{(x-2)(x+1)(x+2)} dx$$

$$(B) \int \frac{2x-3}{(x-2)(x+2)(x+1)} dx = \int \frac{A}{x-2} dx + \int \frac{B}{x+2} dx + \int \frac{C}{x+1} dx$$

$$(C) \frac{2x-3}{(x-2)(x+2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+1}$$

$$(D) \frac{2x-3}{(x-2)(x+2)(x+1)} = \frac{A(x+2)(x+1) + B(x-2)(x+1) + C(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+2)(x+1)}$$

$$(E) 2x-3 = A(x+2)(x+1) + B(x-2)(x+1) + C(x-2)(x+2)$$

$$(F) -5 = C(-1-2)(-1+2) \quad , x = -1$$

$$\therefore C = \frac{5}{3}$$

$$-7 = B(-2-2)(-2+1) \quad , x = -2$$

$$\therefore B = -\frac{7}{4}$$

$$1 = A(2+2)(2+1) \quad , x = 2$$

$$\therefore A = \frac{1}{12}$$

$$(g) \int \frac{2x-3}{(x-2)(x+2)(x+1)} dx = \frac{1}{12} \int \frac{1}{x-2} dx - \frac{7}{4} \int \frac{1}{x+2} dx + \frac{5}{3} \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$\int \frac{2x-3}{(x-2)(x+2)(x+1)} dx = \frac{1}{12} \ln|x-2| - \frac{7}{4} \ln|x+2| + \frac{5}{3} \ln|x+1| + c$$

$$(10) \int \frac{2x^2-5x-1}{x^3-2x^2-x+2} dx$$

$$(A) \int \frac{2x^2-5x-1}{x^2(x-2)-(x-2)} dx = \int \frac{2x^2-5x-1}{(x-2)(x^2-1)} dx$$

$$= \int \frac{2x^2-5x-1}{(x-2)(x-1)(x+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{2x^2-5x-1}{(x-2)(x-1)(x+1)} dx = \int \frac{A}{x-2} dx + \int \frac{B}{x-1} dx + \int \frac{C}{x+1} dx$$

$$(C) \frac{2x^2-5x-1}{(x-2)(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}$$

$$(D) \frac{2x^2-5x-1}{(x-2)(x-1)(x+1)} = \frac{A(x-1)(x+1) + B(x-2)(x+1) + C(x-2)(x-1)}{(x-2)(x-1)(x+1)}$$

$$(E) 2x^2-5x-1 = A(x-1)(x+1) + B(x-2)(x+1) + C(x-2)(x-1)$$

$$(F) 6 = C(-1-2)(-1-1), x = -1$$

$$\therefore C = 1$$

$$-3 = A(2-1)(2+1), x = 2$$

$$\therefore A = -1$$

$$-4 = B(1-2)(1+1), x = 1$$

$$\therefore B = 2$$

$$(g) \int \frac{2x^2-5x-1}{(x-2)(x-1)(x+1)} dx = -\int \frac{1}{x-2} dx + 2\int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$\int \frac{2x^2-5x-1}{(x-2)(x-1)(x+1)} dx = -\ln|x-2| + 2\ln|x-1| + \ln|x+1| + c$$

$$(11) \int \frac{2x-4}{(x-1)^2} dx$$

$$(A) \int \frac{2x-4}{(x-1)^2} dx$$

$$(B) \int \frac{2x-4}{(x-1)^2} dx = \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{(x-1)^2} dx$$

$$(C) \frac{2x-4}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$$

$$(D) \frac{2x-4}{(x-1)^2} = \frac{A(x-1)+B}{(x-1)^2}$$

$$(E) 2x-4 = A(x-1)+B$$

$$(F) 2-4 = B \therefore B = -2 \quad , x=1$$

$$\therefore A = 2$$

بمساواة معاملات x في الطرفين لإيجاد A

$$(g) \int \frac{2x-4}{(x-1)^2} dx = \int \frac{2}{x-1} dx - \int \frac{2}{(x-1)^2} dx$$

$$\int \frac{2x-4}{(x-1)^2} dx = 2 \int \frac{1}{x-1} dx - 2 \int (x-1)^{-2} dx$$

$$= 2 \ln|x-1| + \frac{2}{x-1} + c$$

$$(12) \int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx$$

$$(A) \int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx$$

$$(B) \int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx = \int \frac{A}{x+2} dx + \int \frac{B}{(x+2)^2} dx + \int \frac{C}{(x+2)^3} dx$$

$$(C) \frac{x^2}{(x+2)^3} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{(x+2)^3}$$

$$(D) \frac{x^2}{(x+2)^3} = \frac{A(x+2)^2 + B(x+2) + C}{(x+2)^3}$$

$$(E) x^2 = A(x+2)^2 + B(x+2) + C$$

$$(F) \therefore C = 4, x = -2$$

$$\therefore A = 1 \quad \text{بمساواة معاملات } x^2 \text{ في الطرفين لإيجاد } A$$

$$0 = 4A + B \therefore B = -4 \quad \text{بمساواة معاملات } x \text{ في الطرفين لإيجاد } B$$

$$(g) \int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx = \int \frac{1}{x+2} dx - \int \frac{4}{(x+2)^2} dx + \int \frac{4}{(x+2)^3} dx$$

$$\int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx = \int \frac{1}{x+2} dx - 4 \int (x+2)^{-2} dx + 4 \int (x+2)^{-3} dx$$

$$= \ln|x+2| + \frac{4}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2} + c$$

$$(13) \int \frac{2x+2}{(x+1)^3} dx$$

$$(A) \int \frac{2x+2}{(x+1)^3} dx$$

$$(B) \int \frac{2x+2}{(x+1)^3} dx = \int \frac{A}{x+1} dx + \int \frac{B}{(x+1)^2} dx + \int \frac{C}{(x+1)^3} dx$$

$$(C) \frac{2x+2}{(x+1)^3} dx = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

$$(D) \frac{2x+2}{(x+1)^3} dx = \frac{A(x+1)^2 + B(x+1) + C}{(x+1)^3}$$

$$(E) 2x+2 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

$$(F) \therefore C = 0, x = -1$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين لإيجاد A

$$\therefore A = 0$$

بمساواة معاملات x في الطرفين لإيجاد B

$$2 = 2A + B \therefore B = 2$$

$$(g) \int \frac{2x+2}{(x+1)^3} dx = \int \frac{2}{(x+1)^2} dx$$

$$\int \frac{2x+2}{(x+1)^3} dx = 2 \int (x+1)^{-2} dx = -\frac{2}{x+1} + c$$

$$(14) \int \frac{x-2}{4x^2+4x+1} dx$$

$$(A) \int \frac{x-2}{(2x+1)^2} dx$$

$$(B) \int \frac{x-2}{(2x+1)^2} dx = \int \frac{A}{2x+1} dx + \int \frac{B}{(2x+1)^2} dx$$

$$(C) \frac{x-2}{(2x+1)^2} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{(2x+1)^2}$$

$$(D) \frac{x-2}{(2x+1)^2} = \frac{A(2x+1)+B}{(2x+1)^2}$$

$$(E) x-2 = A(2x+1)+B$$

(F)

بمساواة معاملات x في الطرفين لإيجاد A

$$1 = 2A \quad \therefore A = \frac{1}{2}$$

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين لإيجاد B

$$-2 = A + B \quad \therefore B = -\frac{5}{2}$$

$$(g) \int \frac{x-2}{(2x+1)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{2x+1} dx - \frac{5}{2} \int \frac{1}{(2x+1)^2} dx$$

$$\int \frac{x-2}{(2x+1)^2} dx = \frac{1}{4} \int \frac{2}{2x+1} dx - \frac{5}{4} \int 2(2x+1)^{-2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \ln|2x+1| + \frac{5}{8x+4} + c$$

$$(15) \int \frac{2x^2+3}{x^4-2x^2+1} dx$$

$$(A) \int \frac{2x^2+3}{(x^2-1)(x^2-1)} dx = \int \frac{2x^2+3}{(x-1)(x+1)(x+1)(x-1)} dx$$

$$= \int \frac{2x^2+3}{(x-1)^2(x+1)^2} dx$$

$$(B) \int \frac{2x^2+3}{(x-1)^2(x+1)^2} dx$$

$$= \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{(x-1)^2} dx + \int \frac{C}{x+1} dx + \int \frac{D}{(x+1)^2} dx$$

$$(C) \frac{2x^2+3}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2}$$

$$(D) \frac{2x^2+3}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A(x-1)(x+1)^2 + B(x+1)^2 + C(x-1)^2(x+1) + D(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)^2}$$

$$(E) 2x^2+3 = A(x-1)(x+1)^2 + B(x+1)^2 + C(x-1)^2(x+1) + D(x-1)^2$$

$$(F) \quad 5 = B(1+1)^2, \quad x=1$$

$$\therefore B = \frac{5}{4}$$

$$5 = D(-1-1)^2, \quad x=-1$$

$$\therefore D = \frac{5}{4}$$

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$0 = A + C \longrightarrow (1)$$

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين

$$3 = -A + \frac{5}{4} + C + \frac{5}{4}, \quad x=0$$

$$-A + C = \frac{1}{2} \longrightarrow (2)$$

وبجمع (1) مع (2) نحصل على $C = \frac{1}{4}$ $\therefore A = -\frac{1}{4}$ (1) وبالتعويض في

$$(g) \int \frac{2x^2+3}{(x-1)^2(x+1)^2} dx$$

$$= -\frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{5}{4} \int \frac{1}{(x-1)^2} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{5}{4} \int \frac{1}{(x+1)^2} dx$$

$$= -\frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{5}{4} \int (x-1)^{-2} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{5}{4} \int (x+1)^{-2} dx$$

$$= -\frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{5}{4x-4} + \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{5}{4x+4} + c$$

$$(16) \int \frac{dx}{x^4 + 4x^2 + 3}$$

$$(A) \int \frac{1}{(x^2+3)(x^2+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{1}{(x^2+3)(x^2+1)} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+3} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx$$

$$(C) \frac{1}{(x^2+3)(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+3} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{1}{(x^2+3)(x^2+1)} = \frac{(Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+3)}{(x^2+3)(x^2+1)}$$

$$(E) 1 = (Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+3)$$

(F)

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$A + C = 0 \longrightarrow (1)$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$B + D = 0 \longrightarrow (2)$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$A + 3C = 0 \longrightarrow (3)$$

بمساواة معاملات الحدود المطلقة في الطرفين

$$B + 3D = 1 \longrightarrow (4)$$

ب طرح (1) من (3) نحصل على $C=0$ وبالتعويض في (1) $A=0$

ب طرح (2) من (4) نحصل على $D=\frac{1}{2}$ وبالتعويض في (2) $B=-\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}
 (g) \int \frac{1}{(x^2+3)(x^2+1)} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+3} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} dx \\
 &= -\frac{1}{6} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} dx \\
 &= -\frac{1}{2\sqrt{3}} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} dx \\
 &= -\frac{1}{2\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{2} \tan^{-1}(x) + c
 \end{aligned}$$

$$(17) \int \frac{dx}{x^4+5x^2+4}$$

$$(A) \int \frac{1}{(x^2+4)(x^2+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{1}{(x^2+4)(x^2+1)} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+4} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx$$

$$(C) \frac{1}{(x^2+4)(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{1}{(x^2+4)(x^2+1)} = \frac{(Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+4)}{(x^2+4)(x^2+1)}$$

$$(E) 1 = (Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+4)$$

(F)

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$A + C = 0 \longrightarrow (1)$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$B + D = 0 \longrightarrow (2)$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$A + 4C = 0 \longrightarrow (3)$$

بمساواة معاملات الحدود المطلقة في الطرفين

$$B + 4D = 1 \longrightarrow (4)$$

ب طرح (1) من (3) نحصل على $C = 0$. وبالتعويض في (1) $A = 0$.

ب طرح (2) من (4) نحصل على $D = \frac{1}{3}$. وبالتعويض في (2) $B = -\frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned}(g) \int \frac{1}{(x^2+4)(x^2+1)} dx &= -\frac{1}{3} \int \frac{1}{x^2+4} dx + \frac{1}{3} \int \frac{1}{x^2+1} dx \\&= -\frac{1}{12} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1} dx + \frac{1}{3} \int \frac{1}{x^2+1} dx \\&= -\frac{1}{6} \int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1} dx + \frac{1}{3} \int \frac{1}{x^2+1} dx \\&= -\frac{1}{6} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{3} \tan^{-1}(x) + c\end{aligned}$$

$$(18) \int \frac{dx}{(x^2+x+1)(x^2+1)}$$

$$(A) \int \frac{1}{(x^2+x+1)(x^2+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{1}{(x^2+x+1)(x^2+1)} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+x+1} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx$$

$$(C) \frac{1}{(x^2+x+1)(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{1}{(x^2+x+1)(x^2+1)} = \frac{(Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+x+1)}{(x^2+x+1)(x^2+1)}$$

$$(E) 1 = (Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+x+1)$$

$$(F)$$

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$A + C = 0 \longrightarrow (1)$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$B + C + D = 0 \longrightarrow (2)$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$A + C + D = 0 \longrightarrow (3)$$

بمساواة معاملات الحدود المطلق في الطرفين

$$B + D = 1 \longrightarrow (4)$$

ب طرح (1) من (3) نحصل على $D=0$.

بطرح (2) من (4) نحصل على $C = -1$.

وبالتعويض بالقيم التي حصلنا عليها في (2) ، (3) $A=1, B=1$.

$$\begin{aligned}
 (g) \int \frac{dx}{(x^2+x+1)(x^2+1)} &= \int \frac{x+1}{x^2+x+1} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+x+1} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} dx - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx + \frac{2}{3} \int \frac{1}{(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}})^2+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx + \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}})^2+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln|x^2+x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}}) - \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + c
 \end{aligned}$$

$$(19) \int \frac{dx}{x^4+2x^3+3x^2+2x+2}$$

$$(A) \int \frac{dx}{x^4+2x^3+2x^2+x^2+2x+2} = \int \frac{dx}{x^2(x^2+2x+2)+(x^2+2x+2)}$$

$$= \int \frac{1}{(x^2+2x+2)(x^2+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{1}{(x^2+2x+2)(x^2+1)} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+2x+2} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx$$

$$(C) \frac{1}{(x^2+2x+2)(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+2x+2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{1}{(x^2+2x+2)(x^2+1)} = \frac{(Ax+B)(x^2+1)+(Cx+D)(x^2+2x+2)}{(x^2+2x+2)(x^2+1)}$$

$$(E) 1 = (Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+2x+2)$$

(F)

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$A + C = 0 \longrightarrow (1)$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$B + 2C + D = 0 \longrightarrow (2)$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$A + 2C + 2D = 0 \longrightarrow (3)$$

بمساواة معاملات الحدود المطلقة في الطرفين

$$B + 2D = 1 \longrightarrow (4)$$

بطرح (1) من (3) نحصل على (5) $C + 2D = 0 \longrightarrow$

بطرح (2) من (4) نحصل على (6) $D - 2C = 1 \longrightarrow$

وبضرب المعادلة (5) في العدد 2 وجمع المعادلتين (5)، (6) نحصل على
 $\therefore C = -\frac{2}{5}, D = \frac{1}{5}$
 وبالتعويض بالقيم التي حصلنا عليها في (1)، (4) نحصل على

$$\therefore A = \frac{2}{5}, B = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} (g) \int \frac{dx}{(x^2+2x+2)(x^2+1)} &= \int \frac{\frac{2}{5}x + \frac{3}{5}}{x^2+2x+2} dx + \int \frac{-\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{2x+3}{x^2+2x+2} dx - \frac{1}{5} \int \frac{2x-1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx + \frac{1}{5} \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx - \frac{1}{5} \int \frac{2x-1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx + \frac{1}{5} \int \frac{1}{x^2+2x+1-1+2} dx - \frac{1}{5} \int \frac{2x-1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx + \frac{1}{5} \int \frac{1}{(x+1)^2+1} dx - \frac{1}{5} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \frac{1}{5} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{5} \ln|x^2+2x+2| + \frac{1}{5} \tan^{-1}(x+1) - \frac{1}{5} \ln|x^2+1| + \frac{1}{5} \tan^{-1}(x) + c \end{aligned}$$

$$(20) \int \frac{x^3+2x+2}{x^4+2x^2+1} dx$$

$$(A) \int \frac{x^3+2x+2}{(x^2+1)^2} dx$$

$$(B) \int \frac{x^3+2x+2}{(x^2+1)^2} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+1} dx + \int \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2} dx$$

$$(C) \frac{x^3+2x+2}{(x^2+1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2}$$

$$(D) \frac{x^3+2x+2}{(x^2+1)^2} = \frac{(Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)}{(x^2+1)^2}$$

$$(E) x^3+2x+2 = (Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)$$

(F)

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$\therefore A = 1$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$\therefore B = 0$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$A + C = 2 \quad \therefore C = 1$$

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين

$$B + D = 2 \quad \therefore D = 2$$

$$\begin{aligned}
 (g) \int \frac{x^3+2x+2}{(x^2+1)^2} dx &= \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{x+2}{(x^2+1)^2} dx \\
 &= \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx + \int \frac{2}{(x^2+1)^2} dx = I_1 + I_2 + I_3 \\
 I_1 &= \int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + c_1 \\
 I_2 &= \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \frac{1}{2} \int 2x(x^2+1)^{-2} dx = \frac{-1}{2x^2+2} + c_2 \\
 I_3 &= \int \frac{2}{(x^2+1)^2} dx
 \end{aligned}$$


التعويضات المثلثية :-

(A) نفرض أن $x = \tan \theta$

(B) نعين قيمة النسبة المثلثية وقيمة θ من الفرضية السابقة

$$\tan \theta = x$$

$$\theta = \tan^{-1}(x)$$



$$dx = \sec^2 \theta d\theta$$

(c) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ θ

(D) نعوض بالفرضية $x = \tan \theta$ ونفاضلها $dx = \sec^2 \theta d\theta$

في مسألة التكامل

$$\begin{aligned}
& \int \frac{2}{(\tan^2 \theta + 1)^2} \sec^2 \theta \, d\theta = 2 \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec^4 \theta} \, d\theta \\
& = 2 \int \frac{1}{\sec^2 \theta} \, d\theta = 2 \int \cos^2 \theta \, d\theta \\
& = 2 \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\
& = \int d\theta + \frac{1}{2} \int 2 \cos 2\theta \, d\theta \\
& = \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta + c_3 \\
& = \theta + \frac{1}{2} 2 \sin \theta \cos \theta + c_3 \\
& = \theta + \sin \theta \cos \theta + c_3
\end{aligned}$$

(E) نكتب المسألة بدلالة x

$$\begin{aligned}
& = \tan^{-1}(x) + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + c_3 \\
& = \tan^{-1}(x) + \frac{x}{1+x^2} + c_3 \\
& I_1 + I_2 + I_3 = \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + c_1 - \frac{1}{2x^2+2} + c_2 + \tan^{-1}(x) + \frac{x}{1+x^2} + c_3 \\
& = \frac{1}{2} \ln|x^2+1| - \frac{1}{2x^2+2} + \tan^{-1}(x) + \frac{x}{1+x^2} + c, \quad c = c_1 + c_2 + c_3
\end{aligned}$$

$$(21) \int \frac{x^3+x}{x^4+4x^2+4} dx$$

$$(A) \int \frac{x^3+x}{(x^2+2)^2} dx$$

$$(B) \int \frac{x^3+x}{(x^2+2)^2} dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+2} dx + \int \frac{Cx+D}{(x^2+2)^2} dx$$

$$(C) \frac{x^3+x}{(x^2+2)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+2} + \frac{Cx+D}{(x^2+2)^2}$$

$$(D) \frac{x^3+x}{(x^2+2)^2} = \frac{(Ax+B)(x^2+2) + (Cx+D)}{(x^2+2)^2}$$

$$(E) x^3+x = (Ax+B)(x^2+2) + (Cx+D)$$

(F)

$$\therefore A=1$$

$$\therefore B=0$$

$$2A+C=1 \quad \therefore C=-1$$

$$2B+D=0 \quad \therefore D=0$$

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

بمساواة معاملات x في الطرفين

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين

$$\begin{aligned}
 (g) \int \frac{x^3+x}{(x^2+2)^2} dx &= \int \frac{x}{x^2+2} dx - \int \frac{x}{(x^2+2)^2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+2} dx - \frac{1}{2} \int 2x(x^2+2)^{-2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln|x^2+2| + \frac{1}{2x^2+4} + c
 \end{aligned}$$

$$(22) \int \frac{x^3-4x-1}{x(x-1)^3} dx$$

$$(A) \int \frac{x^3-4x-1}{x(x-1)^3} dx$$

$$(B) \int \frac{x^3-4x-1}{x(x-1)^3} dx$$

$$= \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x-1} dx + \int \frac{C}{(x-1)^2} dx + \int \frac{D}{(x-1)^3} dx$$

$$(C) \frac{x^3-4x-1}{x(x-1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{(x-1)^3}$$

$$(D) \frac{x^3-4x-1}{x(x-1)^3} = \frac{A(x-1)^3 + Bx(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx}{x(x-1)^3}$$

$$(E) x^3-4x-1 = A(x-1)^3 + Bx(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx$$

$$(F) \quad -1 = A(0-1)^3, \quad x=0$$

$$\therefore A=1$$

$$1-4-1=D, \quad x=1$$

$$\therefore D=-4$$

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$1 = A + B \quad \therefore B = 0$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$-4 = 3A + B - C + D$$

$$-4 = 3 + 0 - C - 4$$

$$\therefore C = 3$$

$$(g) \int \frac{x^3 - 4x - 1}{x(x-1)^3} dx$$

$$= \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{3}{(x-1)^2} dx - \int \frac{4}{(x-1)^3} dx$$

$$= \int \frac{1}{x} dx + 3 \int (x-1)^{-2} dx - 4 \int (x-1)^{-3} dx$$

$$= \ln|x| - \frac{3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + c$$

$$(23) \int \frac{x^2+1}{x^3+2x^2+x} dx$$

$$(A) \int \frac{x^2+1}{x(x^2+2x+1)} dx = \int \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} dx$$

$$(B) \int \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x+1} dx + \int \frac{C}{(x+1)^2} dx$$

$$(C) \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$(D) \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} = \frac{A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx}{x(x+1)^2}$$

$$(E) x^2+1 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx$$

$$(F) 1 = A(0+1)^3, \quad x=0$$

$$\therefore A=1$$

$$1+1 = -C, \quad x=-1$$

$$\therefore C=-2$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$1 = A + B \quad \therefore B=0$$

$$\begin{aligned}
 (g) \int \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} dx &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{2}{(x+1)^2} dx \\
 &= \int \frac{1}{x} dx - 2 \int (x+1)^{-2} dx \\
 &= \ln|x| + \frac{2}{x+1} + c
 \end{aligned}$$

$$(24) \int \frac{3x^3-3x^2+2x-1}{x^4+x^2} dx$$

$$(A) \int \frac{3x^3-3x^2+2x-1}{x^2(x^2+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{3x^3-3x^2+2x-1}{x^2(x^2+1)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x^2} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx$$

$$(C) \frac{3x^3-3x^2+2x-1}{x^2(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{3x^3-3x^2+2x-1}{x^2(x^2+1)} = \frac{Ax(x^2+1)+B(x^2+1)+(Cx+D)x^2}{x^2(x^2+1)}$$

$$(E) 3x^3-3x^2+2x-1 = Ax(x^2+1)+B(x^2+1)+(Cx+D)x^2$$

$$(F) -1 = B(0+1) , x=0$$

$$\therefore B = -1$$

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$3 = A + C \longrightarrow (1)$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$-3 = B + D \quad \therefore D = -2$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$\therefore A = 2$$

وبالتعويض في (1) نحصل على $C = 1$

$$\begin{aligned} (g) \int \frac{3x^3 - 3x^2 + 2x - 1}{x^2(x^2 + 1)} dx &= 2 \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{x-2}{x^2+1} dx \\ &= 2 \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{x}{x^2+1} dx - 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= 2 \int \frac{1}{x} dx - \int x^{-2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx - 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= 2 \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|x^2+1| - 2 \tan^{-1}(x) + c \end{aligned}$$

$$(25) \int \frac{x^2}{x^4-1} dx$$

$$(A) \int \frac{x^2}{(x^2-1)(x^2+1)} dx = \int \frac{x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} dx = \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{x+1} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx$$

$$(C) \frac{x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$= \frac{A(x+1)(x^2+1) + B(x^2+1)(x-1) + (Cx+D)(x+1)(x-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$(E) x^2 = A(x+1)(x^2+1) + B(x^2+1)(x-1) + (Cx+D)(x+1)(x-1)$$

$$(F) 1 = B(1+1)(-1-1) \quad , \quad x = -1$$

$$\therefore B = -\frac{1}{4}$$

$$1 = A(1+1)(1+1) \quad , \quad x = 1$$

$$\therefore A = \frac{1}{4}$$

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$0 = A + B + C \quad \therefore C = 0$$

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين

$$0 = A - B - D \quad \therefore D = \frac{1}{2}$$

$$(g) \int \frac{x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} dx$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{2} \tan^{-1}(x) + c$$

$$(26) \int \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

$$(A) \int \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} dx = \int \frac{A}{x+1} dx + \int \frac{Bx+C}{x^2+1} dx$$

$$(C) \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1)}{(x+1)(x^2+1)}$$

$$(E) x = A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1)$$

$$(F) \quad -1 = A(1+1) \quad , \quad x = -1$$

$$\therefore A = -\frac{1}{2}$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$0 = A + B \quad \therefore B = \frac{1}{2}$$

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين

$$1 = C + A \quad \therefore C = \frac{1}{2}$$

$$(g) \int \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{x^2+1} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= -\frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{4} \ln|x^2+1| + \frac{1}{2} \tan^{-1}(x) + c$$

$$(27) \int \frac{x^2+1}{x^3+x^2+x} dx$$

$$(A) \int \frac{x^2+1}{x(x^2+x+1)} dx$$

$$(B) \int \frac{x^2+1}{x(x^2+x+1)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{Bx+C}{x^2+x+1} dx$$

$$(C) \frac{x^2+1}{x(x^2+x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

$$(D) \frac{x^2+1}{x(x^2+x+1)} = \frac{A(x^2+x+1) + (Bx+C)x}{x(x^2+x+1)}$$

$$(E) x^2+1 = A(x^2+x+1) + (Bx+C)x$$

$$(F) A=1, x=0$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$1 = A + B \quad \therefore B = 0$$

بمساواة معاملات x في الطرفين

$$0 = A + C \quad \therefore C = -1$$

$$\begin{aligned}
 (g) \int \frac{x^2+1}{x(x^2+x+1)} dx &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{dx}{x^2+x+1} \\
 &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{dx}{x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1} \\
 &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} = \int \frac{1}{x} dx - \frac{4}{3} \int \frac{dx}{(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}})^2+1} \\
 &= \int \frac{1}{x} dx - \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}})^2+1} dx \\
 &= \ln|x| - \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}}) + c
 \end{aligned}$$

$$(28) \int \frac{x-1}{x^5-x^3} dx$$

$$\begin{aligned}
 (A) \int \frac{x-1}{x^5-x^3} dx &= \int \frac{x-1}{x^3(x^2-1)} dx = \int \frac{x-1}{x^3(x-1)(x+1)} dx \\
 &= \int \frac{1}{x^3(x+1)} dx
 \end{aligned}$$

$$(B) \int \frac{1}{x^3(x+1)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x^2} dx + \int \frac{C}{x^3} dx + \int \frac{D}{x+1} dx$$

$$(C) \frac{1}{x^3(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x+1}$$

$$(D) \frac{1}{x^3(x+1)} = \frac{A(x+1)x^2 + Bx(x+1) + C(x+1) + Dx^3}{x^3(x+1)}$$

$$(E) 1 = A(x+1)x^2 + Bx(x+1) + C(x+1) + Dx^3$$

$$(F) 1 = C(0+1) \quad , \quad x=0$$

$$\therefore C = 1$$

$$1 = -D \quad , \quad x = -1$$

$$\therefore D = -1$$

بمساواة معاملات x^3 في الطرفين

$$0 = A + D \quad \therefore A = 1$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$0 = A + B \quad \therefore B = -1$$

$$(g) \int \frac{1}{x^3(x+1)} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{x^3} dx - \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$= \int \frac{1}{x} dx - \int x^{-2} dx + \int x^{-3} dx - \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$= \ln|x| + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \ln|x+1| + c$$

$$(29) \int \frac{2x-3}{(x-1)(x^2-3x+2)} dx$$

$$(A) \int \frac{2x-3}{(x-1)(x-1)(x-2)} dx = \int \frac{2x-3}{(x-1)^2(x-2)} dx$$

$$(B) \int \frac{2x-3}{(x-1)^2(x-2)} dx = \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{(x-1)^2} dx + \int \frac{C}{x-2} dx$$

$$(C) \frac{2x-3}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$$

$$(D) \frac{2x-3}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A(x-1)(x-2) + B(x-2) + C(x-1)^2}{(x-1)^2(x-2)}$$

$$(E) 2x-3 = A(x-1)(x-2) + B(x-2) + C(x-1)^2$$

$$(F) -1 = B(1-2) \quad , \quad x=1$$

$$\therefore B=1$$

$$1 = C(2-1)^2 \quad , \quad x=2$$

$$\therefore C=1$$

$$0 = A + C \quad \therefore A = -1$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$(g) \int \frac{2x-3}{(x-1)^2(x-2)} dx = -\int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1}{x-2} dx$$

$$= -\int \frac{1}{x-1} dx + \int (x-1)^{-2} dx + \int \frac{1}{x-2} dx$$

$$= -\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \ln|x-2| + c$$

$$(30) \int \frac{dx}{x^3+8}$$

$$(A) \int \frac{1}{(x+2)(x^2-2x+4)} dx$$

$$(B) \int \frac{1}{(x+2)(x^2-2x+4)} dx = \int \frac{A}{x+2} dx + \int \frac{Bx+C}{x^2-2x+4} dx$$

$$(C) \frac{1}{(x+2)(x^2-2x+4)} = \frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+4}$$

$$(D) \frac{1}{(x+2)(x^2-2x+4)} = \frac{A(x^2-2x+4) + (Bx+C)(x+2)}{(x+2)(x^2-2x+4)}$$

$$(E) 1 = A(x^2-2x+4) + (Bx+C)(x+2)$$

$$(F) 1 = A(4+4+4), x = -2$$

$$\therefore A = \frac{1}{12}$$

بمساواة معاملات x^2 في الطرفين

$$0 = A + B \quad \therefore B = -\frac{1}{12}$$

بمساواة الحدود المطلقة في الطرفين

$$1 = 4A + 2C \quad \therefore C = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} (g) \int \frac{1}{(x+2)(x^2-2x+4)} dx &= \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+2} dx + \int \frac{-\frac{1}{12}x + \frac{1}{3}}{x^2-2x+4} dx \\ &= \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+2} dx - \frac{1}{12} \int \frac{x-4}{x^2-2x+4} dx \\ &= \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+2} dx - \frac{1}{24} \int \frac{2x-8}{x^2-2x+4} dx \\ &= \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+2} dx - \frac{1}{24} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+4} dx + \frac{6}{24} \int \frac{1}{x^2-2x+4} dx \\ &= \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+2} dx - \frac{1}{24} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+4} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x^2-2x+1+3} dx \\ &= \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+2} dx - \frac{1}{24} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+4} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{(x-1)^2+3} dx \\ &= \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+2} dx - \frac{1}{24} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+4} dx + \frac{\sqrt{3}}{12} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{(\frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}})^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{12} \ln|x+2| - \frac{1}{24} \ln|x^2-2x+4| + \frac{\sqrt{3}}{12} \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + c \end{aligned}$$

$$(31) \int \frac{dx}{e^{2x} + 2e^x + 1}$$

التكامل بالتعويض :-

(A) نفرض أن $u = e^x$ ومنها

(B) نعين تفاضل الفرضية بالنسبة لـ

$$du = u \, dx \Leftrightarrow du = \underline{e^x} \, dx \quad x$$

(C) نعوض بـ $u = e^x$, $du = u \, dx$ في مسألة التكامل

$$\begin{aligned} &= \int \frac{1}{u^2 + 2u + 1} \frac{du}{u} \\ &= \int \frac{du}{u(u^2 + 2u + 1)} = \int \frac{du}{u(u+1)^2} \end{aligned}$$

$$(1) \int \frac{du}{u(u+1)^2}$$

$$(2) \int \frac{du}{u(u+1)^2} = \int \frac{A}{u} du + \int \frac{B}{u+1} du + \int \frac{C}{(u+1)^2} du$$

$$(3) \frac{1}{u(u+1)^2} = \frac{A}{u} + \frac{B}{u+1} + \frac{C}{(u+1)^2}$$

$$(4) \frac{1}{u(u+1)^2} = \frac{A(u+1)^2 + B(u+1)u + C u}{u(u+1)^2}$$

$$(5) 1 = A(u+1)^2 + B(u+1)u + C u$$

$$(6) 1 = A(0+1)^2, u = 0$$

$$\therefore A = 1$$

$$1 = C(-1), u = -1$$

$$\therefore C = -1$$

بمساواة معاملات u^2 في الطرفين لإيجاد B

$$0 = A + B \quad \therefore B = -1$$

$$(7) \int \frac{du}{u(u+1)^2} = \int \frac{1}{u} du - \int \frac{1}{u+1} du - \int \frac{1}{(u+1)^2} du$$

$$\int \frac{du}{u(u+1)^2} = \int \frac{1}{u} du - \int \frac{1}{u+1} du - \int (u+1)^{-2} du$$

$$= \ln|u| - \ln|u+1| + \frac{1}{u+1} + c$$

(E) نعوض بـ $u = e^x$

$$= \ln|e^x| - \ln|e^x + 1| + \frac{1}{e^x + 1} + c$$

ثانياً إذا كانت درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام :-

في هذه الحالة نقوم بقسمة البسط على المقام باستخدام القسمة المطولة

$$\int \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}} dx$$



$$\int \left(\text{ناتج القسمة} + \frac{\text{باقي خارج القسمة}}{\text{المقام}} \right) dx$$

ثم نقوم بإيجاد التكامل باستخدام قوانين أو طرق التكامل المناسبة

مسائل على القسمة المطولة

$$(1) \int \frac{x^4}{x-2} dx$$

$$\begin{array}{r} x-2 \overline{) \begin{array}{r} x^3+2x^2+4x+8 \\ x^4 \\ \hline x^4-2x^3 \\ \hline 2x^3 \\ 2x^3-4x^2 \\ \hline 4x^2 \\ 4x^2-8x \\ \hline 8x \\ 8x-16 \\ \hline 16 \end{array}} \end{array}$$

$$\int (x^3 + 2x^2 + 4x + 8 + \frac{16}{x-2}) dx$$

$$= \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 8x + 16\ln|x-2| + c$$

$$(2) \int \frac{2x^3}{x^2+1} dx$$

$$\begin{array}{r} x^2+1 \overline{) 2x^3} \\ \underline{2x^3+2x} \\ -2x \end{array}$$

$$\int (2x - \frac{2x}{x^2+1}) dx$$

$$= x^2 - \ln|x^2+1| + c$$

$$(3) \int \frac{x^2}{x^2+4} dx$$

$$\begin{array}{r} x^2+4 \overline{) x^2} \\ \underline{x^2+4} \\ -4 \end{array}$$

$$\int (1 - \frac{4}{x^2+4}) dx = \int dx - \frac{4}{4} \int \frac{1}{(\frac{x}{2})^2+1} dx$$

$$= \int dx - 2 \int \frac{\frac{1}{2}}{(\frac{x}{2})^2+1} dx = x - 2 \tan^{-1}(\frac{x}{2}) + c$$

$$(4) \int \frac{x^4 + 3x^2 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - 2x} dx$$

$$\begin{array}{r} x+1 \\ x^3 - x^2 - 2x \overline{) x^4 + 3x^2 - 3x + 2} \\ \underline{x^4 - x^3 - 2x^2} \\ 3x^3 + 5x^2 - 3x + 2 \\ \underline{3x^3 - x^2 - 2x} \\ 6x^2 - x + 2 \end{array}$$

$$\int \left(x+1 + \frac{6x^2 - x + 2}{x^3 - x^2 - 2x} \right) dx$$

$$\int (x+1) dx + \int \left(\frac{6x^2 - x + 2}{x^3 - x^2 - 2x} \right) dx = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \int (x+1) dx = \frac{1}{2}x^2 + x + c_1$$

$$I_2 = \int \left(\frac{6x^2 - x + 2}{x^3 - x^2 - 2x} \right) dx$$

الكسور الجزئية :-

$$\begin{aligned} (A) \int \left(\frac{6x^2 - x + 2}{x^3 - x^2 - 2x} \right) dx &= \int \frac{6x^2 - x + 2}{x(x^2 - x - 2)} dx \\ &= \int \frac{6x^2 - x + 2}{x(x-2)(x+1)} dx \end{aligned}$$

$$(B) \int \frac{6x^2 - x + 2}{x(x-2)(x+1)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x-2} dx + \int \frac{C}{x+1} dx$$

$$(C) \frac{6x^2-x+2}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+1}$$

$$(D) \frac{6x^2-x+2}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A(x+1)(x-2) + B(x+1)x + C(x-2)x}{x(x-2)(x+1)}$$

$$(E) 6x^2 - x + 2 = A(x+1)(x-2) + B(x+1)x + C(x-2)x$$

$$(F) 2 = A(0+1)(0-2) \quad , \quad x=0$$

$$\therefore A = -1$$

$$24 = B(2+1)(2) \quad , \quad x=2$$

$$\therefore B = 4$$

$$9 = C(-1-2)(-1) \quad , \quad x=-1$$

$$\therefore C = 3$$

$$(g) \int \frac{6x^2-x+2}{x(x-2)(x+1)} dx = -\int \frac{1}{x} dx + 4 \int \frac{1}{x-2} dx + 3 \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$I_2 = \int \frac{6x^2-x+2}{x(x-2)(x+1)} dx = -\ln|x| + 4\ln|x-2| + 3\ln|x+1| + c_2$$

$$I_1 + I_2 = \frac{1}{2}x^2 + x - \ln|x| + 4\ln|x-2| + 3\ln|x+1| + c \quad , \quad c = c_1 + c_2$$

$$(5) \int \frac{x^2+2x-4}{x^2-x-6} dx$$

$$\frac{x^2-x-6 \sqrt{\frac{1}{x^2-x-6}}}{3x+2}$$

$$\int (1 + \frac{3x+2}{x^2-x-6}) dx = \int dx + \int \frac{3x+2}{x^2-x-6} dx$$

$$\int dx + \frac{3}{2} \int \frac{2x+\frac{4}{3}}{x^2-x-6} dx = \int dx + \frac{3}{2} \int \frac{2x-1+1+\frac{4}{3}}{x^2-x-6} dx$$

$$= \int dx + \frac{3}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-6} dx + \frac{7}{2} \int \frac{1}{x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-6} dx$$

$$= \int dx + \frac{3}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-6} dx + \frac{7}{2} \int \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 - \frac{25}{4}} dx$$

$$= \int dx + \frac{3}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-6} dx + \frac{14}{25} \int \frac{1}{(\frac{2}{5}x - \frac{1}{5})^2 - 1} dx$$

$$= \int dx + \frac{3}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-6} dx - \frac{7}{5} \int \frac{\frac{2}{5}}{1 - (\frac{2}{5}x - \frac{1}{5})^2} dx$$

$$= x + \frac{3}{2} \ln|x^2-x-6| - \frac{7}{5} \tanh^{-1}(\frac{2}{5}x - \frac{1}{5}) + c, \quad |\frac{2}{5}x - \frac{1}{5}| < 1$$

$$= x + \frac{3}{2} \ln|x^2-x-6| - \frac{7}{5} \coth^{-1}(\frac{2}{5}x - \frac{1}{5}) + c, \quad |\frac{2}{5}x - \frac{1}{5}| > 1$$

$$(6) \int \frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 3x - 4} dx$$

$$\frac{x^2 + 3x - 4 \sqrt{\frac{1}{x^2 - x - 6}}}{x^2 + 3x - 4} = \frac{1}{-4x - 2}$$

$$\begin{aligned} \int \left(1 - \frac{4x+2}{x^2+3x-4}\right) dx &= \int dx - \int \frac{4x+2}{x^2+3x-4} dx \\ \int dx - 2 \int \frac{2x+1}{x^2+3x-4} dx &= \int dx - 2 \int \frac{2x+3-3+1}{x^2+3x-4} dx \\ &= \int dx - 2 \int \frac{2x+3}{x^2+3x-4} dx + 4 \int \frac{1}{x^2+3x+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}-4} dx \end{aligned}$$

$$= \int dx - 2 \int \frac{2x+3}{x^2+3x-4} dx + 4 \int \frac{1}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}} dx$$

$$= \int dx - 2 \int \frac{2x+3}{x^2+3x-4} dx + \frac{16}{25} \int \frac{1}{\left(\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}\right)^2 - 1} dx$$

$$= \int dx - 2 \int \frac{2x+3}{x^2+3x-4} dx - \frac{8}{5} \int \frac{\frac{2}{5}}{1 - \left(\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}\right)^2} dx$$

$$= x - 2 \ln|x^2+3x-4| - \frac{8}{5} \tanh^{-1}\left(\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}\right) + c, \left|\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}\right| < 1$$

$$= x - 2 \ln|x^2+3x-4| - \frac{8}{5} \coth^{-1}\left(\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}\right) + c, \left|\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}\right| > 1$$

$$(7) \int \frac{x^3+2x}{(x-2)(x+1)} dx = \int \frac{x^3+2x}{x^2-x-2} dx$$

$$\begin{array}{r} x^2-x-2 \overline{) \begin{array}{r} x^3+2x \\ x^3-x^2-2x \\ \hline x^2+4x \\ x^2-x-2 \\ \hline 5x+2 \end{array}} \end{array}$$

$$\int (x+1 + \frac{5x+2}{x^2-x-2}) dx = \int (x+1) dx + \int \frac{5x+2}{x^2-x-2} dx$$

$$\int (x+1) dx + \frac{5}{2} \int \frac{2x+\frac{4}{5}}{x^2-x-2} dx = \int (x+1) dx + \frac{5}{2} \int \frac{2x-1+1+\frac{4}{5}}{x^2-x-2} dx$$

$$= \int (x+1) dx + \frac{5}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-2} dx + \frac{9}{2} \int \frac{1}{x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-2} dx$$

$$= \int (x+1) dx + \frac{5}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-2} dx + \frac{9}{2} \int \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}} dx$$

$$= \int (x+1) dx + \frac{5}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-2} dx - 3 \int \frac{\frac{2}{3}}{1-(\frac{2}{3}x-\frac{1}{3})^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{5}{2} \ln|x^2-x-2| - 3 \tanh^{-1}(\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}) + c, |\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}| < 1$$

$$= \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{5}{2} \ln|x^2-x-2| - 3 \coth^{-1}(\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}) + c, |\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}| > 1$$

$$(8) \int \frac{e^{2x}+1}{e^x+1} dx$$

$$\begin{array}{r} e^x+1 \overline{) \begin{array}{r} e^x-1 \\ e^{2x}+1 \\ \hline e^{2x}+e^x \\ \hline -e^x+1 \\ -e^x-1 \\ \hline 2 \end{array}} \end{array}$$

$$\int (e^x-1+\frac{2}{e^x+1}) dx = \int (e^x-1) dx + \int \frac{2}{e^x+1} dx$$

بضرب البسط والمقام في e^{-x}

$$= \int (e^x-1) dx + \int \frac{2e^{-x}}{e^x e^{-x} + e^{-x}} dx$$

$$= \int (e^x-1) dx + 2 \int \frac{e^{-x}}{e^0 + e^{-x}} dx$$

$$= \int (e^x-1) dx - 2 \int \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}} dx$$

$$= e^x - x - 2 \ln|1+e^{-x}| + c$$

تكامل متغيرات تحتوي على قوى كسرية

يمكن تبسيط التكاملات الحاوية على قوى كسرية للمتغيرات $\sqrt[n]{\text{متغير}}$ أو $(\text{متغير})^{\frac{m}{n}}$ وذلك كما يلي :-

(1) نفرض أن $z^n = \text{المتغير}$ (دالة في x) ، حيث n أصغر عدد يقبل

القسمة على أدلة جذور هذه المتغيرات

(2) نعين قيمة z وذلك برفع طرفي الفرضية السابقة لأس $\frac{1}{n}$

(3) نفاضل الفرضية بالنسبة لـ z لنحصل على $dx = \square dz$

(4) نعوض بالفرضية وتفاضلها في مسألة التكامل ونبسط ثم نكامل المسألة

(5) نكتب المسألة بدلالة x وذلك بالاستفادة من خطوة رقم (2)

مسائل على تكامل متغيرات تحتوي على قوى كسرية

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} - x}$$

$$(A) \quad x = z^3, \quad n = 3$$

$$(B) \quad z = x^{\frac{1}{3}}$$

$$(C) \quad dx = 3z^2 \, dz$$

$$(D) \quad \int \frac{3z^2 \, dz}{\sqrt[3]{z^3} - z^3} = \int \frac{3z^2}{z - z^3} \, dz = \int \frac{3z^2}{z(1 - z^2)} \, dz$$

$$= -\frac{3}{2} \int \frac{-2z}{1 - z^2} \, dz = -\frac{3}{2} \ln|1 - z^2| + c$$

$$(E) \quad \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} - x} = -\frac{3}{2} \ln \left| 1 - \left(x^{\frac{1}{3}} \right)^2 \right| + c = -\frac{3}{2} \ln \left| 1 - x^{\frac{2}{3}} \right| + c$$

$$= -\frac{3}{2} \ln \left| 1 - \sqrt[3]{x^2} \right| + c$$

$$(2) \int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[4]{x}} \, dx$$

$$(A) \quad x = z^4, \quad n = 4$$

$$(B) \quad z = x^{\frac{1}{4}}$$

$$(C) \quad dx = 4z^3 \, dz$$

$$(D) \int \frac{\sqrt{z^4}}{1+\sqrt[4]{z^4}} 4z^3 dz = 4 \int \frac{z^2}{1+z} z^3 dz = 4 \int \frac{z^5}{1+z} dz$$

$$\begin{array}{r} z+1 \overline{) \begin{array}{r} z^4 - z^3 + z^2 - z + 1 \\ z^5 \\ \hline z^5 + z^4 \\ \hline -z^4 \\ -z^4 - z^3 \\ \hline z^3 \\ z^3 + z^2 \\ \hline -z^2 \\ -z^2 - z \\ \hline z \\ z+1 \\ \hline -1 \end{array}} \end{array}$$

$$= 4 \int [z^4 - z^3 + z^2 - z + 1 - \frac{1}{1+z}] dz$$

$$= \frac{4}{5} z^5 - z^4 + \frac{4}{3} z^3 - 2z^2 + 4z - 4 \ln|1+z| + c$$

$$(E) = \frac{4}{5} (x^{\frac{1}{4}})^5 - (x^{\frac{1}{4}})^4 + \frac{4}{3} (x^{\frac{1}{4}})^3 - 2(x^{\frac{1}{4}})^2 + 4x^{\frac{1}{4}} - 4 \ln|1+x^{\frac{1}{4}}| + c$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x}} dx = \frac{4}{5} x^{\frac{5}{4}} - x + \frac{4}{3} x^{\frac{3}{4}} - 2x^{\frac{1}{2}} + 4x^{\frac{1}{4}} - 4 \ln|1+x^{\frac{1}{4}}| + c$$

$$(3) \int \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}} dx$$

$$(A) \quad x = z^6, \quad n = 6$$

$$(B) \quad z = x^{\frac{1}{6}}$$

$$(C) \quad dx = 6z^5 dz$$

$$(D) \int \frac{1}{\sqrt[3]{z^6} + \sqrt{z^6}} 6z^5 dz = 6 \int \frac{z^5 dz}{z^2 + z^3}$$

$$= 6 \int \frac{z^5 dz}{z^2(1+z)} = 6 \int \frac{z^3}{1+z} dz$$

$$\begin{array}{r} z+1 \overline{) \begin{array}{r} z^2 - z + 1 \\ z^3 \\ \hline z^3 + z^2 \\ \hline -z^2 \\ -z^2 - z \\ \hline z \\ z+1 \\ \hline -1 \end{array}} \end{array}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}} dx = 6 \int \left[z^2 - z + 1 - \frac{1}{1+z} \right] dz$$

$$= 2z^3 - 3z^2 + 6z - 6 \ln|1+z| + c$$

$$(E) = 2\left(x^{\frac{1}{6}}\right)^3 - 3\left(x^{\frac{1}{6}}\right)^2 + 6x^{\frac{1}{6}} - 6 \ln|1+x^{\frac{1}{6}}| + c$$

$$= 2x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} - 6 \ln|1+x^{\frac{1}{6}}| + c$$

$$(4) \int \frac{1}{1 + \sqrt[4]{x-1}} dx$$

$$(A) \quad x-1 = z^4, \quad n=4$$

$$(B) \quad z = (x-1)^{\frac{1}{4}}$$

$$(C) \quad dx = 4z^3 dz$$

$$(D) \int \frac{1}{1 + \sqrt[4]{z^4}} 4z^3 dz = 4 \int \frac{z^3 dz}{1+z}$$

$$\begin{array}{r} z^2 - z + 1 \\ z+1 \overline{) z^3} \\ \underline{z^3 + z^2} \\ -z^2 \\ \underline{-z^2 - z} \\ z \\ \underline{z+1} \\ -1 \end{array}$$

$$= 4 \int [z^2 - z + 1 - \frac{1}{1+z}] dz$$

$$= \frac{4}{3} z^3 - 2z^2 + 4z - 4 \ln|1+z| + c$$

$$(E) = \frac{4}{3} (x-1)^{\frac{3}{4}} - 2(x-1)^{\frac{1}{2}} + 4(x-1)^{\frac{1}{4}} - 4 \ln|1+(x-1)^{\frac{1}{4}}| + c$$

$$(5) \int \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x}} dx$$

$$(A) \quad x = z^4, \quad n = 4$$

$$(B) \quad z = x^{\frac{1}{4}}$$

$$(C) \quad dx = 4z^3 dz$$

$$(D) \int \frac{1-\sqrt{z^4}}{1+\sqrt[4]{z^4}} 4z^3 dz = 4 \int \frac{1-z^2}{1+z} z^3 dz$$

$$4 \int \frac{(1-z)(1+z)}{1+z} z^3 dz = 4 \int (1-z) z^3 dz$$

$$= \int (4z^3 - 4z^4) dz = z^4 - \frac{4}{5} z^5 + c$$

$$(E) \int \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x}} dx = (x^{\frac{1}{4}})^4 - \frac{4}{5} (x^{\frac{1}{4}})^5 + c$$

$$= x - \frac{4}{5} x^{\frac{5}{4}} + c$$

$$(6) \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx$$

$$(A) \quad x = z^6, \quad n = 6$$

$$(B) \quad z = x^{\frac{1}{6}}$$

$$(C) \quad dx = 6z^5 dz$$

$$(D) \int \frac{\sqrt{z^6}}{1+\sqrt[3]{z^6}} 6z^5 dz = \int \frac{z^3}{1+z^2} 6z^5 dz$$

$$= 6 \int \frac{z^8}{1+z^2} dz$$

$$\begin{array}{r} z^2+1 \overline{) \begin{array}{r} z^6 - z^4 + z^2 - 1 \\ z^8 \\ \hline z^8 + z^6 \\ \hline -z^6 \\ \hline -z^6 - z^4 \\ \hline z^4 \\ \hline z^4 + z^2 \\ \hline -z^2 \\ \hline -z^2 - 1 \\ \hline 1 \end{array}} \end{array}$$

$$= 6 \int \left[z^6 - z^4 + z^2 - 1 + \frac{1}{1+z^2} \right] dz$$

$$= \frac{6}{7} z^7 - \frac{6}{5} z^5 + 2z^3 - 6z + 6 \tan^{-1}(z) + c$$

$$(E) \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx = \frac{6}{7} x^{\frac{7}{6}} - \frac{6}{5} x^{\frac{5}{6}} + 2x^{\frac{1}{2}} - 6x^{\frac{1}{6}} + 6 \tan^{-1}(x^{\frac{1}{6}}) + c$$

$$(7) \int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x}}$$

$$(A) x = z^3, n = 3$$

$$(B) z = x^{\frac{1}{3}}$$

$$(C) dx = 3z^2 dz$$

$$(D) \int \frac{3z^2 dz}{1+\sqrt[3]{z^3}} = 3 \int \frac{z^2}{1+z} dz = 3 \int \frac{z^2-1+1}{1+z} dz$$

$$= 3 \int \frac{z^2-1}{1+z} dz + 3 \int \frac{dz}{1+z}$$

$$= 3 \int \frac{(z-1)(z+1)}{1+z} dz + 3 \int \frac{dz}{1+z} = 3 \int (z-1) dz + 3 \int \frac{dz}{1+z}$$

$$= \frac{3}{2} z^2 - 3z + 3 \ln|z+1| + c$$

$$(E) \int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x}} = \frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} - 3x^{\frac{1}{3}} + 3 \ln \left| x^{\frac{1}{3}} + 1 \right| + c$$

$$(8) \int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{4}}}$$

$$(A) \quad x = z^4, \quad n = 4$$

$$(B) \quad z = x^{\frac{1}{4}}$$

$$(C) \quad dx = 4z^3 dz$$

$$(D) \int \frac{1}{(z^4)^{\frac{1}{2}} - (z^4)^{\frac{1}{4}}} 4z^3 dz = 4 \int \frac{z^3}{z^2 - z} dz$$

$$= 4 \int \frac{z^3}{z(z-1)} dz = 4 \int \frac{z^2}{z-1} dz = 4 \int \frac{z^2}{z-1} dz$$

$$= 4 \int \frac{z^2 - 1 + 1}{z-1} dz$$

$$= 4 \int \frac{z^2 - 1}{z-1} dz + 4 \int \frac{dz}{z-1}$$

$$= 4 \int \frac{(z-1)(z+1)}{z-1} dz + 4 \int \frac{dz}{z-1} = 4 \int (z+1) dz + 4 \int \frac{dz}{z-1}$$

$$= 2z^2 + 4z + 4 \ln|z-1| + c$$

$$(E) \int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{4}}} = 2x^{\frac{1}{2}} + 4x^{\frac{1}{4}} + 4 \ln \left| x^{\frac{1}{4}} - 1 \right| + c$$

$$(9) \int \frac{1}{1+\sqrt{x+1}} dx$$

$$(A) x+1 = z^2, n=2$$

$$(B) z = (x+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$(C) dx = 2z dz$$

$$(D) \int \frac{1}{1+\sqrt{z^2}} 2z dz = 2 \int \frac{z dz}{1+z}$$

$$= 2 \int \frac{z+1-1}{1+z} dz = 2 \int \frac{z+1}{1+z} dz - 2 \int \frac{1}{1+z} dz$$

$$= 2 \int dz - 2 \int \frac{1}{1+z} dz = 2z - 2 \ln|1+z| + c$$

$$(E) \int \frac{1}{1+\sqrt{x+1}} dx = 2(x+1)^{\frac{1}{2}} - 2 \ln|1+(x+1)^{\frac{1}{2}}| + c$$

$$(10) \int \frac{dx}{x^{\frac{2}{3}}(x^{\frac{2}{3}}+1)}$$

$$(A) x = z^3, n=3$$

$$(B) z = x^{\frac{1}{3}}$$

$$(C) dx = 3z^2 dz$$

$$(D) \int \frac{1}{(z^3)^{\frac{2}{3}} [1 + (z^3)^{\frac{2}{3}}]} 3z^2 dz = 3 \int \frac{z^2 dz}{z^2 (1 + z^2)}$$

$$3 \int \frac{dz}{1 + z^2} = 3 \tan^{-1}(z) + c$$

$$(E) \int \frac{dx}{x^{\frac{2}{3}} (x^{\frac{2}{3}} + 1)} = 3 \tan^{-1}(x^{\frac{1}{3}}) + c$$

$$(11) \int \frac{(1 + x^{\frac{2}{3}})^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{x}} dx$$

$$(A) x = z^3, n = 3$$

$$(B) z = x^{\frac{1}{3}}$$

$$(C) dx = 3z^2 dz$$

$$(D) \int \frac{[1 + (z^3)^{\frac{2}{3}}]^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{z^3}} 3z^2 dz = 3 \int \frac{(1 + z^2)^{\frac{2}{3}}}{z} z^2 dz$$

$$= 3 \int (1 + z^2)^{\frac{2}{3}} z dz = \frac{3}{2} \int (1 + z^2)^{\frac{2}{3}} 2z dz = \frac{9}{10} (1 + z^2)^{\frac{5}{3}} + c$$

$$(E) \int \frac{(1 + x^{\frac{2}{3}})^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{x}} dx = \frac{9}{10} (1 + x^{\frac{2}{3}})^{\frac{5}{3}} + c$$

$$(12) \int \frac{dx}{1+x^{\frac{2}{3}}}$$

$$(A) x = z^3, n = 3$$

$$(B) z = x^{\frac{1}{3}}$$

$$(C) dx = 3z^2 dz$$

$$(D) \int \frac{1}{1+(z^3)^{\frac{2}{3}}} 3z^2 dz = 3 \int \frac{z^2}{1+z^2} dz$$

$$\frac{z^2+1}{z^2+1} \sqrt{\frac{z^2}{z^2+1}} = \frac{1}{-1}$$

$$3 \int [1 - \frac{1}{1+z^2}] dz = 3z - 3 \tan^{-1}(z) + c$$

$$(E) \int \frac{dx}{1+x^{\frac{2}{3}}} = 3x^{\frac{1}{3}} - 3 \tan^{-1}(x^{\frac{1}{3}}) + c$$

$$(13) \int \frac{1}{x(1-\sqrt[4]{x})} dx$$

$$(A) x = z^4, n = 4$$

$$(B) z = x^{\frac{1}{4}}$$

$$(C) dx = 4z^3 dz$$

$$\begin{aligned}
(D) \int \frac{1}{z^4(1-\sqrt[4]{z^4})} 4z^3 dz &= -4 \int \frac{1}{z^2 - z} dz \\
&= -4 \int \frac{1}{z^2 - z + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}} dz = -4 \int \frac{1}{(z - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} dz \\
&= -16 \int \frac{1}{(2z-1)^2 - 1} dz = 8 \int \frac{2}{1 - (2z-1)^2} dz \\
&= 8 \tanh^{-1}(2z-1) + c, |2z-1| < 1 \\
&= 8 \coth^{-1}(2z-1) + c, |2z-1| > 1 \\
(E) \int \frac{1}{x(1-\sqrt[4]{x})} dx &= 8 \tanh^{-1}(2x^{\frac{1}{4}}-1) + c, |2x^{\frac{1}{4}}-1| < 1 \\
&= 8 \coth^{-1}(2x^{\frac{1}{4}}-1) + c, |2x^{\frac{1}{4}}-1| > 1
\end{aligned}$$

تكامل دوال قياسية تحتوي على دالة الجيب وجيب التمام

إن التعويض $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ يُمكننا من تحويل أي مسألة تكامل قياسية

في $\sin x$, $\cos x$ إلى مسألة تكامل تحتوي على دالة قياسية في z

كالتالي :-

(1) نعوض في مسألة التكامل بالتعويضات الآتية

$$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}$$

$$\cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}$$

$$dx = \frac{2dz}{1+z^2}$$

(2) نبسط مسألة التكامل ثم نكامل الدالة باستخدام قوانين أو طرق التكامل

(3) نعوض بـ $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ بعد إيجاد تكامل المسألة

مسائل على تكامل دوال قياسية تحتوي على دالة الجيب وجيب التمام

$$(1) \int \frac{1}{1 + \sin x} dx$$

$$(A) \int \frac{1}{1 + \frac{2z}{1+z^2}} \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$(B) \int \frac{1}{\frac{z^2 + 2z + 1}{1+z^2}} \frac{2dz}{1+z^2} = \int \frac{2dz}{z^2 + 2z + 1}$$

$$= \int \frac{2dz}{(z+1)^2} = 2 \int (z+1)^{-2} dz = -\frac{2}{z+1} + c$$

$$(C) \int \frac{1}{1 + \sin x} dx = -\frac{2}{\tan(\frac{x}{2}) + 1} + c$$

$$(2) \int \frac{1}{1 + \cos x} dx$$

$$(A) \int \frac{1}{1 + \frac{1-z^2}{1+z^2}} \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$(B) \int \frac{1}{\frac{z^2 + 1 + 1 - z^2}{1+z^2}} \frac{2dz}{1+z^2} = \int \frac{2}{2} dz = \int dz = z + c$$

$$(C) \int \frac{1}{1 + \cos x} dx = \tan(\frac{x}{2}) + c$$

$$= \int \frac{-2dz}{z^2 - 2z - 1} = \int \frac{-2dz}{z^2 - 2z + 1 - 1 - 1}$$

$$= \int \frac{-2dz}{(z-1)^2 - 2} = \sqrt{2} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} dz}{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} z - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{2} \tanh^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} z - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + c, \left| \frac{1}{\sqrt{2}} z - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| < 1$$

$$= \sqrt{2} \coth^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} z - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + c, \left| \frac{1}{\sqrt{2}} z - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| > 1$$

$$(C) \int \frac{1}{\cos x + \sin x} dx = \sqrt{2} \tanh^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \tan\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + c, \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \tan\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| < 1$$

$$= \sqrt{2} \coth^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \tan\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + c, \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \tan\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| > 1$$

$$(8) \int \frac{1}{\cos x + \sin x + 2} dx$$

$$(A) \int \frac{1}{\frac{1-z^2}{1+z^2} + \frac{2z}{1+z^2} + 2} \cdot \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$(B) \int \frac{1}{\frac{-z^2+2z+1}{1+z^2} + 2} \cdot \frac{2dz}{1+z^2} = \int \frac{1}{\frac{-z^2+2z+1+2+2z^2}{1+z^2}} \cdot \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$= \int \frac{2dz}{z^2+2z+3} = \int \frac{2dz}{z^2+2z+1-1+3}$$

$$= \int \frac{2dz}{(z+1)^2+2} = \int \frac{dz}{(\frac{1}{\sqrt{2}}z+\frac{1}{\sqrt{2}})^2+1} = \sqrt{2} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}dz}{(\frac{1}{\sqrt{2}}z+\frac{1}{\sqrt{2}})^2+1}$$

$$= \sqrt{2} \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}z + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + c$$

$$(C) \int \frac{1}{\cos x + \sin x + 2} dx = \sqrt{2} \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \tan \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + c$$

$$(9) \int \frac{1}{\cos x + \sin x - 1} dx$$

$$(A) \int \frac{1}{\frac{1-z^2}{1+z^2} + \frac{2z}{1+z^2} - 1} \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$(B) \int \frac{1}{\frac{-z^2+2z+1}{1+z^2} - 1} \frac{2dz}{1+z^2} = \int \frac{1}{\frac{-z^2+2z+1-1-z^2}{1+z^2}} \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$= \int \frac{2dz}{-2z^2+2z} = \int \frac{-dz}{z^2-z+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}}$$

$$= \int \frac{-dz}{(z-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}} = 2 \int \frac{2dz}{1-(2z-1)^2}$$

$$= 2 \tanh^{-1} (2z-1) + c, |2z-1| < 1$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \coth^{-1} \left(2 \tan \left(\frac{x}{2} \right) - 1 \right) + c, \left| 2 \tan \left(\frac{x}{2} \right) - 1 \right| > 1 \\
(C) \int \frac{\cos x + \sin x - 1}{1} dx &= 2 \tanh^{-1} \left(2 \tan \left(\frac{x}{2} \right) - 1 \right) + c, \left| 2 \tan \left(\frac{x}{2} \right) - 1 \right| < 1 \\
(10) \int \frac{-2 \cos x + \sin x}{1} dx &= 2 \coth^{-1} \left(2z - 1 \right) + c, \left| 2z - 1 \right| > 1 \\
(A) \int \frac{1}{2dz} \frac{-2 \frac{1-z^2}{1+z^2} + \frac{1+z^2}{2z}}{1+z^2} &= \int \frac{1}{2dz} \frac{1}{2z^2 + 2z - 2} \frac{1+z^2}{1+z^2} \\
(B) \int \frac{1}{2dz} \frac{1}{2z^2 + 2z - 2} \frac{1+z^2}{1+z^2} &= \int \frac{1}{2dz} \frac{1}{z^2 + z - 1} \frac{1+z^2}{1+z^2} \\
&= \int \frac{dz}{z^2 + z - 1} = \int \frac{dz}{\left(z + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}} = \frac{4}{5} \int \frac{\frac{5}{4} dz}{\left(\frac{2}{5}z + \frac{1}{5}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2} \\
&= -\frac{2}{\sqrt{5}} \frac{\int \frac{\sqrt{5}}{2} dz}{1 - \left(\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}z + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1}\right)^2} = -\frac{2}{\sqrt{5}} \tanh^{-1} \left(\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}z + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right) + c, \left| \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}z + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right| < 1 \\
&= -\frac{2}{\sqrt{5}} \coth^{-1} \left(\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}z + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right) + c, \left| \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}z + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right| > 1 \\
(C) \int \frac{2 \cos x - \sin x}{1} dx &= -\frac{2}{\sqrt{5}} \coth^{-1} \left(\frac{\frac{\sqrt{5}}{2} \tan \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right) + c, \left| \frac{\frac{\sqrt{5}}{2} \tan \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right| < 1 \\
&= -\frac{2}{\sqrt{5}} \coth^{-1} \left(\frac{\frac{\sqrt{5}}{2} \tan \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right) + c, \left| \frac{\frac{\sqrt{5}}{2} \tan \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{\sqrt{5}}{2}}{1} \right| > 1
\end{aligned}$$

محتويات الكتاب

- يحتوي على شرح مفصل لمقرر رياضة (2) لطلبة الجامعات والمعاهد العليا.
- يحتوي على مسائل محلولة بطريقة واضحة ومبسطة.
- يحتوي على حلول الامتحانات النصفية والنهائية للسنوات السابقة.
- يعرض أفكار متنوعة تساعد في تنمية القدرة على التفكير العلمي السليم.
- يعتبر مرجع علمي تفصيلي لكافة الطلاب والباحثين لإمامه بتفاصيل علمية دقيقة.
- يعالج بطريقة جديدة ومبتكرة الأجزاء النظرية بأسلوب يتيح للقارئ الوصول للفهم بشكل سهل
- يأتي تلبية لحاجة الطلاب إلى كتاب يكون معيماً ومرشداً لتحقيق غايات المقرر الدراسي
- يحتوي على تصنيفات علمية دقيقة لا تجدها في أي كتاب آخر.

تحذير..

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله أو إستنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر وكل من يفعل ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية

designed by
(L.E.S Team)

فريق طلبة
الهندسة الليبيين

