

الأكاديمية العربية الدولية



الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية



تحليل البيانات خطوة بخطوة في SPSS

Data Analysis Step by Step in SPSS

تأليف

د. رامي صلاح جبريل

النسخة الأولى - 2020

تحليل البيانات خطوة بخطوة في SPSS

Data Analysis Step by Step in SPSS

تأليف

د. رامي صلاح جبريل

أستاذ مشارك في قسم الإحصاء - كلية العلوم
جامعة بنغازي - ليبيا

النسخة الأولى - 2020

النسخة الأولى - 2020

اسم الكتاب: تحليل البيانات خطوة بخطوة في SPSS

اسم المؤلف: د. رامي صلاح جبريل

الوكالة الليبية للترقيم الدولي الموحد للكتاب

دار الكتب الوطنية

بنغازي - ليبيا

هاتف: 9090509 - 9096379 - 9097074

بريد مصور: 9097073

البريد الإلكتروني: nat_lib_libya@hotmail.com

رقم الإيداع القانوني 757 / 2019

ردمك ISBN 978-9959-1-2166-0

تمهيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِنُ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعتبر البيانات، من وجهة نظر علم الإحصاء، الشكل المجرد أو الخام الذي تكون عليه المعلومات في الحياة، فهي نتاج قياسات المتغيرات، أي المشاهدات التي تنتج عن تجربة علمية أو تشخيص طبي أو تسجيل لحركة واردات وصادرات في مؤسسة أو نتائج دراسية. وببساطة يمكننا القول إن البيانات هي أي نتجة يمكن تسجيلها وتحويلها إلى متغير رقمي. وتحليل البيانات، هو ذلك العلم الذي يستخدم الأساليب الإحصائية للتعلم من البيانات، (وهو ما يُعرف حديثاً بالتعلم الإحصائي Statistical Learning)). ويقصد من التعلم هنا استخدام البيانات في الاستكشاف والتحليل للوصول للمعلومات الكامنة، وبالتالي الحصول على المعرفة.

ويتحقق التعلم الإحصائي من خلال تعريف المشكلة أو تحديد الهدف من استخدام تحليل البيانات، ثم الشروع في عملية جمع البيانات، ثم تلخيص واستكشاف وتحليل البيانات باستخدام الأساليب المناسبة، وأخيراً استخلاص النتائج وتقسيرها وعرضها بما يتناسب مع اتخاذ القرار أو تقديم التوصيات والاستشارات المناسبة.

وللوصول للنتيجة الأفضل، يتحتم على الباحث استخدام البرامج الإحصائية التي توفر له ما يساعد في تحقيق أهداف الدراسة، ويعتبر برنامج IBM SPSS من البرامج المرنة والقوية، وفي نفس الوقت، البسيطة الاستخدام خاصة لغير المتخصصين في علم الإحصاء.

▪ لماذا نتعلم برنامج SPSS؟

برنامج SPSS، والذي يمثل اختصاراً لـ Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)، أي الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، يُعد البرنامج الإحصائي المفضل للطلبة والباحثين المتخصصين في العلوم الطبيعية والنفسية والبيولوجية، والعلوم الاجتماعية والأدبية، وكذلك العلوم الاقتصادية والمالية، وغيرها من العلوم، حيث أنه يحتوي على العديد من الأساليب الإحصائية والمقاييس التي تتعلق بطبيعة هذه التخصصات وطرق تعاملها مع البيانات (المتغيرات) بصورة أحادية (Univariate)، ثنائية (Bivariate)، ومتعددة (Multivariate).

ومن ضمن المزايا التي يتمتع بها برنامج SPSS، مقارنة ببعض البرامج أو الحزم الإحصائية الأخرى الشهيرة مثل برنامج R، (والذي يُعد من وجهة نظر معظم الإحصائيين البرنامج الأفضل حالياً للتحليل الإحصائي)، هي المرونة الفائقة في إدخال البيانات وتعديلها ومعالجتها، وتتنوع طرق ترميز وتحويل المتغيرات، وكذلك سهولة استيراد وتصدير ملفات البيانات من وإلى البرامج الأخرى وعلى رأسها برنامج مايكروسوفت اكسيل (MS Excel)، والذي يعتبر القاسم المشترك بين كافة برامج معالجة البيانات المتداولة.

وتحتاج طريقة عرض النتائج في برنامج SPSS من الجوانب المميزة فيه حيث أنها تميز ببساطة والاختصار والتدرج المنطقي في العرض إضافة لسهولة تعديلها، (وخاصة نتائج الرسومات البيانية والجدول)، وتعدد طرق نسخها وتخزينها في برامج أخرى مثل مايكروسوفت وورد (MS Word) وباورپوينت (MS Power Point).

▪ من يهم هذا الكتاب؟

الكتاب يتميز أولاً، وكما يظهر من عنوانه، بالتجدد في طرح المواضيع والطرق الإحصائية بصورة بعيدة عن التعقيد والبالغة في عرض النظريات والقوانين الإحصائية الجافة، فهو يراعي الطلبة والباحثين الذين لديهم بعض الصعوبة في الجانب النظري الرياضي، وكذلك يأخذ في الاعتبار قلة الخبرة الإحصائية لدى البعض، ويتجدد أيضاً في شرح كيفية التعامل مع SPSS بطريقة غير معقدة لمن لديهم خبرة متواضعة في استخدام جهاز الكمبيوتر في العموم. والكتاب لا يتطلب وجود أية خبرة سابقة في التعامل مع برنامج SPSS، إلا أنه يفترض أن القارئ لديه إلمام بالحد الأدنى لأساسيات علم الإحصاء الوصفي والاستدلالي، ومفهوم تحليل البيانات. إضافة لهذا كلّه، فإن الكتاب يقدم مجموعة متنوعة من الأمثلة العملية التي تعتمد على بيانات حقيقة وافتراضية تتعلق بالخصائص العلمية المختلفة؛ الطبية والاجتماعية والتربوية والأكademie والاقتصادية والصناعية وغيرها.

▪ ما هي التقنيات الإضافية المطلوبة لتعلم برنامج SPSS؟

للاستفادة من مواضيع الكتاب بصورة جيدة، يُفضل استخدام جهاز الكمبيوتر يعمل تحت نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز (MS Windows) لأي إصدار من ويندوز 7، 8، 8.1 أو 10، ولا تتطلب مواضيع الكتاب وجود اتصال بالإنترنت بعد الحصول على نسخة من برنامج SPSS، والتي يُفضل أن تكون النسخة 23، إلا أن وجود نسخ أقدم لا يمنع القارئ من الاستفادة المثلثة من الكتاب.

▪ تنظيم فصول الكتاب:

في الفصل الأول، (وهو بعنوان: مكونات برنامج IBM SPSS)، نقدم تعريف للبرنامج وطرق استخدام الأوامر فيه، خاصة باستخدام طريقة واجهة المستخدم البيانية (GUI)، ونوضح كيفية طلب المساعدة داخل البرنامج فيما يختص بالممواضيع والتدريب العملي الذي يوفره البرنامج داخل أمر المساعدة. ثم نوضح كيفية إدخال البيانات في ملفات البرنامج مع توضيح مفصل لأسلوب عرض البيانات وعرض المتغيرات الذي يتميز به برنامج SPSS.

وفي الفصل الثاني، (وهو بعنوان: التعامل مع ملفات البيانات في برنامج SPSS)، فإننا نبدأ بشرح كيفية استيراد ملفات البيانات من برنامج اكسيل وتعديلها ثم تخزينها في SPSS، وبالمقابل نوضح كيفية تصدير أو تخزين الملفات بصيغة اكسيل من داخل برنامج SPSS. بعدها يتم شرح كيفية ترتيب المتغيرات في ملفات البيانات في SPSS، وكيفية إعادة ترميز المتغيرات سواء ترميز القيم في نفس المتغير أو في متغير جديد. وكذلك نسلط الضوء على طريقة إعادة الترميز التقائي وطريقة تعريف وحساب دوال جديدة للمتغيرات.

نبدأ في الفصل الثالث، (وهو بعنوان: التحليل الاستكشافي للبيانات في SPSS)، بتناول المقاييس والطرق الإحصائية المختلفة التي تدرج تحت مسمى التحليل الاستكشافي للبيانات، ونقوم بتوضيح كيفية استخدامها في برنامج SPSS، ويتضمن الفصل تعريف أنواع البيانات، وتقسيم التعامل مع المتغيرات بحسب طبيعتها، واستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والرسومات البيانية بحسب طبيعة المتغيرات. وكذلك توضيح كيفية التعامل مع ما يُعرف بالمتغيرات الوهمية، وفي نهاية الفصل الثالث يتعرض الكتاب لاستخدام أسلوب استكشاف البيانات الشامل في SPSS، إضافةً لتقديم مثال تطبيقي لكيفية تقديم وعرض نتائج التحليل الاستكشافي للبيانات وتفسيرها.

ونقوم في الفصل الرابع، (وهو بعنوان: تحليل البيانات الاستدلالي في SPSS)، باستعراض الأساليب الإحصائية التي تتضمن طرق تقدير المعالم واختبارات الفروض المتعلقة بها، مثل الاستدلال حول الوسط الحسابي للمجتمع، والتعامل مع العينات المستقلة والمرتبطة، واختبار تباينات المجتمع، وكذلك نوضح كيفية تكوين جداول الاقتران في SPSS للمتغيرات الوصفية والكمية، وطريقة تنفيذ اختبار الاستقلالية وحساب معاملات الارتباط الخاصة به، وأيضاً طرق إجراء اختبارات تحليل التباين في اتجاه واتجاهين.

في الفصل الخامس، (وهو بعنوان: تحليل الارتباط والانحدار الخطى)، نتناول كيفية تنفيذ تحليل الارتباط والانحدار الخطى باستخدام برنامج SPSS لدراسة العلاقات المتبادلة ضمن المتغيرات في البيانات، وتحليلها، وتكوين النماذج التي تفسر العلاقات السببية بينها. ويتضمن ذلك تنفيذ شكل الانتشار بين المتغيرات في بُعدين أو كمصفوفة، وحساب معاملات الارتباط البسيط والجزئي، ثم شرح طريقة توفيق نموذج الانحدار الخطى البسيط والمتمدد وتمثيلها بيانياً، وبعد ذلك نقدم طرق تقييم نموذج الانحدار الخطى الموفق، وأخيراً نستعرض طرق تقييم أهم فرضيات المربعات الصغرى الاعتيادية وتحليل الباقي.

أما الفصل السادس، (وهو بعنوان: الاختبارات اللامعلمية وتحليل الموثوقية)، فيتم فيه التطرق لموضوعين مهمين؛ الأول هو تنفيذ الاختبارات اللامعلمية في SPSS لعينة واحدة، وعينتين أو أكثر (مستقلة أو مرتبطة)، وتحتوى اختبارات هامة مثل اختبار مربع كای لجودة التوفيق، اختبار ذي الحدين، واختبار الدورات، واختبار كولمجروف-سميرنوف، ومان-وتى، واختبار كروسكال-والس، واختبار ولوكوكسون وغيرها. وأما الموضوع الثاني، فيتناول طرق التحقق من ثبات أو موثوقية بيانات الدراسة، (وبصورة خاصة الإجابات في الاستبيانات)، وكيفية تطبيقها وتحليل النتائج في SPSS، ومن أهمها معامل ثبات كرونباخ الفا، ومعامل ثبات التجزئة النصفية، ومعامل ثبات جوتمان.

ويضم الكتاب في نهاية ملحقا يحتوي على تعريف لكل ملفات البيانات المستخدمة بشكل متكرر في الشرح، لكي يتمكن القارئ من مواكبة تنفيذ الأوامر في SPSS خلال فصول الكتاب ولا يضطر للبحث عنها داخل الصفحات.

▪ **الكتب السابقة للمؤلف:**

1. مقدمة في الإحصاء الاستكشافي والاحتمالات، (2015).
2. التحليل الإحصائي باستخدام لغة R، (2016).

▪ **شكر واعتزاز:**

أشكر الله العليم الحكيم الذي وفقني بتأليف هذا الكتاب، والذي أرجو أن ينفع به الطلبة والباحثين في شتى التخصصات، وأحمده عز وجل على هذا العلم، علم الإحصاء، الذي أعتز بأنه الأكثر ذكرا من بين العلوم في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ (... مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة إلا أحصاها ...، الكهف (49))، (لقد أحصاهم وعدهم عدا، مريم (94)), (... أحصا الله ونسوه ...، المجادلة (6))), وغيرها من الآيات الكريمة.

المؤلف

المحتويات

I

تمهيد

1

الفصل الأول

مكونات برنامج IBM SPSS (Components of SPSS)

1

1.1 تعريف برنامج SPSS (What is SPSS?) SPSS

2

2.1 طرق استخدام الأوامر (Methods of Commanding)

2

1.2.1 الملحقات في برنامج SPSS (Add-on's) SPSS

3

2.2.1 طلب المساعدة في برنامج SPSS (Getting Help) SPSS

4

3.1 بدء التعامل مع SPSS (Starting SPSS) SPSS

8

4.1 إدخال البيانات في نافذة تحرير البيانات (Data Entry in SPSS Data Editor) SPSS

9

1.4.1 نافذة عرض المتغيرات (Variable View Window)

12

2.4.1 حفظ ملفات البيانات (Saving Data Files)

13

3.4.1 نافذة عرض البيانات (Data View Window)

15

5.1 الإعدادات العامة في برنامج SPSS (General Settings) SPSS

17

الفصل الثاني

التعامل مع ملفات البيانات في برنامج SPSS (Dealing with Data Files in SPSS)

17

1.2 استيراد الملفات إلى برنامج SPSS (Importing Files to SPSS) SPSS

22

2.2 تصدير الملفات من برنامج SPSS (Exporting Files from SPSS) SPSS

24

3.2 معالجة البيانات (Data Manipulation)

27

4.2 حساب تكرار المشاهدات (Counting Case Occurrence)

31	5.2 إعادة ترميز المتغيرات (Recoding Variables)
32	1.5.2 إعادة ترميز القيم لنفس المتغير (Recode into Same Variable)
34	2.5.2 إعادة ترميز القيم في متغير مختلف (Recode into Different Variable)
36	3.5.2 إعادة الترميز التلقائي (Automatic Recoding)
38	4.5.2 تعريف دالة جديدة لمتغير (Compute Variable)
42	5.5.2 الترتيب في مجموعات (Binning)

الفصل الثالث

التحليل الاستكشافي للبيانات في SPSS (Exploratory Data Analysis (EDA) in SPSS)

45	1.3 أنواع البيانات (Data Types)
48	2.3 التحليل الاستكشافي الأحادي (Univariate EDA)
49	3.3 التحليل الاستكشافي للمتغيرات الوصفية (EDA for Categorical Variables)
50	3.3.3 1. التوزيع التكراري للمتغيرات الوصفية (Frequency Distribution for Categorical Variables)
56	2.3.3 2. الأعمدة البيانية لجدال التوزيع التكراري (Bar plots of Frequency Distribution Tables)
61	3.3.3 3. الأعمدة البيانية للمتغيرات الوهمية (Bar plots for Dummy Variables)
65	4.3 التحليل الاستكشافي للمتغيرات الكمية (EDA for Quantitative Variables)
69	1.4.3 1. المدرج التكراري (Histogram)
71	1.1.4.3 1. تغيير الفترات في المدرج التكراري (Adjusting the Histogram)
74	2.4.3 2. شكل الصندوق (The Boxplot)
80	3.4.3 3. الرسم الخطي أو مخطط الزمن (Line or Time Chart)
83	4.4.3 4. طبيعة توزيع المتغيرات (Normality of Variables)
85	5.3 استخدام أسلوب استكشاف البيانات الشامل في SPSS (Using the Explore command in SPSS)
88	6.3 تفسير نتائج استكشاف البيانات (Interpreting the Results of Data Exploration)
95	7.3 استكشاف القيم المتطرفة (Exploring the Extreme Values)

الفصل الرابع

101

تحليل البيانات الاستدلالي في SPSS (Inferential Data Analysis in SPSS)

- 101 1.4 الاستدلال حول الوسط الحسابي للمجتمع (Inference about the Population Mean)
- 101 1.1.4 1.4 الاستدلال حول الوسط لمجتمع واحد (Inference about the Mean of One Population)
- 103 1.1.1.4 1.4 استخدام أعمدة الخطأ (Using the Error Bars)
- 107 2.1.4 1.4 الاستدلال حول الوسط لمجتمعين (Inference about the Mean of Two Populations)
- 107 1.2.1.4 1.4 الاستدلال للعينات المستقلة (Inference about Independent Samples)
- 112 2.2.1.4 1.4 الاستدلال للعينات المرتبطة (غير المستقلة) (Inference about Paired Samples)
- 114 2.4 1.4 اختبار تساوي تباينات المجتمع (Testing the Equality of Population Variances)
- 114 1.2.4 1.4 اختبار ليفن (Leven's Test)
- 117 3.4 1.4 جداول الاقتران واختبار الاستقلالية (Contingency Tables and Test for Independence)
- 117 1.3.4 1.4 تكوين جداول الاقتران من متغيرات وصفية (Contingency Tables from Categorical Variables)
- 121 2.3.4 1.4 تكوين جداول الاقتران من متغيرات كمية (Contingency Tables from Quantitative Variables)
- 127 3.3.4 1.4 اختبار الاستقلالية (Test for Independence)
- 128 1.3.3.4 1.4 معامل فاي (Phi Coefficient)
- 128 2.3.3.4 1.4 معامل الاقتران (Contingency Coefficient)
- 128 3.3.3.4 1.4 معامل كرامر V (Cramer's V Coefficient)
- 129 4.3.3.4 1.4 معامل كندل تاو (Kendall's Tau Coefficient)
- 130 5.3.3.4 1.4 معامل جاما (Gamma Coefficient)
- 132 4.3.4 1.4 اختبار الاستقلالية باستخدام متغيرات تصنيف إضافية (Test for Independence using additional Classification Variables)
- 136 4.4 1.4 تحليل التباين (Analysis of Variance (ANOVA))
- 136 1.4.4 1.4.4 تحليل التباين في اتجاه واحد (One-way ANOVA)
- 140 2.4.4 1.4.4 تحليل التباين في اتجاهين (Two-way ANOVA)

تحليل الارتباط والانحدار الخطي

(Linear Correlation and Regression Analysis)

- 147 1.5 تحليل الارتباط الخطي (Linear Correlation Analysis)
- 148 1.1.5 دراسة الارتباط باستخدام شكل الانتشار (Analyzing Correlation by Scatterplot)
- 154 2.1.5 دراسة الارتباط باستخدام معامل بيرسون (Analyzing Correlation using Pearson's Coefficient)
- 157 3.1.5 معامل الارتباط الجزئي (Partial Correlation Coefficient)
- 160 2.5 الارتباط بين المتغيرات الوصفية والكمية (Correlation between Categorical and Quantitative Variables)
- 163 3.5 تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression Analysis)
- 163 1.3.5 تعريف نموذج الانحدار الخطي البسيط (Definition of Simple Linear Regression Model)
- 164 2.3.5 فرضيات طريقة المربيعات الصغرى الاعتيادية (Assumptions of OLS Method)
- 165 3.3.5 التمثيل البياني لنموذج الانحدار الخطي البسيط (Graphical Representation for the Linear Regression Model)
- 163 4.5 تقييم نموذج الانحدار الخطي (Assessment of Linear Regression Model)
- 169 1.4.5 معامل الارتباط المتعدد (Multiple R)
- 170 2.4.5 معامل التحديد R^2 (Coefficient of Determination or R-Squared)
- 171 3.4.5 اختبار معنوية نموذج الانحدار (Testing the Significance of the Regression Model)
- 172 4.4.5 اختبار معنوية المتغيرات التوضيحية (Testing the Significance of Predictors)
- 176 5.5 تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression Analysis)
- 181 6.5 تقييم فرضيات النموذج الخطي وتحليل الباقي (Assessing Model Assumptions and Residual Analysis)
- 181 1.6.5 فرضية خطية النموذج (Linearity of the Model Assumption)
- 184 2.6.5 فرضية عدم عشوائية المتغيرات التوضيحية (Non-Random Explanatory Variables)
- 187 3.6.5 فرضية استقلالية المتغيرات التوضيحية (Independence of Errors Assumption)
- 189 4.6.5 فرضية توزع الخطأ بتوزيع طبيعي (Normality of Error Terms)
- 190 5.6.5 فرضية تجانس تباين قيم حد الخطأ (Homoscedasticity Assumption)

الاختبارات اللامعلمية وتحليل الموثوقية

(Nonparametric Tests and Reliability Analysis)

- 194 1. الاختبارات اللامعلمية لعينة واحدة (One Sample Nonparametric Tests)
- 194 1.1.6 اختبار مربع كاي لجودة التوفيق (Chi-Square Goodness of Fit Test)
- 197 2.1.6 اختبار ذي الحدين (Binomial Test)
- 200 3.1.6 اختبار الدورات (Runs Test)
- 202 4.1.6 اختبار كولمغروف-سميرنوف لعينة واحدة (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)
- 204 2. الاختبارات اللامعلمية لعينتين مستقلتين (Nonparametric Tests for Two Independent Samples)
- 206 3.6 الاختبارات اللامعلمية لعدة عينات مستقلة (Nonparametric Tests for Several Independent Samples)
- 206 1.3.6 اختبار كروسكال-والس (Kruskal-Wallis H test) H
- 208 4.6 الاختبارات اللامعلمية لعينتين مرتبطتين (Nonparametric Tests for Two Paired Samples)
- 208 1.4.6 اختبار الإشارة واختبار ولكوكسون للرتب ذات الإشارات (Sign and Wilcoxon Signed-Rank Tests)
- 210 2.4.6 اختبار ماك نيمير (McNemar Test)
- 212 3.4.6 اختبار التجانس الهاجمي (Marginal Homogeneity Test)
- 213 5.6 الاختبارات اللامعلمية لعدة عينات مرتبطة (Nonparametric Tests for Several Paired Samples)
- 214 1.5.6 اختبار فريدمان (Friedman test)
- 215 2.5.6 اختبار كيندل W (Kendall's W test)
- 217 3.5.6 اختبار كوكران Q (Cochran's Q test)
- 219 6.6 تحليل الموثوقية (Reliability Analysis)
- 220 1.6.6 معامل ثبات كرونباخ الفا (Cronbach's Alpha Coefficient)
- 220 2.6.6 معامل ثبات التجزئة النصفية (Split-Half Reliability Coefficient)
- 220 3.6.6 معامل ثبات جوتمان (Guttman Coefficient)
- 227 الملحق: ملفات البيانات المستخدمة في الكتاب
- 229 المراجع

الفصل الأول

مكونات برنامج IBM SPSS (Components of SPSS)

1.1 تعريف برنامج SPSS (What is SPSS?)

يرمز الاختصار SPSS إلى (Statistical Package for the Social Sciences)، ويعني الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وقد تم ابتكار البرنامج بصورة الأصلية البسيطة في نهاية السبعينات عن طريق كل من نورمان ناي (Norman Nie)، هاندلي هل (Hadlai Hull)، ودائيل بنت (Dale Bent) من جامعة ستانفورد الأمريكية بغرض تحليل بيانات ذات حجم كبير يصعب التعامل معها بالحسابات اليدوية آنذاك، وبعد ذلك انتشر التعامل بهذه الحزمة في عدة جامعات إلى أن خرج للتداول التجاري لاحقاً في الثمانينيات. في عام 2009، استحوذت شركة آي بي إم (IBM) الأمريكية على حزمة SPSS ليصبح بعدها الاسم الرسمي المعروف للبرنامج هو IBM SPSS Statistics.

ويتوفر البرنامج بعدة إصدارات منها إصدار المستخدم المفرد والمتمدد وإصدار الطالب وخادم العميل (clientserver) وغيرها. ويمكن للمستخدم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، (وهو www.spss.com) للحصول على المزيد من المعلومات.

وهذا الكتاب يستخدم النسخة أو الإصدار 23 IBM SPSS Statistics، وإذا ما كان لدى القارئ نسخة أقدم من النسخة 23 أو نسخة أحدث منها مثبتة على جهازه، فإننا نشير هنا إلى أن طريقة استخدام البرنامج وتحليل وعرض النتائج لن يكون فيها اختلاف كبير عن النسخ الأخرى من البرنامج.

ملاحظة:

تجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج SPSS كان يُعرف في فترة من الفترات (في الإصدار 18 غالباً)، باسم PASW Statistics وهي اختصار (Predictive Analysis Software) أي برنامج التحليل التنبئي.

1.2 طرق استخدام الأوامر (Methods of Commanding)

توجد عدة طرق لاستخدام الأوامر في SPSS بحسب المهمة المطلوب إنجازها أو حتى بحسب ما يفضله المستخدم، حيث أنه من الممكن استخدام أكثر من طريقة في آن واحد، وهذه الطرق هي:

1. طريقة واجهة المستخدم البيانية (Graphical User Interface (GUI)، وهي واجهة البرنامج المتمثلة في النافذة الأساسية التي يتم عن طريقها استخدام الفأرة و اختيار الأوامر من القوائم المنسدلة تحت شريط الأوامر كما هو المتداول في كل البرامج تحت بيئة نظام ويندوز. وهذه الطريقة هي الأكثر تداولاً بين مستخدمي البرنامج، وخاصة المبتدئين منهم، نظراً لبساطتها. وتتميز بأنها تعتمد على إدخال الأوامر خطوة بخطوة، بمعنى أن المستخدم لن يتمكن من الانتقال للخطوة التالية إلا بعد استكمال الإدخال في الخطوة السابقة بصورة صحيحة. وسنقوم في هذا الكتاب باعتماد هذه الطريقة في شرح طريقة التعامل مع البيانات واستخدام التحليل الإحصائي بصورة عامة مع الإشارة للطرق الأخرى عند الضرورة.

2. طريقة بناء جملة الأوامر (Syntax)، وهي لغة الأوامر (Command Language) الخاصة ببرنامج SPSS، والتي يمكن للمستخدم من خلالها تفزيذ ما يحتاجه من عمليات حسابية ودوال رياضية وإحصائية عن طريق كتابة أوامر محددة بلغة البرنامج. ويمكن القول بأن استخدام النوافذ والقوائم في الطريقة الأولى، وهي طريقة واجهة المستخدم البيانية، هو في الواقع استخدام لغة الأوامر "في الخلفية". وعادة ما يستخدم هذه الطريقة المستخدمون الأكثر خبرة في برنامج SPSS أو في البرمجة بصورة عامة، وكذلك قد يكون هنالك حاجة لاستخدام هذه الطريقة عند تكوين أوامر أو دوال خاصة غير متوفرة بشكل مباشر في البرنامج.

3. طريقة بايثون (Python)، وهي لغة برمجة عامة تحتوي على مكونات خاصة ببرنامج SPSS، ويمكن استخدامها لكتابه برامجيات تعمل ضمن SPSS. ويمكن أيضاً استخدام لغة بايثون مع طريقة بناء جملة الأوامر لجعل SPSS ينفذ الدوال والتماذج الإحصائية العامة والخاصة. وتعد هذه طريقة إضافية للاستفادة من برنامج SPSS للباحثين المتخصصين.

4. طريقة المخطوطات (Scripts)، وهي برمج مكتوبة بلغة البيسك (BASIC) الشهيرة، ويمكن كتابة هذه المخطوطات بطريقة التنفيذ التلقائي (Auto-script) بحيث يتم تفزيذها مباشرة عند الحصول على نتيجة معينة في برنامج SPSS.

1.2.1 الملحقات في برنامج SPSS (Add-on's)


كما هو الحال في كثير من البرامج والزم الإحصائية تحت بيئة ويندوز، فإنه عند تنصيب برنامج SPSS على الحاسوب يحصل المستخدم على النظام الأساسي (Base System) وربما بعض الملحقات أو الإضافات بحسب طبيعة النسخة التي تم الحصول عليها. ويمكن للمستخدم الحصول على أية مكونات إضافية

لبرنامج SPSS سواء بتحميلها من الموقع الرسمي للشركة المذكور سابقاً، أو من القرص المدمج (CD) الخاص بالبرنامج. وسنقوم بصورة أساسية بتناول الأوامر المتوفرة في النظام الأساسي في SPSS في هذا الكتاب مع التنويع على المكونات الإضافية عند الحاجة لاستخدامها. ويفترض الكتاب أن القارئ قد حصل مسبقاً على نسخة من برنامج SPSS، (سواء النسخة 23 أو أقدم منها أو أحدث)، وأنه قد تم تنصيبها على جهاز الكمبيوتر، وسيتم خلال فصول الكتاب التدرج في شرح مكونات البرنامج بحسب متطلبات المرحلة.

2.2.1 طلب المساعدة في برنامج SPSS (Getting Help)

يمكن للمستخدم دائماً طلب المساعدة في برنامج SPSS في العثور على أي موضوع أو للتعرف على طريقة إدخال معينة للبيانات أو ببساطة لتصفح المواضيع بشكل متسلسل في SPSS، وذلك عن طريق استخدام أمر المساعدة (Help) في شريط الأوامر العلوي في البرنامج، وعند استخدام أمر المساعدة، ستتوفر عدة خيارات أهمها ما يلي¹:

- **المواضيع (Topics):** ويحتوي على كل الموضوعات التي يوفرها برنامج SPSS متسلسلة بحسب التدرج المنطقي للموضوعات وتسلسل التعامل مع أوامر البرنامج، وتظهر نافذة المساعدة الخاصة بالموضوعات كما يبين الشكل (1.1)، حيث يمكنك التقلل ضمنها مستخدماً عناوين المواضيع المعروضة على يسار النافذة، أو عن طريق كتابة الموضوع البحث المطلوب في مربع البحث (Search) في أعلى النافذة إلى اليسار.



شكل 1.1: نافذة طلب المساعدة في المواضيع (Topics) لبرنامج SPSS.


- **التدريب العملي (Tutorial):** ويوفر للمستخدم نوع من التدريب على استخدام البرنامج في التعامل مع البيانات بصورة عامة لتسهيل تنفيذ التحليل الإحصائي بصورة متدرجة.

¹ عند استخدام أمر المساعدة، فإن عرض المطلوب سيكون عادة في متصفح ملفات pdf أو متصفح الانترنت الافتراضي الخاص بجهازك، لكن بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

- دراسات الحال (Case Studies): ويعد أكثر تقدماً من النوعين الأولين في طلب المساعدة، حيث أنه يتضمن أمثلة تطبيقية لبيانات يوفرها البرنامج ويقوم بشرح كيفية استخدام الخيارات المختلفة لبعض الأساليب الإحصائية بصورة عملية.

3.1 بدء التعامل مع برنامج SPSS (Starting SPSS)

عند تشغيل برنامج SPSS للمرة الأولى ستظهر النافذة التالية (شكل (2.1))، والتي تعتبر النافذة الافتراضية التي يقوم البرنامج بعرضها مقدماً فيها بعض الاقتراحات للمستخدم؛ مثل فتح ملف بيانات جديد أو سابق، عرض بعض التحليلات الإحصائية المقترنة، عرض المكونات الموجودة وغير الموجودة في البرنامج، عرض ملاحظات إرشادية وتعليمية لاستخدام البرنامج، وغيرها. وستجد في الزاوية اليسرى أسفل هذه النافذة خيار خاص بتعطيل ظهور هذه النافذة عند فتح البرنامج مرة أخرى، وستنقوم باختيار هذا التعطيل لعدم حاجتنا لهذه النافذة خلال الفصول الأولى، وذلك عن طريق الضغط على المربع الصغير بجانب الخيار ثم الضغط على زر موافق (OK) في النافذة.



شكل 2.1: نافذة "الترحيب" الافتراضية عند تشغيل برنامج SPSS.

بعد تنفيذ ذلك، ستبقى النافذة الرئيسية للبرنامج مفتوحة، والشكل (3.1) يوضح أهم المكونات الأساسية لهذه النافذة التي تُعد واجهة المستخدم البيانية (GUI) التي تكلمنا عنها سابقاً في طرق استخدام الأوامر في البرنامج، وتسمى نافذة تحرير البيانات (SPSS Data Editor)، وستكون بالنسبة لنا نافذة التعامل مع البرنامج عن طريق إدخال البيانات وتعديلها، وإصدار الأوامر الخاصة بالتحليل الإحصائي من مقاييس ونمذج ورسومات بيانية وغيرها.



شكل 3.1: نافذة تحرير البيانات في برنامج SPSS.

في الشكل (3.1) نلاحظ أن نافذة تحرير البيانات مقسمة إلى:

- اسم ملف البيانات: حيث يظهر (إلى اليسار) اسم ملف البيانات (Untitled1) وهو الاسم الافتراضي الذي يعطيه البرنامج لملفات البيانات، ويقوم المستخدم بتعديلها لاحقاً إلى الاسم الذي يرغب به بعد إدخال البيانات.
- شريط الأوامر: وهو الشكل العام لعرض الأوامر الأساسية في بيئة ويندوز، وعند الضغط على أي من هذه الأوامر ستتسدل قائمة تضم أوامر فرعية أو تضم قوائم تحوي بدورها أوامر فرعية. وسنقوم بالتعرف على هذه الأوامر بالترتيب بحسب تقديم القارئ مع فصول الكتاب.
- أيقونات الأوامر: وهي رموز تنفيذية للأوامر وتعتبر بدائل أو اختصارات لها، ويمكن تعديل هذا الشريط ليضم الأيقونات المفضلة أو الأكثر استخداماً بحسب رغبة المستخدم.
- المتغيرات والمشاهدات: كما هو السائد في التحليل الإحصائي، فإن الشكل العام لملف البيانات الإحصائية يتم تنظيمه بحيث تكون المتغيرات في الأعمدة والمشاهدات في الصفوف¹. ويلاحظ في نافذة تحرير البيانات أن المتغيرات كلها تأخذ الاسم المختصر (var) نظراً لأنه لم يتم تعريفها بعد.

ويجب التنوية هنا إلى أسلوب العرض الرئيسيين في نافذة تحرير البيانات والمتوفرتان في أسفل جدول البيانات مباشرة إلى اليسار؛ وهما أسلوب عرض البيانات (Data View)، وهي الظاهرة في الشكل السابق، وأسلوب عرض المتغيرات (Variable View)، والتي عند اختيارها سيتغير الشريط الذي يضم أسماء المتغيرات إلى تقسيم آخر خاص بتصنيف المتغيرات بحسب طبيعتها، وسنتناول تاليًا هذين الأسلوبين بالشرح.

¹ سيتم تناول مفهوم المتغيرات والمشاهدات بمزيد من التفصيل في الفصل التالي.

في نافذة محرر البيانات، قم باختيار اسلوب عرض المتغيرات (Variable View) في أسفل النافذة¹ فيتغير العرض في النافذة إلى الأسلوب الموضح في الشكل (4.1). عند إدخال البيانات لأول مرة في محرر البيانات، يتم تعريف أسماء المتغيرات المطلوب إدخالها ونوعها والسمات التفصيلية الخاصة بها باستخدام اسلوب عرض المتغيرات، بعد ذلك يتم الرجوع إلى اسلوب عرض البيانات لإدخال القيم العددية لهذه المتغيرات.

لاحظ أن الصفوف في نافذة عرض المتغيرات تمثل في الواقع عدد المتغيرات، (وليس كما هو الحال في نافذة عرض البيانات، حيث أنها تمثل عدد المشاهدات).

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

شكل 4.1: اسلوب عرض المتغيرات في نافذة محرر البيانات في SPSS.

و فيما يلي، نقدم وصف موجز لما تعنيه المصطلحات الخاصة بأسلوب عرض المتغيرات:

- **اسم المتغير (Name):** وهو الاسم الذي يختاره المستخدم للمتغير، ويمكن استخدام اللغة العربية أو الإنجليزية² لإدخال أسماء المتغيرات، مع ملاحظة أنه لا يمكن استخدام المسافات بين الأحرف أو استخدام بعض الرموز ضمن اسم المتغير مثل (8) أو ابتداء اسم المتغير برقم.³ وفي حال عدم كتابة اسم محدد للمتغير من قبل المستخدم، فإنه يتم إعطاء الاسم الافتراضي "VAR00001" للمتغير الأول، والاسم "VAR00002" للمتغير الثاني، ...، وهكذا.

¹ في إصدار 23 SPSS ستضيق خلفية أسلوب العرض المختار (وكذلك عند الضغط بالفأرة على أي أمر أو خيار) باللون الأصفر لتنبيه المستخدم.

² يمكن التعرف على اللغات التي يمكن استخدامها في الإدخال في برنامج SPSS من الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

³ حاول مثلاً إدخال أسماء المتغيرات التالية؛ متغير "مسافة" 1، أو 5 "مسافة" X، أو 3Y، أو A&B، وستلاحظ ظهور رسالة تنبيه من البرنامج بأن هذا الاسم غير مقبول للمتغير.

- **سمة أو طبيعة المتغير (Type)**: والذي يمكنك من اختيار سمة المتغير، (الذي سيأخذ على أية حال الشكل الرقمي وليس النصي)، من ضمن عدة سمات مثل؛ رقمي (Numeric) وهي السمة الافتراضية، مصحوب بفواصل (Comma) مثل "13,150,719"، مصحوب بنقط (Dot) مثل "13.150.719" ، علمي (Scientific notation) مثل "1.23E+2" والذي يعني 1.23×10^2 ، وغيرها من السمات التي يمكن للمستخدم الاختيار منها.
- **عدد الخانات العشرية (Decimals)**: ويتم فيها تحديد عدد الخانات العشرية المرغوبة للأعداد، وتكون عادة 0 للأعداد الصحيحة، والعدد الافتراضي للخانات العشرية هو 2، والذي يمكنك تغييره من نافذة الإعدادات¹ العامة في البرنامج.
- **مسافة (عرض) قيم المتغير (Width)**: ويتم فيه تحديد قياس العرض المطلوب كمسافة لقيمة المتغير معأخذ عدد الخانات العشرية بالاعتبار، فمثلاً إذا كان المطلوب كتابة خانتين عشرتين إلى جانب العدد الصحيح فيجب ألا يقل قياس عرض قيمة المتغير عن 3. ويكون القياس الافتراضي لعرض قيمة المتغير هو .8.
- **طابع أو وصف المتغير (Label)**: والذي يمكنك من إعطاء وصف اسمي للمتغير للمساعدة في فهم ما يمثله هذا المتغير. ويمكن أن يكون الوصف باللغة العربية، وأيضاً يمكن هنا استخدام المسافات والرموز بمعنى أنه يمكن للمستخدم كتابة ما يريد بدون قيود. وهذا الوصف هو ما يتم عرضه كبدل عن اسم المتغير في نتائج التحليل، وفي حالة عدم إضافة تعريف للمتغير فإن هذه الخانة تبقى فارغة افتراضياً.
- **تصنيف قيم المتغير (Values)**: في هذه الخانة، يتم تعريف أو إعطاء وصف لمستويات أو تقسيمات المتغير الوصفي²، فمثلاً إذا كان المتغير يمثل إجابة على سؤال معين فإنه يمكن تعريف "موافق" لقيمة المتغير "1" ، و"غير موافق" لقيمة المتغير "2". ويمكن هنا أيضاً استخدام المسافات والرموز في التعريف. أما في حال كون المتغير كمياً أو عند عدم تعريف أي تصنيف للمتغير الوصفي، فإن الخانة يظهر فيها الوصف لا يوجد (None).
- **تعريف القيم المفقودة (Missing)**: في بعض الأحيان قد يرغب المستخدم بالتمييز بين قيم مفقودة فعلياً وأخرى ناتجة عن عدم الرغبة في الإجابة، كما هو الحال مثلاً في بعض الاستبيانات؛ فأحياناً قد يتم فقد بعض استماريات الاستبيان وهذا يندرج تحت مسمى القيم المفقودة فعلياً، وأحياناً قد لا يرغب الشخص المستبيان في الإجابة عن سؤال معين فتنتج قيمة مفقودة بسبب عدم الاستجابة. في مثل هذه الحالات، يمكن للمستخدم استخدام هذه الخانة لنتعريف القيم المفقودة كما يرغب. وفي حالة عدم وجود قيم مفقودة في المتغير فإن الخانة يظهر فيها الوصف لا يوجد (None).

¹ يمكنك التعرف على نافذة الإعدادات العامة في البند (5.1).² سيتم التطرق لمفهوم المتغيرات الكمية والوصفيه بالتفصيل في الفصل القادم.

- عرض العمود (Columns): ويمثل المساحة التي ستشغلها قيم المتغير ضمن العمود، وهو خيار شكلي فقط لا يؤثر تغييره في تغيير قيم المتغير. ويكون عرض العمود الافتراضي للمتغير هو 8.
- محاذاة أو تراصف قيم المتغير (Align): وهو الخيار الخاص بمحاذاة قيم المتغير إلى اليمين (Right) (Center). علما بأن الوضع الافتراضي للمحاذاة يكون إلى اليمين.
- نوع أو قياس المتغير (Measure): في هذه الخانة يتم تحديد نوع المتغير من بين ثلاثة خيارات؛ كمي (Scale) أو وصفي رتبى (Ordinal) أو وصفي اسمى (Nominal). أما إذا لم يتم تحديد نوع المتغير من قبل المستخدم فسيظهر الوصف (Unknown) بمعنى أن نوع المتغير غير محدد.
- وظيفة أو دور المتغير (Role): في معظم الأساليب الإحصائية، يكون للمتغير أو المتغيرات دور معين في الأسلوب أو النموذج الإحصائي¹، فيمكن أن يكون دور المتغير مدخل (Input) أو هدف (Target) أو يأخذ الدورين بحسب طبيعة الأسلوب الإحصائي (Both) أو ليس له دور محدد مسبقا (None) أو له دور تقسيمي أو تنصيفي² (Partition) أو دور لتجزئة البيانات (Split). وتعيين هذا الدور يكون عادة لداعي تنظيمية فقط ولا يؤثر ترك المتغيرات بدون تعين على دورها في سير مرحلة التحليل الإحصائي في العموم. والتعيين الافتراضي لدور المتغير يكون كمدخل.

4.1 إدخال البيانات في نافذة تحرير البيانات (Data Entry in SPSS Data Editor)

في هذا البند، سيتم التعرف على كيفية إدخال البيانات (أو تعريف المتغيرات) في نافذة تحرير البيانات من خلالتناول مثال افتراضي بسيط يشمل إدخال بيانات جديدة بصورة مباشرة، علما بأنه توجد عدة طرق لإدخال البيانات أو استدعائها إلى برنامج SPSS، والتي سيتم التطرق إليها لاحقا.

عند استخدام الطريقة التقليدية لواجهة المستخدم البيانية، وهي كما أسلفنا الطريقة الأكثر شيوعا بين المستخدمين الجدد في إدخال البيانات، فإن الإدخال يكون عادة على مراحلتين؛ المراحل الأولى هيتعريف أسماء المتغيرات ونوعها وخواصها (ويتم ذلك باستخدام نافذة أسلوب عرض المتغيرات (Variable View)، والمرحلة الثانية هي التي يتم فيها إدخال قيم هذه المتغيرات التي تمتعريفها، (باستخدام نافذة أسلوب عرض البيانات (Data View)). وسنقوم تاليا بالتدريب على تنفيذ هاتين المراحلتين.

¹ في أسلوب تحليل الانحدار على سبيل المثال، (والذي سيتم تناوله في الفصل الخامس)، يتم تعريف دور أحد المتغيرات بأنه تابع وتعريف دور المتغير أو المتغيرات الأخرى بأنها توضيحية.

² يعني أن يتم تقسيم بيانات الدراسة إلى ثلاثة أقسام؛ عينة التحليل (Training Sample)، وعينة اختبارية (Testing Sample)، وعينة للتقدير (Validation) كما هو الحال في بعض الدراسات الإحصائية.


1.4.1 نافذة عرض المتغيرات (Variable View Window)

البيانات في الجدول (1.1) هي بيانات افتراضية خاصة بعشرة أطفال في إحدى المؤسسات التعليمية في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وتشمل ثلاثة متغيرات هي وزن الطفل وعمره وجنسه. وسنقوم بإدخال هذه البيانات في ملف بيانات في برنامج SPSS بالطريقة التقليدية المباشرة.

جدول 1.1: بيانات افتراضية خاصة بعشرة أطفال في إحدى المؤسسات التعليمية.

14.8	21.6	13	16.4	18.9	20.1	15.2	9.5	12	10.2	وزن الطفل (بالكجم)
6	9	5	6	7	8	6	4	5	4	عمر الطفل (بالسنة)
ذكر	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	أنثى	ذكر	ذكر	جنس الطفل

في المرحلة الأولى، وبعد تشغيل البرنامج، تأكد أولاً من ظهور نافذة المستخدم البيانية "الفارغة" كما هو موضح في الشكل (2.1) السابق. قم بعد ذلك باختيار أسلوب عرض المتغيرات (Variable View) من أسفل النافذة إلى اليسار فتظهر النافذة كما في الشكل (4.1) السابق. في هذه النافذة، قم بالضغط باستخدام الفأرة على أول مربع فارغ تحت اسم المتغير (Name) وستلاحظ تغيير لون الخلفية إلى اللون الأصفر.



سنقوم الآن بإدخال اسم المتغير الأول في هذا الموضع، وكما تمت الإشارة سابقاً، يمكنك اختيار الاسم المرغوب ضمن القيود المحددة. ليكن اسم المتغير الأول هو "الوزن"، قم بكتابة هذا الاسم في المربع الأول، ثم اضغط على مفتاح الإدخال¹ في لوحة مفاتيح حاسوبك (ENTER). ستلاحظ هنا أن باقي الخانات في نفس الصف الأول قد ظهرت فيها قيم أو مصطلحات، وهي كما ذكرنا القيم الافتراضية المصاحبة لإدخال أي متغير جديد.

¹ يمكنك أيضاً بدلاً من استخدام مفتاح الإدخال الضغط بالفأرة على أي مكان فارغ في النافذة لتنفيذ الإدخال.

وهذا يكون للمستخدم الخيار إما بتعديل بعض أو حتى كل القيم والخيارات للمتغير الجديد بحسب ما يناسب هذا المتغير، أو أن يستمر بكتابة أسماء المتغيرات الجديدة الأخرى في عامود الأسماء ومن ثم يعود لتعديل الخيارات للمتغيرات المدخلة. سنقوم نحن باعتماد الخيار الأول، أي أنه سيتم تعديل الخيارات بحسب أولوية إدخال المتغيرات.

في الصف الأول، سنقوم بتعديل الخيارات التالية:

- **الخانات العشرية (Decimals):** قم بكتابة¹ الرقم 1 ثم اضغط إدخال، أي اختيار خانة عشرية واحدة حيث أن ذلك يتاسب مع طبيعة القيم العشرية لهذا المتغير.
- **وصف المتغير (Label):** يمكن كتابة² الوصف التالي؛ "وزن الطفل بالكجم" ثم اضغط إدخال³.
- **نوع المتغير (Measure):** قم باختيار نوع المتغير الكمي (Scale) والذي يتاسب مع الطبيعة الكمية لمتغير الوزن.

نلفت انتباه القارئ هنا إلى أن باقي الخيارات الخاصة بالمتغير قد تم تجاهلها إما لعدم الحاجة إليها (مثل تصنيف قيم المتغير (Values) والقيم المفقودة (Missing))، أو لكنها خيارات ثانوية يمكن تعديلها أو تركها على حالتها الافتراضية (مثل ما تبقى من الخيارات الأخرى).

تنقل الآن لتعريف المتغير الثاني، وهو عمر الطفل؛ قم بكتابة اسم المتغير "العمر" في الخانة الثانية في العامود الأول إلى اليسار، تحت اسم المتغير الأول "الوزن" مباشرة، وبالمثل ستجد أن خانات الخيارات في الصف الثاني قد ظهرت بقيمها الافتراضية، وسنقوم بتعديل الخيارات التالية:

- **الخانات العشرية (Decimals):** قم بكتابة الرقم 0 ثم اضغط إدخال، حيث أن هذا المتغير لا يتطلب أية خانات عشرية.
- **وصف المتغير (Label):** قم بكتابة الوصف التالي؛ "عمر الطفل بالسنوات" ثم إدخال.
- **نوع المتغير (Measure):** قم باختيار نوع المتغير الكمي (Scale) والذي يتاسب مع الطبيعة الكمية لمتغير العمر.

وأخيراً، في أسلوب عرض المتغيرات، نقوم بتعريف المتغير الثالث في البيانات، وهو جنس أو نوع الطالب بنفس الطريقة؛ قم بكتابة اسم المتغير "النوع" في الخانة الثالثة في العامود الأول إلى اليسار، تحت اسم المتغير الثاني،

¹ يمكن أيضاً استخدام السهمين اللذين سيظهران داخل الخانة عند الضغط مررتين بالفأرة لزيادة أو إنقاص العدد المطلوب، وهذه السهمين سيظهران في كل الخانات التي تضم قيم عددية في العموم في أسلوب عرض المتغيرات (Variable View).

² في حال توفر وصف جاهز (مكتوب مسبقاً) للمتغير في ملف وورد (Word) أو أي ملف بصيغة "txt" يمكن أخذ نسخة منه (Copy) ولصقها (Paste) داخل الخانة المطلوبة.

³ في هذه المرحلة من الكتاب نذكر القارئ دائماً بالضغط على مفتاح الإدخال بعد كل عملية كتابة لقيمة والخيارات، إلا أننا سنترك هذا التذكرة في المراحل القادمة بعد أن يكون القارئ قد اعتاد على عملية الإدخال.

وبالمثل ستجد أن خانات الخيارات في الصنف الثالث قد ظهرت بقيمها الافتراضية، وستكون تعديلات الخيارات بالصورة التالية:

- الخانات العشرية (Decimals): قم بكتابة الرقم 0 ثم اضغط إدخال، حيث أن هذا المتغير لا يتطلب أية خانات عشرية.
- وصف المتغير (Label): قم بكتابة الوصف التالي؛ "نوع أو جنس الطفل" ثم إدخال.
- نوع المتغير (Measure): قم باختيار نوع المتغير الوصفي الاسمي (Nominal) والذي يتناسب مع طبيعة¹ متغير النوع.
- تصنیف قيم المتغير (Values): قم بالضغط مررتين على هذه الخانة فيظهر مربع صغير باللون الأزرق في يمين الخانة، قم بالضغط عليه فتظهر نافذة صغيرة في وسط الشاشة كما هو موضح في الشكل (6.1). سنقوم الآن بإعطاء القيمة 1 كرمز للذكور، والقيمة 2 كرمز للإناث، فنبأ بكتابة القيمة 1 في الخانة المقابلة لقيمة (Value)، وكتابة "ذكر" في خانة الوصف (Label) أسفل منها بدون استخدام أقواس في كتابة الوصف.


بمجرد الانتهاء من تعيين هاتين الخانتين، سيسنط المربع الخاص بالأمر (Add) أسفل منهما. قم بالضغط عليه فيظهر في الخانة المقابلة له الوصف (1="ذكر")، بمعنى أنه قد تم تعريف القيمة 1 بأنها تمثل أو تصف التصنیف "ذكر" في المتغير المسمى النوع².

بالمثل سنقوم بتعريف الوصف الثاني، وهو الإناث بنفس الطريقة، قم بكتابة القيمة 2 في الخانة المقابلة لقيمة (Value)، وكتابة "أنثى" في خانة الوصف (Label) ثم الضغط على الأمر (Add) فيظهر في الخانة المقابلة له الوصف (2="أنثى") أسفل الوصف الأول³. وبعد الانتهاء من تصنیف قيم المتغير، نضغط أمر موافق (OK) في نفس النافذة لتأكيد الانتهاء من التصنیف.

¹ سيتم توضیح كيفية التميیز بين أنواع المتغيرات الكمية منها والوصفیة في الفصل التالي.

² في حال حدوث أي خطأ أثناء تعريف القيم للمتغير، يمكنك استخدام المربع الخاص بالأمر (Change) للإجراء التعديل المطلوب، أو استخدام الأمر (Remove) لحذف الوصف الموجود وإعادة كتابة وصف جديد.

³ في حال وجود أكثر من تصنیف للمتغير الوصفي، يتم الاستمرار بإدخال القيم العددیة بنفس التسلیل حتى استكمال كل التصنیفات الموجودة، فمثلاً إذا كان المتغير الوصفي يمثل تقديرات طلبة هي؛ (راسب، مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز)، فإنه يتم تعريف القيم التالية؛ (1، 2، 3، 4، 5) مقابل كل تصنیف.



شكل 6.1: النافذة الخاصة بتعريف قيم المتغير الوصفي في نافذة محرر البيانات في برنامج SPSS.

وبهذا تكون قد انتهينا من تعريف المتغيرات الثلاثة، ويمكن البدء بإدخال قيم هذه المتغيرات في أسلوب عرض البيانات (Data View)، إلا أنه من الأفضل دائمًا حفظ ما تم إنجازه حتى الآن قبل المضي قدماً في إدخال قيم المتغيرات، تجنباً لفقدان البيانات نتيجة حدوث خلل طارئ في جهاز الكمبيوتر أو غيرها من الأسباب.

2.4.1 حفظ ملفات البيانات (Saving Data Files)

في شريط الأوامر العلوي، (المشار إليه في شكل (3.1) سابقاً)، قم باختيار أمر ملف (File)، فتظهر قائمة أسفل منه تحتوي على بعض الأوامر الفرعية. قم باختيار أمر الحفظ (Save)، فتظهر نافذة الحفظ كما هو موضح في الشكل (7.1).




شكل 7.1: نافذة حفظ الملفات في برنامج SPSS.

في شريط مسار الحفظ (Look in) في أعلى نافذة الحفظ، قم باختيار المسار أو الموقع الذي ترغب في حفظ ملف البيانات فيه، ولتسهيل حفظ واستدعاء الملفات الخاصة ببرنامج SPSS نقترح على القارئ استخدام مسار سطح المكتب (Desktop) حيث أنه المسار الأكثر استخداماً تحت بيئة ويندوز في العموم.

في شريط اختيار اسم الملف (File name)، يمكنك اختيار الاسم الذي ترغب به لملف البيانات وسنقوم نحن باختيار الاسم "مثال1". ويقوم برنامج SPSS بتعيين الامتداد ".sav". لملفات البيانات فيه، كما يقوم بتعيين امتدادات أخرى لأنواع الأخرى من الملفات كما سنرى لاحقاً.

بعد الانتهاء من تحديد مسار الحفظ وكتابة اسم ملف البيانات، قم بالضغط على أمر الحفظ (Save) في يمين نافذة الحفظ فتظهر لك نافذة جديدة كما في الشكل (8.1).



شكل 8.1: نافذة المخرجات في برنامج SPSS

هذه النافذة تعرف بـ**نافذة المخرجات (Output)** في برنامج SPSS، وهي تظهر بشكل منفصل بمعنى أن المستخدم سيتعامل مع هذه النافذة في إطار جديد منفصل عن إطار البرنامج الرئيسي كما يشاهد في شريط المهام (Taskbar) أسفل الشاشة. وهذا هو الأسلوب القياسي المتبعة في برنامج SPSS في عرض كل النتائج والمخرجات الناتجة عن الأوامر المدخلة. وهذه النافذة ستأخذ الاسم "Output1"، وهو الاسم الافتراضي لملف المخرجات، ويمكن للمستخدم حفظ ملف المخرجات بصورة مستقلة كما هو الحال مع ملف البيانات.

الآن سيلاحظ القارئ ظهور رسالة داخل نافذة المخرجات توضح ما تم من حفظ لملف البيانات في مسار سطح المكتب باسم "مثال1". في الوقت الحالي، قم بتصغير نافذة المخرجات للاحتفاظ بها أسفل الشاشة، والعودة للنافذة الرئيسية للبرنامج حيث ستلاحظ أن اسم ملف البيانات الجديد قد ظهر في الشريط العلوي للبرنامج.

3.4.1 نافذة عرض البيانات (Data View Window)

قبل البدء بعملية الحفظ، كان قد انتهينا من تعريف المتغيرات للمثال الافتراضي في جدول (1.1) السابق، والآن ننتقل للمرحلة الثانية وهي إدخال قيم هذه المتغيرات في SPSS. قم من أسفل النافذة الرئيسية باختيار نافذة

أسلوب عرض البيانات (Data View)، وستلاحظ أن المتغيرات الثلاثة الأولى إلى اليسار قد أخذت أسماؤها كما تم إدراجها في أسلوب عرض المتغيرات؛ الوزن، العمر، والنوع.

قم بإدخال قيم المتغير الأول، وهو الوزن بنفس ترتيبها في الجدول (1.1)، أي ستبدأ بإدخال القيمة 10.2 ثم 12 وهكذا وصولاً لقيمة الأخيرة 14.8. وفي حل إدخال قيمة بصورة خاطئة في إحدى الخلايا (المربعات الفارغة) يمكنك العودة لتلك الخلية وإعادة كتابة القيمة الصحيحة.

بعد ذلك يتم إدخال قيم المتغير الثاني وهو العمر بنفس الكيفية، أي بداية من القيمة 4 ثم 5 وصولاً لقيمة الأخيرة في المتغير وهي 6. أما بالنسبة للمتغير الوصفي النوع، فإن قيمه يتم إدخالها بصورة رقمية وليس اسمية كما تم تعريفها في خانة الوصف (Label) في أسلوب عرض المتغيرات في المرحلة الأولى، أي أننا سندخل القيمة 1 مقابل كل نوع "ذكر" والقيمة 2 مقابل كل نوع "أنثى". وفي النهاية ستكون القيم في ملف البيانات لديك كما هو موضح في الشكل (9.1).

1	الوزن	العمر	النوع	var	var	var	var	var	var
1	10.2	4	1						
2	12.0	5	1						
3	9.5	4	2						
4	15.2	6	1						
5	20.1	8	2						
6	18.9	7	2						
7	16.4	6	1						
8	13.0	5	2						
9	21.6	9	2						
10	14.8	6	1						
11									

شكل 9.1: قيم المتغيرات في ملف البيانات "مثال 1".

ويمكن للمستخدم الضغط على أيقونة عرض وصف المتغير

في شريط أيقونات الأوامر للتغيير بين عرض قيم المتغير الرقمية أو قيم المتغير الاسمية.

ملاحظة:

لاحظ ظهور رمز النجمة (*) بجانب اسم ملف البيانات في الشريط العلوي، وهذه هي طريقة البرنامج في تتبّيه المستخدم إلى أنه قد تم إجراء تعديلات أو إضافات إلى ملف البيانات ولم يتم حفظها بعد، لذلك يمكنك بعد إتمام إدخال البيانات حفظ الملف باستخدام File>Save بمعنى الضغط على ملف (File) في شريط الأوامر ثم حفظ (Save)، أو لمزيد من السرعة، يمكنك الضغط على أيقونة الحفظ  فيت حفظ التعديلات الأخيرة.

الآن أصبح لدينا ملف بيانات في برنامج SPSS باسم "مثال 1" يحتوي على ثلاثة متغيرات معرفة بشكل واضح



وظاهرة للتحليل الإحصائي، ويكون شكل أيقونة ملف البيانات على سطح المكتب بالصورة .

أما بالنسبة لنافذة المخرجات فيمكن تجاهلها (عدم حفظها) في المرحلة الحالية، وسيتم التعامل معها في أمثلة لاحقة. قم بإغلاق نافذة المخرجات وستظهر لك رسالة للاستفهام عن رغبة المستخدم في حفظ ملف المخرجات، قم عندما باختيار لا (No) وستغلق النافذة. ولإنهاء الجلسة الحالية في برنامج SPSS، قم بإغلاق نافذة البرنامج الرئيسية وستظهر لك رسالة تنبئه إلى أن البرنامج سيتم إغلاقه، قم عندما باختيار نعم (Yes).


ولفتح ملف البيانات "مثال 1" أو أي ملف بيانات آخر، يمكنك إما النقر مررتين على أيقونة الملف في مسار تخزينها، أو فتح برنامج SPSS ثم الضغط¹ على أيقونة فتح الملفات  في شريط أيقونات الأوامر ثم اختيار مسار التخزين (وهو سطح المكتب في مثالنا) ثم اختيار الملف المرغوب وهو "مثال 1" ثم اختيار فتح (Open). لاحظ أن نافذة المخرجات ستظهر أيضاً مع الملف المفتوح.

5.1 الإعدادات العامة في برنامج SPSS (General Settings)

يمكن في برنامج SPSS، كشأن كل البرامج تحت مظلة ويندوز ، تغيير الكثير من الإعدادات الافتراضية في البرنامج، مثل شكل النوافذ، أشكال وألوان الجداول والرسومات البيانية، حجم ونوع ولون الخطوط المستخدمة، كيفية عرض النتائج، وغيرها من الأمور. وهذه الإعدادات يمكن الوصول إليها من شريط الأوامر العلوي باختيار الأمر تحرير (Edit) ثم اختيار خيارات (Options) في آخر القائمة. عندها ستظهر نافذة الإعدادات أو الخيارات، وهنا ننصح المستخدمين المبتدئين بعدم إجراء تغييرات في إعدادات البرنامج قبل أن يكونوا قد قطعوا شوطاً جيداً في الالمام بالتعامل مع المخرجات من جداول ورسومات وغيرها.

¹ أو يمكن استخدام الطريقة التقليدية في فتح الملفات عن طريق اختيار أمر ملف (File) في شريط الأوامر ثم فتح (Open) ثم بيانات (Data) ومن ثمة اختيار ملف البيانات من المسار المحدد.

إلا أننا سوف نقوم بتعديل واحد فقط هنا بُغية تسهيل الوصول للملفات المحفوظة. سنقوم بالدخول لنافذة الإعدادات واختيار نافذة موقع الملفات (File Locations) كما يظهر في الشكل (10.1).



شكل 10.1: نافذة الخيارات العامة في برنامج SPSS.

سنقوم في هذه النافذة بتغيير مسار فتح وحفظ ملفات البيانات إلى مسار سطح المكتب (Desktop) بشكل دائم، حيث أنه المسار المفضل للمستخدمين تحت بيئة ويندوز في العموم كما وضحنا سابقاً.

في مربع المجلدات الافتتاحية (Startup Folders for Open and Save Dialogs)، قم بالنقر على خيار المجلد المحدد (Specified Folders). الآن سنقوم باختيار مسار سطح المكتب في كلا المربعين؛ ملفات البيانات (Other files) والملفات الأخرى (Data files)، وذلك إما عن طريق كتابة مسار سطح المكتب مباشرة، أو الضغط على زر التصفح (Browse) على اليمين واختيار المسار المطلوب.

ويمكن للقارئ هنا ملاحظة أن مسار سطح المكتب، (في الشكل (10.1)), يحتوي على اسم جهاز الحاسوب الحالي للمؤلف الذي يعمل عليه برنامج SPSS، والذي سيتضمن اسم جهاز المستخدم عند تغيير المسار بالطبع.

الفصل الثاني

التعامل مع ملفات البيانات في برنامج SPSS (Dealing with Data Files in SPSS)

1.2 استيراد الملفات إلى برنامج SPSS (Importing Files to SPSS)

تناولنا في الفصل السابق طريقة إدخال البيانات في برنامج SPSS بطريقة واجهة المستخدم البيانية (Graphical User Interface (GUI)) باستخدام نافذة تحرير البيانات، وأوضحنا أن هذه الطريقة تعتبر الطريقة المباشرة والأكثر استخداماً في إدخال البيانات في SPSS. إلا أنه في بعض الأحيان، قد تكون البيانات متوفرة مسبقاً في ملفات بيانات ضمن برامج أخرى، مثل اكسل (MS Excel)، Statistica، S-plus، SAS، R، وغيرها، عندها وتوفيراً للوقت والجهد يمكن للمستخدم استيراد هذه الملفات من مصدرها الأصلي إلى برنامج SPSS وبالتالي معها مباشرة.

ملاحظة:

في هذا البند، سيتم توضيح كيفية استيراد ملفات البيانات من برنامج اكسل فقط¹ حيث أنه في معظم البرامج الإحصائية الأخرى يمكن بسهولة حفظ أو تصدير ملف البيانات بصيغة اكسل.

لتوضيح طريقة استيراد ملفات البيانات من برنامج اكسل، سنقوم بتطبيق مثال عملٍ خطوة بخطوة لتسهيل العملية للمستخدم. قم أولاً بإدخال البيانات الموجودة في الجدول التالي، (جدول 1.2)، في ملف بيانات جديد في برنامج اكسل²، وقم بحفظه³ بالاسم "بيانات الطلبة". أي أنه سيأخذ الامتداد ".xlsx".

البيانات في جدول (1.2) هي بيانات افتراضية تمثل المشاهدات الخاصة بـ 35 طالباً جامعياً مقاسة لثمانية متغيرات معرفة بالصورة التالية.

¹ للمزيد من المعلومات حول استيراد ملفات البيانات بصيغ أخرى غير صيغة اكسل، يمكن الرجوع للمساعدة (Help) في شريط الأوامر الرئيسي في برنامج SPSS.

² تم استخدام الإصدارات 2010 و 2016 Excel في التطبيقات وقت إعداد الكتاب.

³ يفضل حفظ ملف بيانات اكسل في مسار سطح المكتب لتسهيل استدعاؤه لاحقاً.


جدول 1.2: البيانات الخاصة بالملف "بيانات الطلبة".

	المنزل	الأسرة	الفصل	النوع	العمر	مقرر 3	مقرر 2	مقرر 1
1	55	50	60	22	1	3	10	2
2	49	52	50	19	1	8	11	2
3	60	54	51	23	1	2	10	2
4	65	70	54	20	2	3	8	3
5	35	40	40	24	1	7	12	2
6	71	70	45	22	1	4	9	3
7	73	74	49	21	1	5	9	4
8	90	91	61	22	2	4	3	6
9	88	93	59	20	2	4	3	5
10	75	77	60	22	1	3	6	4
11	50	51	61	25	1	7	9	3
12	77	79	59	24	1	2	6	4
13	79	81	33	23	2	4	4	5
14	66	70	60	21	1	6	5	4
15	80	82	58	20	2	2	5	5
16	40	44	60	24	1	8	12	2
17	45	50	43	25	1	7	11	3
18	51	55	94	24	2	6	9	3
19	82	85	50	22	2	3	4	5
20	75	77	27	22	1	5	4	4
21	84	84	57	20	2	4	4	5
22	86	87	52	23	2	8	4	4
23	77	78	57	22	2	6	5	5
24	88	90	62	19	2	7	3	5
25	64	70	50	21	1	7	7	3
26	89	91	53	23	2	4	3	5
27	90	93	50	21	2	6	3	6
28	63	66	51	25	1	5	5	4
29	75	85	95	22	2	3	2	6
30	69	70	44	23	1	5	6	4
31	77	80	92	21	2	8	4	5
32	68	69	54	22	1	6	5	5
33	93	75	45	23	2	5	2	6
34	73	75	52	24	1	6	5	4
35	94	96	49	21	2	4	2	6

- مقرر 1: درجة الطالب¹ في المقرر 1.
- مقرر 2: درجة الطالب في المقرر 2.
- مقرر 3: درجة الطالب في المقرر 3.
- العمر: عمر الطالب (بالسنوات).
- النوع: جنس الطالب (1=ذكر، 2=أنثى).
- الفصل: ترتيب الفصل الدراسي للطالب.
- الأسرة: عدد أفراد أسرة الطالب.
- المنزل: عدد الحجرات في منزل الطالب.

¹ درجة الطالب في المقررات الثلاثة مقاسة من 100 درجة.

بعد إدخال بيانات الجدول السابق في اكسل وحفظها باسم المطلوب، سنحصل على ملف بيانات مشابه¹ لذلك الموضح في الشكل (1.2).



I	H	G	F	E	D	C	B	A	
المنزل	الأسرة	الفصل	النوع	العمر	مقرر 3	مقرر 2	مقرر 1		1
2	10	3	1	22	60	50	55		2
2	11	8	1	19	50	52	49		3
2	10	2	1	23	51	54	60		4
3	8	3	2	20	54	70	65		5
2	12	7	1	24	40	40	35		6
3	9	4	1	22	45	70	71		7
4	9	5	1	21	49	74	73		8
6	3	4	2	22	61	91	90		9
5	3	4	2	20	59	93	88		10
4	6	3	1	22	60	77	75		11
3	9	7	1	25	61	51	50		12
4	6	2	1	24	59	79	77		13
5	4	4	2	23	33	81	79		14
4	5	6	1	21	60	70	66		15
5	5	2	2	20	58	82	80		16
2	12	8	1	24	60	44	40		17
3	11	7	1	25	43	50	45		18
3	9	6	2	24	94	55	51		19
5	4	3	2	22	50	85	82		20
4	4	5	1	22	27	77	75		21
5	4	4	2	20	57	84	84		22
4	4	8	2	23	52	87	86		23
5	5	6	2	22	57	70	72		24


شكل 1.2: ملف البيانات "بيانات الطلبة" في برنامج اكسل.

الآن سنقوم بتنفيذ الخطوات التالية لفتح (استيراد) ملف بيانات بصيغة اكسل في برنامج SPSS:

في برنامج SPSS قم باختيار أيقونة فتح الملفات في شريط أيقونات الأوامر (أو يمكن اختيار أمر ملف (File) في شريط الأوامر ثم فتح (Open) ثم بيانات (Data)).


في نافذة فتح الملفات، كما هو موضح في الشكل (2.2)، قم أولاً باختيار مسار الملف المطلوب، وهو سطح المكتب الذي تم حفظ الملف فيه، وثانياً قم باختيار نوع الملف المطلوب، وهو ملف اكسل، وسيظهر الملف المطلوب داخل المساحة البيضاء في النافذة، قم باختياره ثم اضغط أمر الفتح (Open).

¹ قد يختلف شكل الملف قليلاً إذا ما كان القارئ يستخدم إصدار مختلف عن الإصدارات 2010، 2016، أو Excel، أو إذا كان يستخدم الواجهة الإنجليزية للبرنامج.



شكل 2.2: خطوات فتح ملف اكسل في نافذة فتح الملفات في برنامج SPSS

بعد الضغط على أمر الفتح، ستظهر نافذة جديدة، كما هو ظاهر في الشكل (3.2)، والتي تحتوي على بعض الخيارات التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها كالتالي؛



شكل 3.2: الخيارات الخاصة بفتح ملف اكسل في برنامج SPSS.

الخيار (أ) يتم اختياره عندما تكون أسماء المتغيرات في ملف البيانات موجودة في الصف الأول، (وهذا هو الحال في مثالنا الحالي). أما الخيار (ب)، فهو لتحديد الورقة التي توجد فيها البيانات في ملف اكسل الأصلي، (وفي مثالنا البيانات موجودة في الورقة¹ الأولى؛ ورقة1). وفي الخيار الثالث (ج)، يمكن للمستخدم اختيار مجموعة

¹ حيث أن برنامج اكسل يوفر افتراضياً ثلاثة ورقات لكل ملف بيانات.

محددة من المتغيرات التي يرغب باستيرادها من داخل ملف اكسيل إذا لم يرغب باستيراد كل المتغيرات، (وفي مثلنا تم ترك هذا الخيار فارغاً بمعنى أن كل المتغيرات في الملف سيتم استيرادها).

بعد الانتهاء من خيارات الفتح اضغط موافق (OK)، وسيتم فتح ملف البيانات المطلوب، وكذلك فتح نافذة المخرجات كالمعتاد، وستجد أن كافة المتغيرات قد تم استيرادها بنفس الأسماء إلى برنامج SPSS. وبالطبع، سنقوم بحفظها بصيغة SPSS، قبل الانتقال للخطوة التالية. وخطوات الحفظ ستكون مطابقة لما تم توضيحه في الفصل الأول (في البند (2.4.1)), أي أن المستخدم سيقوم باختيار File>Save ثم اختيار مسار الحفظ، (ول يكن كما هو الحال دائماً على سطح المكتب)، ثم اختيار اسم الملف، (ول يكن نفس الاسم الأصلي المستخدم "بيانات الطلبة"، ثم نضغط حفظ (Save).

ملاحظة:


لاحظ هنا أنه سيكون لديك الآن ملفان مختلفان بنفس الاسم على سطح المكتب، الأول هو بصيغة اكسيل بالامتداد "بيانات الطلبة.xlsx" ، والآخر بصيغة SPSS وهو بالامتداد "بيانات الطلبة.sav".

الآن في ملف بيانات SPSS: "بيانات الطلبة.sav" يمكنك ملاحظة أن خصائص المتغيرات بحاجة إلى بعض التعديل، وفيما يلي سنقوم بإجراء التغييرات التالية بهدف جعل الملف أكثر تنظيماً للاستخدامات اللاحقة؛

- تغيير مسافة عرض قيم المتغير (Width) لجميع المتغيرات إلى القيمة الافتراضية .8.
- تغيير عدد الخانات العشرية (Decimals) لجميع المتغيرات إلى 0 نظراً لطبيعة الأعداد الصحيحة للمتغيرات.
- إضافة الأوصاف التالية للمتغيرات (Label);
 - 1. مقرر 1: درجة الطالب في المقرر.
 - 2. مقرر 2: درجة الطالب في المقرر.
 - 3. مقرر 3: درجة الطالب في المقرر.
 - 4. العمر: عمر الطالب بالسنوات.
 - 5. النوع: جنس الطالب.
 - 6. الفصل: ترتيب الفصل الدراسي للطالب.
 - 7. الأسرة: عدد أفراد أسرة الطالب.
 - 8. المنزل: عدد الحجرات في منزل الطالب.
- إضافة التصنيف (Values) التالي لقيم متغير النوع؛ (1= ذكر، و2= أنثى).
- تغيير عرض العمود (Columns) لجميع المتغيرات إلى القيمة الافتراضية .8.

- إبقاء أنواع المتغيرات (Measure)؛ "مقرر 1"، "مقرر 2"، "مقرر 3"، و"العمر" كمية (Scale)، ومتغير "النوع" وصفي اسمي (Nominal)، وتغيير نوع المتغير؛ "الفصل" إلى وصفي ترتيبى (Ordinal)، وتغيير نوع المتغيران؛ "الأسرة" و"المنزل" إلى كمي (Scale).

نقوم بعد ذلك بحفظ ملف البيانات، والذي سيبدو كما هو موجود في الشكل (4.2). ثم نغلق الملف.



Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
مقرر 1	Numeric	8	0	درجة الطالب في المقرر 1	None	None	8	Right	Scale	Input
مقرر 2	Numeric	8	0	درجة الطالب في المقرر 2	None	None	8	Right	Scale	Input
مقرر 3	Numeric	8	0	درجة الطالب في المقرر 3	None	None	8	Right	Scale	Input
العمر	Numeric	8	0	عمر الطالب بالسنوات	None	None	8	Right	Scale	Input
النوع	Numeric	8	0	جنس الطالب	{1, ذكر}...	None	8	Right	Nominal	Input
الفصل	Numeric	8	0	ترتيب الفصل الدراسي للطالب	None	None	8	Right	Ordinal	Input
الأسرة	Numeric	8	0	عدد أفراد أسرة الطالب	None	None	8	Right	Scale	Input
المنزل	Numeric	8	0	عدد الحجرات في منزل الطالب	None	None	8	Right	Scale	Input

بيانات الطلبة.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor								
View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help								
								
مقرر 1	مقرر 2	مقرر 3	العمر	النوع	الفصل	الأسرة	المنزل	
55	50	60	22	1	3	10	2	
49	52	50	19	1	8	11	2	
60	54	51	23	1	2	10	2	
65	70	54	20	2	3	8	3	
35	40	40	24	1	7	12	2	
71	70	45	22	1	4	9	3	
73	74	49	21	1	5	9	4	
90	91	61	22	2	4	3	6	
88	93	59	20	2	4	3	5	
75	77	60	22	1	3	6	4	
50	51	61	25	1	7	9	3	
77	79	59	24	1	2	6	4	


شكل 4.2: أسلوب عرض المتغيرات (في الأعلى) وعرض البيانات (في الأسفل) لملف البيانات "بيانات الطلبة" في SPSS.

2.2 تصدير الملفات من برنامج SPSS (Exporting Files from SPSS)

كما هو الحال مع استيراد ملفات البيانات من البرامج الأخرى، (والذي تم تطبيقه مع برنامج اكسيل)، فإنه يمكن وبصورة أبسط، تصدير الملفات المحفوظة بصيغة SPSS إلى البرامج الأخرى. وما سنقوم بتطبيقه في هذا البند، هو حفظ ملف البيانات (المتوفر مسبقاً بصيغة SPSS) بصيغة أخرى، وهي صيغة برنامج اكسيل باعتباره "الصيغة المشتركة" بين معظم البرامج الإحصائية والرياضية. ومن أهم البرامج التي يمكن للمستخدم حفظ ملف البيانات بصيغتها المباشرة (إصدارات مختلفة) هي البرامج التالية؛ اكسيل، dBase، SAS، Stata، وكتلك يمكن حفظ ملف البيانات بصورة نصية (.txt).

ولنأخذ ملف البيانات الذي قمنا بكتوينه في الفصل الأول باسم "مثال1" في برنامج SPSS كمثال تطبيقي على حفظ الملفات بصيغة اكسيل. وستكون خطوات تصدير الملف كالتالي:

1. قم بفتح ملف البيانات "مثال1" الموجود في مسار سطح المكتب في برنامج SPSS.
2. في شريط الأوامر العلوي، قم باختيار ملف (File) ثم حفظ باسم (Save As)، فتظهر النافذة الخاصة بالحفظ، كما يظهر في الشكل (5.2).
3. في هذه النافذة، قم بالضغط على الخيار الخاص بتحديد نوع الملف المطلوب حفظه، كما يوضح السهم رقم (1) الموجود في الشكل. ستتسدل عند ذلك قائمة صغيرة تحتوي على أسماء البرامج التي يمكن اختيار صيغة (إصدارات) حفظ الملف بها. في مثاناً، سنقوم بحفظ الملف بصيغة اكسيل (الإصدار 2010) كما يشير السهم (2) في الشكل.
4. بعد ذلك قم بالضغط على أمر حفظ (Save) في النافذة. وبذلك تكون عملية حفظ ملف البيانات (بنفس الاسم "مثال1") بصيغة اكسيل قد تمت، ويمكنك بعدها مشاهدة ملف البيانات "مثال1.xlsx" على سطح المكتب. قم بفتحه وستجد البيانات المتعلقة بالمتغيرات الثلاثة؛ الوزن، العمر، والنوع موجودة فيه بنفس النسق.



شكل 5.2: خطوات حفظ ملف البيانات "مثال1" بصيغة اكسيل داخل برنامج SPSS.

3.2 معالجة البيانات (Data Manipulation)

في كثير، إن لم يكن معظم الأحيان، قد يحتاج المستخدم أو الباحث إلى إعادة ترتيب أو معالجة بعض المتغيرات داخل ملف البيانات بناء على تقسيم معين¹، أو قد تتطلب الدراسة الإحصائية تعريف متغير جديد أو أكثر اعتماداً على علاقته² مع متغير أو أكثر في البيانات الأصلية، أو ربما تعريف متغير جديد كدالة³ رياضية في متغير آخر، وغيرها من الحالات التي تستدعي معالجة البيانات الأصلية لتحقيق أهداف معينة في الدراسة أو التحليل الإحصائي، في هذه الحالة، يمكن استخدام الأدوات الخاصة بمعالجة أو ترتيب البيانات.

ويمكن أيضاً استخدام أداة ترتيب المشاهدات للمساعدة في إعادة ترتيب القيم تصاعدياً أو تنازلياً إما لتنظيمها بصورة أكثر وضوحاً، أو لتقسيم البيانات المرتبة استعداداً لاستخدامها في تحليل البيانات لاحقاً. ويمكن في برنامج SPSS تقسيم البيانات بناء على قيم متغير واحد أو متغيرين أو حتى أكثر من ذلك.

ولتوضيح كيفية تنفيذ ترتيب البيانات في SPSS، لنأخذ مثلاً عملياً لترتيب البيانات الخاصة بملف البيانات "مثال 1" الذي تم إنشاؤه في الفصل الأول. قم بفتح الملف من مسار سطح المكتب ثم اختر أسلوب عرض البيانات (Data View)، فظهور البيانات، (كما هو موضح في الشكل (9.1) في الفصل الأول).


سنقوم أولاً في هذا المثال بترتيب أوزان الأطفال وأعمرهم بحسب جنس الطفل، أي أن متغيري "الوزن" و"العمر" سيتم إعادة ترتيب قيمهما بحسب جنس الطفل ذكراً كان أو أنثى. وحيث أن الذكور في هذه البيانات تم تعبيئهم للقيمة 1 والإإناث للقيمة 2، فإن أوزان وأعمار الأطفال الذكور سيتم عرضها في الصفوف الأولى متبوعة بأوزان وأعمار الإناث. وسنقوم الآن بتنفيذ الخطوات التالية:

1. في شريط الأوامر العلوي، قم باختيار بيانات (Data) ثم اختيار ترتيب المشاهدات (Sort Cases) من القائمة المنسدلة، فظهور نافذة جديدة كما هو موضح في الشكل (6.2).
2. وحيث أننا سنقوم بتقسيم متغيري "الوزن" و"العمر" بحسب متغير نوع الطالب، قم باختيار متغير " النوع" كما هو مشار إليه في رقم (1) في الشكل. ثم اضغط على السهم المشار إليه في رقم (2)، فينتقل المتغير إلى الخانة المشار إليها بالرقم (3)، والتي تشير لمتغير التصنيف المحدد.

¹ كأن يتم ترتيب المتغيرات بناء على النوع أو الوزن أو المستوى التعليمي، وغيرها.

² مثل أن يتم تعريف متغير جديد يمثل مدخلات الأشخاص بناء على الراتب الشهري والدخل الإضافي والمصروف الشهري.

³ مثل تعريف متغير كثافة الجسم كدالة في متغير الوزن.




شكل 6.2: نافذة ترتيب المشاهدات لملف البيانات "مثال 1".

ملاحظة:

إذا ما قمت بالضغط على (OK) في النافذة، فسيتم تنفيذ إعادة الترتيب المطلوب في نفس ملف البيانات الأصلي "مثال 1" وهذا سيؤدي بدوره لتغيير ترتيب البيانات بصورة نهائية، لذلك يفضل عادة حفظ التغييرات الجديدة في ملف بيانات جديد لتمكن المستخدم من العودة للبيانات الأصلية متى أراد ذلك. وهذا ما سنقوم به في الخطوة التالية.

3. قم باختيار الخيار المشار إليه في الرقم (4) في شكل (6.2)، ثم اضغط على أمر ملف (File) المشار إليه بالرقم (5) وذلك لتحديد مسار واسم الملف الجديد الذي سيحتوي على البيانات المُعاد ترتيبها. ستظهر بالطبع نافذة حفظ البيانات المعتادة، قم باختيار مسار سطح المكتب ثم قم بتعيين الاسم "مثال 2" للملف الجديد واضغط حفظ (Save). ستلاحظ بعد ذلك، في نفس النافذة، ظهور مسار الملف واسمه بجانب أمر ملف (File).
4. كخطوة اختيارية، (مشار إليها بالرقم (6) في الشكل (6.2))، يمكن للمستخدم ترتيب متغيري الوزن والعمر بحسب الترتيب التصاعدي (Ascending) أو التنازلي (Descending) لمتغير النوع، أي يمكن أن يكون التصنيف الأول هو للذكور المعرفين بالقيمة 1 (تصاعدياً) أو للإناث المعرفات بالقيمة 2 (تنازلياً). في مثالنا، سنبني الترتيب الافتراضي، وهو التصاعدي، كما هو بدون تغيير، وستنتهي خطوات إعادة ترتيب المتغيرات بالضغط على موافق في النافذة، فيظهر¹ ملف البيانات الجديد بالاسم "مثال 2"، كما يظهر في الشكل (7.2). وللحظ من الشكل كيف أن قيم مشاهدات الوزن والعمر للأطفال الذكور قد ظهرت في الصفوف الأولى متبوعة بالقيم الخاصة بالأطفال الإناث.

¹ لاحظ أن ملف البيانات الأصلي "مثال 1" سيغلق تلقائياً.




The screenshot shows the SPSS Data View window. The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, and Direct Marketing. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The data table has four columns: 'الوزن' (weight), 'العمر' (age), 'الجنس' (gender), and 'النوع' (type). The data rows are as follows:

	الوزن	العمر	النوع
1	10.2	4	1
2	12.0	5	1
3	15.2	6	1
4	16.4	6	1
5	14.8	6	1
6	9.5	4	2
7	20.1	8	2
8	18.9	7	2
9	13.0	5	2
10	21.6	9	2

شكل 7.2: البيانات المصنفة بحسب جنس الطالب، (ملف البيانات "مثال2").

ويمكن إعادة ترتيب البيانات بناء على متغيرين بدلا من متغير واحد، كما أشرنا سابقاً. ولتنفيذ ذلك عملياً، افترض أننا نريد ترتيب البيانات في الملف "مثال1" بناء على جنس الطفل أولاً ثم عمر الطفل ثانياً، فنقوم بفتح¹ ملف البيانات "مثال1" من جديد، ثم إعادة تنفيذ الخطوات السابقة مع إجراء التغييرات التالية:

- في الخطوة الثانية: وبعد اختيار متغير النوع ونقله للخانة المشار إليها بالرقم (3)، قم باختيار متغير العمر ثم نقله للخانة (3).
- في الخطوة الثالثة: قم بتعيين الاسم "مثال3" للملف الجديد واضغط حفظ (Save)، ثم اضغط موافق (OK) فيظهر ملف البيانات المطلوب كما يظهر في الشكل (8.2).



The screenshot shows the SPSS Data View window with the same dataset as Figure 7.2, but sorted by gender and age. The data rows are as follows:

	الوزن	العمر	النوع
1	10.2	4	1
2	12.0	5	1
3	15.2	6	1
4	16.4	6	1
5	14.8	6	1
6	9.5	4	2
7	13.0	5	2
8	18.9	7	2
9	20.1	8	2
10	21.6	9	2

شكل 8.2: البيانات المصنفة بحسب جنس الطالب ثم عمره، (ملف البيانات "مثال3").

¹ لاحظ هنا أن ملف البيانات "مثال2" سبقني مفتوحاً.

ولاحظ هنا الفرق في طريقة عرض البيانات في الملفين أن البيانات في الملف "مثال3" هي مرتبة بحسب جنس الطفل أولاً (ذكور ثم إناث)، ويلي ذلك الترتيب الثاني بحسب عمر الطفل تصاعدياً ضمن كل جنس، بمعنى أن أوزان الأطفال ستكون موزعة أو مصنفة إلى قسمين؛ الذكور ثم الإناث، وأوزان الذكور (المناظرة للقيمة 1 في متغير النوع) ستكون موزعة بحسب أعمارهم (بداية من 4 إلى 6 سنوات)، وأوزان الإناث أيضاً (المناظرة للقيمة 2 في متغير النوع) ستكون موزعة بحسب أعمارهن (بداية من 4 إلى 9 سنوات).

وهكذا، فإنه يمكن إعادة ترتيب أو تصنيف أي متغير أو أكثر بناء على متغير آخر أو أكثر بنفس الطريقة السابقة. ويمكن للقارئ، كتمرين إضافي، إعادة ترتيب بيانات المثال "مثال1" بحسب العمر أو الوزن فقط، أو بحسب العمر ثم الجنس، ...، وهكذا، وتسمية البيانات الجديدة بأسماء مختلفة.

4.2 حساب تكرار المشاهدات (Counting Case Occurrence)

في كثير من الدراسات التي يعتمد جمع البيانات فيها على توزيع استبيان (Questionnaire) على مجموعة من الأشخاص أو الهيئات وأخذ آراؤهم في مواضيع محددة، قد يحتاج الباحث إلى حساب (أي جمع) رأي كل مستجيب (مستهدف) لمجموعة من الأسئلة للخروج بقيمة عددية (كمية) تعكس مدى موافقة أو عدم موافقة المستجيبين على هذه الأسئلة، وفي هذه الحالة يمكن باستخدام برنامج SPSS حساب تكرار هذه الآراء وتعريفها كمتغير جديد يتم إضافته للبيانات الأصلية. وسنقوم فيما يلي بتوسيع كيفية تنفيذ هذه المهمة باستخدام مثال توضيحي.

جدول 2.2: الآراء الخاصة بعينة من الأشخاص حول استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

	إنستجرام	فايير	واتساب	فيسبوك	المستخدم
1	1م	1	1	0	0
2	2م	1	0	0	0
3	3م	0	1	0	0
4	4م	1	1	1	1
5	5م	0	0	1	0
6	6م	0	0	0	0
7	7م	1	1	1	0
8	8م	1	0	1	1
9	9م	1	0	0	1
10	10م	1	1	1	1
11	11م	1	0	1	1
12	12م	0	1	1	0

البيانات في الجدول (2.2) تمثل آراء أو أجوبة عينة مكونة من 12 شخص رداً على المطلوب التالي: "ضع إشارة (✓) أمام التطبيقات التي تستخدمها وإشارة (✗) أمام التطبيقات التي لا تستخدمها". وهذه التطبيقات هي أشهر أربعة تطبيقات في مجال التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك (Facebook)، واتساب (WhatsApp)، فايير (Viber)، وإنستجرام (Instagram). وخلال مرحلة تغريب الاستبيان، تم إدراج القيم (1، 2، ..., 12) كمتغير يمثل أسماء الأشخاص في العينة، وتم تعين القيمة 1 للإجابة بنعم (✓) وتعيين القيمة 0 للإجابة بلا (✗) وذلك لكل تطبيق من التطبيقات الأربع. فمثلاً، الشخص الأول (1) كانت إجابته بأنه يستخدم تطبيقي فيسبوك وواتساب ولا يستخدم تطبيقي فايير وإنستجرام، وهذا.


وهذا النوع من الترميز للمتغيرات يندرج تحت ما يسمى **بالمتغير الوهمي (Dummy Variable)**، والذي سنتناوله بشرح أكثر تفصيلاً في الفصل الثالث، (في البند 3.3.3 تحديداً).

قم أولاً بإدخال بيانات الجدول (2.2) في ملف بيانات جديد في SPSS باسم "تطبيقات التواصل الاجتماعي"، ثم قم بإجراء التغييرات الخاصة كما هو موضح في الشكل التالي (شكل (9.2)).

ملاحظة:

بالنسبة للمتغير الأول، "المستخدم"، قم بتغيير طبيعة المتغير (Type) إلى (String) بدلاً من (Numeric)، لكي تتمكن من إدخال أسماء المستخدمين كقيم غير عددية للمتغير.

المطلوب تنفيذه في هذا المثال هو جمع كل الإجابات بنعم لمستخدمي التطبيقات، أي تعريف متغير جديد يمثل عدد التطبيقات التي يستخدمها كل شخص من بين هذه التطبيقات الأربع، وبمعنى أبسط؛ المتغير الجديد سيكون عبارة عن حاصل جمع كل صف في الأعمدة الأربع الأخيرة.



The screenshot shows two windows of the IBM SPSS Statistics software. The top window is titled 'تطبيقات التواصل الاجتماعي.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor'. It displays a table of variables with the following data:

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	المستخدم	String	8	0	مستخدمو التطبيقات	None	None	8	Right	Nominal	Input
2	فيسبوك	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
3	واتساب	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
4	فايبر	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
5	إنستغرام	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
c											


The bottom window is titled 'sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics' and shows the data table with the following content:

	المستخدم	فيسبوك	واتساب	فايبر	إنستغرام
1	1م	1	1	0	0
2	2م	1	0	0	0
3	3م	0	1	0	0
4	4م	1	1	1	1
5	5م	0	0	1	0
6	6م	0	0	0	0
7	7م	1	1	1	0
8	8م	1	0	1	1
9	9م	1	0	0	1
10	10م	1	1	1	1
11	11م	1	0	1	1
12	12م	0	1	1	0

شكل 9.2: أسلوبي عرض المتغيرات (في الأعلى) وعرض البيانات (في الأسفل) لملف البيانات "تطبيقات التواصل الاجتماعي".

في نافذة عرض البيانات لملف "تطبيقات التواصل الاجتماعي"، قم باختيار أمر تحويل (Transform) في شريط الأوامر العلوي، ثم اختر أمر **عد القيم ضمن المشاهدات** (Count Values within Cases) من القائمة المنسدلة. فتظهر لك النافذة الخاصة بتنفيذ هذه العملية كما يُشاهد في الشكل (10.2).

في الخانة (1)، وهو مربع المتغير المستهدف (Target Variable)، يتم إدخال اسم للمتغير الجديد الذي سيتمثل تكرارات القيمة المطلوبة (وهي القيمة 1 في مثالنا)، ول يكن هذا الاسم هو "التطبيقات". وفي الخانة (2)، وهو وصف المتغير المستهدف (Target Label)، يتم كتابة وصف لما يمثله هذا المتغير الجديد، ول يكن الوصف هو "عدد التطبيقات المستخدمة".



شكل 10.2: النافذة الخاصة بتنفيذ عدد تكرارات القيم ضمن المشاهدات.

بعد ذلك، وفي الخانة (3)، يتم اختيار¹ المتغيرات التي يرغب المستخدم في جمع تكرارات قيمها، وفي مثالنا ستكون المتغيرات المطلوبة هي "فيسبوك"، "واتساب"، "فايبر"، و"إنستجرام". وبعد اختيارها، اضغط على سهم نقل المتغيرات فتنقل المتغيرات التي تم اختيارها إلى مربع المتغيرات (Variables) في الخانة (4).

المرحلة التالية ستكون تحديد القيمة المطلوب جمع تكراراتها، (وهي القيمة 1 في كل المتغيرات الأربع)، ويتم ذلك عن طريق الضغط على خيار تعريف القيم (Define Values) المشار إليه بالسهم (5). فتظهر نافذة جديدة كما يظهر في الشكل التالي، (شكل (11.2)).

ملاحظة:

بالنسبة للخيار (6)، وهو الدالة الشرطية إذا (If)، فيمكن استخدامه إذا ما أرد المستخدم وضع قيد أو شرط على عملية عد التكرارات ضمن المتغيرات بحيث يتم اعتبار أو استثناء قيمة محددة بناء على الشرط أو الشروط الموضوعة من قبل المستخدم.


¹ يمكن أن يتم اختيار كل متغير على حدة أو تضليل كل المتغيرات المطلوبة و اختيارها معاً.

في هذه النافذة الجديدة، (شكل 11.2)، يتم إدخال القيمة المطلوب عد تكراراتها في المتغيرات في الخانة (أ)، وهو مربع القيمة (Value)، وفي مثالنا سيتم إدخال القيمة 1 في هذه الخانة.

وبمجرد كتابة¹ القيمة 1، سيضاء مربع خيار إضافة (Add) المشار إليه بالسهم (ب)، قم بالضغط عليه فتنتقل القيمة 1 إلى الخانة (ج)، وهو مربع القيم التي سيتم عدّها (Values to count). قم بعدها بإنتهاء العملية عن طريق الضغط على استمرار (Continue) في أسفل النافذة.

ملاحظة:


بالنسبة لخيار (د)، وهو المدى (Range)، فيُستخدم عندما نرغب بعد تكرارات قيم تتراوح في مدى أو فترة معينة وليس عدّ قيم مفردة، فمثلاً إذا كان المطلوب هو عد تكرارات قيم من 2 إلى 4 فقط من ضمن متغيرات معينة تضم قيم من 1 إلى 5، فيتم اختيار الخيار (د) ثم كتابة 2 في الخانة الأولى التي تليه وكتابة 4 في الخانة الثانية. أما الخيارين الآخرين؛ Range, value, LOWEST through value (Range, value through HIGHEST) أو قيمة معينة فأدنى منها، على الترتيب.



شكل 11.2: النافذة الخاصة بتحديد قيم التكرارات المطلوب عدّها ضمن المشاهدات.

¹ بدون الضغط على أمر الإدخال (Enter) في لوحة المفاتيح.

بعد الضغط على استمرار (Continue) في النافذة السابقة، سيتم العودة للنافذة الأولى، (الشكل (10.2))، والتي ستبدو بالصورة التالية، (شكل (12.2)):



شكل 12.2: النافذة الخاصة بتنفيذ عدد تكرارات القيم ضمن المشاهدات بعد تطبيق الخيارات.

اضغط موافق (OK) لإنتهاء العملية بالكامل، وستلاحظ ظهور متغير جديد، هو "التطبيقات"، كما يُشاهد في الشكل (13.2)، والذي يمثل عدد التطبيقات التي يستخدمها كل شخص في عينة البيانات من بين التطبيقات الأربع. (ويمكن للقارئ تغيير عدد الخانات العشرية للمتغير الجديد إلى 0، للحصول على مظهر أفضل للبيانات).

	المستخدم	متستخدم	فيسبوك	واتساب	فايبر	إنستجرام	التطبيقات	var	var
1	1م	1	1	1	0	0	2.00		
2	2م	1	1	0	0	0	1.00		
3	3م	0	1	1	0	0	1.00		
4	4م	1	1	1	1	1	4.00		
5	5م	0	0	0	1	0	1.00		
6	6م	0	0	0	0	0	.00		
7	7م	1	1	1	1	0	3.00		
8	8م	1	0	1	1	1	3.00		
9	9م	1	0	0	0	1	2.00		
10	10م	1	1	1	1	1	4.00		
11	11م	1	0	1	1	1	3.00		
12	12م	0	1	1	0	0	2.00		

شكل 13.2: عرض بيانات ملف "تطبيقات التواصل الاجتماعي" بعد تعريف متغير "التطبيقات".

5.2 إعادة ترميز المتغيرات (Recoding Variables)

يوفر برنامج SPSS أيضاً إمكانية إعادة ترميز أو تغيير قيم متغير أو أكثر في البيانات بحسب ما تتطلبه الدراسة أو التحليل الإحصائي. ويقصد بإعادة الترميز هنا تغيير بعض أو كل قيم المتغير بشكل تلقائي وليس المقصود هو تصحيح بعض الأخطاء ضمن القيم؛


فمثلاً عند اكتشاف وجود بعض الأخطاء في إدخال قيم أحد المتغيرات التي تمثل الحالة الاجتماعية بحيث أن بعض الأشخاص قد تم تسجيل مستواهم الدراسي بأنه "ماجستير" وهو في الحقيقة "دكتوراه"، فإن هذا يستدعي تصحيح هذا الخطأ يدوياً أي تعديل القيم الخاصة بهؤلاء الأشخاص فقط، أما إذا كان المطلوب مثلاً هو تغيير قيمة المتغير الخاص بالمستوى الدراسي بحيث تتغير كل القيم المناظرة لقيمة "ماجستير" والقيمة "دكتوراه" إلى القيمة "فوق الجامعي"، فهنا يمكن استخدام خيار إعادة الترميز التلقائي.

ويمكن في برنامج SPSS تنفيذ إعادة الترميز لنفس المتغير، (أي تغيير قيم المتغير الأصلي نفسه)، أو تغيير القيم وتعريفها باسم متغير جديد. وسنبدأ بتطبيق الخيار الأول وهو تغيير قيم المتغير نفسه.

1.5.2 إعادة ترميز القيم لنفس المتغير (Recode into Same Variable)

في هذا الخيار، سيتم تغيير قيم المتغير نفسه بحيث أنه سيتم استبدال القيم الأصلية بالقيم الجديدة، لذلك لا يتم استخدام هذا الخيار إلا عند التأكد من عدم احتياجنا للقيم الأصلية للمتغير لاحقاً. وكمثال تطبيقي، لنأخذ ملف البيانات المحفوظ لدينا باسم "مثال 1".

لنفرض أننا نرغب بإعادة ترميز الذكور بالقيمة 0 بدلاً من القيمة الأصلية 1، وإعادة ترميز الإناث بالقيمة 1 بدلاً من القيمة الأصلية 2، فنقوم بالآتي؛ قم بفتح الملف "مثال 1"، ثم قم من شريط الأوامر العلوي باختيار أمر تحويل (Transform) ثم اختر إعادة ترميز في نفس المتغيرات (Recode into Same Variables).




شكل 14.2: النافذة الخاصة بإعادة الترميز في نفس المتغير للبيانات "مثال 1".

ستظهر عندها نافذة جديدة، كما يشاهد في الشكل (14.2)، قم في هذه النافذة باختيار المتغير المطلوب إعادة ترميزه، وهو متغير " النوع " في مثانا، واضغط سهم النقل لنقله إلى خانة المتغيرات المشار إليها بالرقم (2). بعد ذلك اضغط على خيار تعريف القيم القديمة والجديدة (Old and New Values) والمشار إليه بالرقم (3)، فتظهر نافذة جديدة، (الشكل (15.2))، والتي سيتم فيها إعادة ترميز القيم.

ملاحظة:

بالنسبة لخيار (4)، في الشكل (14.2)، وهو الدالة الشرطية إذا (If)، فقد سبقت الإشارة إليه حيث يمكن استخدامه في وضع قيد أو شرط على عملية تغيير القيم ضمن المتغيرات بحيث يتم اعتبار أو استثناء قيم محددة بناء على الشرط أو الشروط الموضوعة من قبل المستخدم.

حيث أن التغيير المطلوب في متغير " النوع " هو تغيير القيمة (القديمة) 1 إلى (الجديدة) 0 والقيمة (القديمة) 2 إلى (الجديدة) 1، فنقوم بإدخال القيمة 1 في خانة القيمة القديمة (Old Value) المشار إليها بـ (أ)، وإدخال القيمة 0 في خانة القيمة الجديدة (New Value) المشار إليها بـ (ب) ثم نضغط إضافة (Add) فيما إعادة الترميز كما يشاهد في الخانة (ج). وبنفس الكيفية، يتم إدخال التغيير الثاني للمتغير؛ وهو القيمة 2 في (أ) والقيمة 1 في (ب) فيظهر الترميز الجديد في الخانة (ج) أسفل الترميز السابق¹.



شكل 15.2: نافذة تعريف القيم القديمة والجديدة للمتغير في خيار إعادة الترميز في نفس المتغير.

قم بعد ذلك بالضغط على استمرار (Continue) للعودة للنافذة السابقة (الشكل (14.2))، وفيها اضغط موافق (OK) للانتهاء. وبعدها ستلاحظ تنفيذ التغيير المطلوب في قيم متغير " النوع ". إلا أنه في هذا المثال، يجب تعديل

¹ يمكن بهذه الطريقة إعادة ترميز أكثر من قيمتين لأي متغير، وأما الخيارات الأخرى التي تظهر في النافذة، فيكون لها نفس الدور كما هو موضح في الشكل السابق (11.2).


تصنيف قيم المتغير (Values) في اسلوب عرض المتغيرات بحيث تاظر الرموز الجديدة 0 و 1 التصنيف ذكر وأنثى على الترتيب. لذلك قم بتعيين القيمة 0 للتصنيف "ذكر" والقيمة 1 للتصنيف "أنثى" وقم بعدها بإلغاء (Remove) التصنيفات القديمة، ثم اضغط موافق (OK). وبهذا تكون قد نفذنا عملية إعادة ترميز القيم في نفس متغير.

2.5.2 إعادة ترميز القيم في متغير مختلف (Recode into Different Variable)

في هذه الحالة سيتم تعريف متغير جديد قيمه تمثل الترميز المطلوب الذي تم باستخدام المتغير الأصلي، بمعنى أنه سيتم تعريف متغير أو متغيرات إضافية في ملف البيانات. ويمكن استخدام ملف البيانات "مثال2" كمثال توضيحي لعملية إعادة الترميز.

لنفرض أننا نرغب بتعريف متغير جديد يمثل تصنيف لأوزان الأطفال في البيانات "مثال2"، بحيث يتم إعطاء الرمز أو القيمة 1 للأطفال الذين تقل أوزانهم عن 10 كجم، والقيمة 2 للأطفال الذين تتراوح أوزانهم ما بين 10 و 20 كجم، والقيمة 3 للأطفال الذين تزيد أوزانهم عن 20 كجم. لتنفيذ ذلك، قم أولاً بفتح ملف البيانات "مثال2"، ثم اختيار أمر تحويل (Transform) من شريط الأوامر العلوي، ثم اختر إعادة ترميز في متغير مختلف (Recode into Different Variables).


الشكل (16.2).



شكل 16.2: النافذة الخاصة بإعادة الترميز في متغير مختلف للبيانات "مثال2".

سنقوم باختيار المتغير المطلوب، وهو متغير "الوزن" من الخانة (1)، ثم نقله إلى الخانة (2) باستخدام سهم النقل. وفي الخانة (3)، سيتم اختيار الاسم المرغوب للمتغير الجديد ووصفه، ولنقم بتسمية المتغير الجديد باسم "الوزن2" وكتابة "تصنيف الوزن" في مربع الوصف (Label)، ثم نضغط على أمر تغيير (Change)، فنلاحظ عندها حدوث هذا التغيير في الخانة (2) حيث سيظهر فيها النص "الوزن --> الوزن2".

بعد ذلك سنقوم بتعريف القيم التي نود إعادة كتابتها في المتغير الجديد باستخدام قيم متغير "الوزن"، فنقوم باختيار أمر تعريف القيم القديمة والجديدة (Old and New Values) والمشار إليه بالرقم (4) في الشكل (16.2)، فتظهر نافذة جديدة كما يُرى في الشكل (17.2).



شكل 17.2: نافذة تعريف القيم القديمة والجديدة للمتغير في خيار إعادة الترميز في متغير مختلف.

في هذه النافذة، (شكل (17.2))، سنقوم بتعيين القيم 1، 2، و 3 للتصنيفات الثلاثة؛ الأطفال الذين تقل أوزانهم عن 10 كجم، الأطفال الذين تتراوح أوزانهم ما بين 10 و 20 كجم، والأطفال الذين تزيد أوزانهم عن 20 كجم على الترتيب.


لتعيين القيمة الأولى، والتي تشمل كل الأوزان التي هي أقل من 10 كجم، نحتاج لاستخدام الخيار المدى، القيمة فأقل (Range, LOWEST through value). فنكتب أولاً القيمة المحددة للتصنيف الأول وهي القيمة 1 في خانة القيمة الجديدة (New Value)، ثم نكتب القيمة 9.9، (وهي القيمة¹ الأقل من 10 كجم مباشرة في متغير الوزن)، ثم نضغط إضافة (Add). وبهذا تكون قد قمنا بتعيين القيمة الأولى وهي 1 إلى التصنيف الأول وهو الأوزان الأقل من 10 كجم. وبينما الطريقة سيتم تعيين القيم التالية للتصنيفات التالية.

لتعيين القيمة الثانية، وهي القيمة 2 للتصنيف الثاني وهو الأوزان من 10 كجم إلى 20 كجم، نكتب القيمة 2 في خانة القيمة الجديدة (New Value) ثم نضغط على الخيار المدى (Range) فتظهر خانتان فارغتان أسفل منه. يتم إدخال القيمة 10 في الخانة العليا والقيمة 20 في الخانة السفلية والضغط على (Add).

¹ ننوه هنا إلى أنه إذا ما تم كتابة القيمة 10 في خانة (Range, LOWEST through value) فإن هذا التصنيف سيشمل على الوزن 10 كجم ضمنه.

ولتعيين القيمة الثالثة، وهي القيمة 3 للتصنيف الثالث، وهم الأطفال الذين تزيد أوزانهم عن 20 كجم، نكتب القيمة 3 في خانة القيمة الجديدة (New Value) ثم نضغط على الخيار المدى، القيمة فأكبر من (Range, value) (through HIGHEST) (لأن القيمة 20.1 هي ضمن نطاق التصنيف الثاني)، ثم نضغط على إضافة. وبعد الانتهاء من تعيين كل القيم المحددة للتصنيفات السابقة نضغط على استمرار .(Continue)

ستتم العودة بعد ذلك للنافذة السابقة، (شكل (16.2))، نقوم بعدها بالضغط على (OK) في ظهر المتغير الجديد "الوزن2" في نافذة عرض البيانات في الملف "مثال2" كما هو موضح في الشكل (18.2).



	الوزن	العمر	النوع	الوزن2
1	10.2	4	1	2.00
2	12.0	5	1	2.00
3	15.2	6	1	2.00
4	16.4	6	1	2.00
5	14.8	6	1	2.00
6	9.5	4	2	1.00
7	20.1	8	2	3.00
8	18.9	7	2	2.00
9	13.0	5	2	2.00
10	21.6	9	2	3.00

شكل 18.2: عرض بيانات ملف "مثال2" بعد تعريف المتغير "الوزن2".

3.5.2 إعادة الترميز التلقائي (Automatic Recoding)

في هذا النوع من إعادة الترميز، يتم تلقائياً تعيين قيم افتراضية مناظرة لقيم المتغير الأصلية بحيث يأخذ كل تصنيف قيمة تسلسلية هي (1، 2، 3، ...). ويتم عادة استخدام هذا الأسلوب من إعادة الترميز عند الحاجة لتغيير قيم مجموعة كبيرة من المتغيرات دفعة واحدة أو الحاجة لتعريف متغير جديد يكون نسخة رقمية من المتغير الأصلي أو غير ذلك من الأسباب. ولاستخدام هذا الأسلوب، لأخذ في الاعتبار المثال التالي، (الجدول (3.2))، والذي يتكون من المتغيرين "التقدير" و"القسم" وللذان يمثلان التقدير الدراسي للطالب والقسم العلمي الذي ينتمي له لعينة من 15 طالب. قم بإدخال البيانات في برنامج SPSS في ملف جديد¹ باسم "مثال4". وسنقوم بإعادة ترميز كل من المتغيرين؛ "التقدير" و"القسم" باستخدام إعادة الترميز التلقائي.

¹ عند إدخال أسماء الأقسام للمتغير "القسم" يجب زيادة عدد الخانات في عمود العرض (Width) لتسوّغ أسماء الأقسام الطويلة، 12 كعدد خانات سيكون مناسباً).


جدول 3.2: البيانات الخاصة بملف البيانات "مثال 4".

B	C	A	B	C	C	D	A	D	C	B	B	A	B	نقطة
١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٣٠	١٤٠	١٥٠

في شريط الأوامر العلوي، قم باختيار أمر تحويل (Transform) ثم اختر إعادة الترميز التلقائي (Automatic Recode) فتظهر النافذة الخاصة بهذا الأمر كما هو موضح في الشكل (19.2) أدناه. في الخانة المشار لها بالرقم (1) سنقوم باختيار المتغير الأول الذي سيتم إعادة ترميزه تلقائياً، وهو متغير "التقدير"، ثم نقوم بنقله إلى الخانة (2) باستخدام سهم النقل. بعد ذلك نقوم في خانة الاسم الجديد (New Name) (3) بكتابة الاسم المرغوب للمتغير الجديد (الذي سيحصل على الترميز التلقائي)، ولتكن "التقدير2" ثم نضغط على أمر إضافة اسم جديد (Add New Name) فتظهر لنا في الخانة (2) العبارة؛ "التقدير --> التقدير2".

بنفس الكيفية يتم اختيار المتغير الثاني "القسم" من الخانة (1) ونقله إلى الخانة (2) وتسميتها، على سبيل المثال، "القسم2" والضغط على أمر (Add New Name) فتظهر العبارة؛ "القسم --> القسم2" في الخانة (2).

وننوه هنا إلى إمكانية اختيار الترتيب المطلوب لإعادة الترميز تصاعدياً أو تنازلياً باستخدام خيار إعادة الترميز بداية من (Recode Starting from)، حيث يستخدم خيار القيمة الأقل (Lowest value) للترتيب التصاعدي، وخيار القيمة الأكبر (Highest value) للترتيب التنازلي.



شكل 19.2: النافذة الخاصة بإعادة الترميز التلقائي لملف البيانات "مثال 4".

ملاحظة:

في نافذة إعادة الترميز التلقائي، (الشكل 19.2)، يمكن استخدام الخيار الخاص بحفظ وإعادة تطبيق نمط إعادة الترميز أي القالب (Template) الموجود في أسفل النافذة عند التعامل مع بيانات أخرى مستقبلا.

بعد الانتهاء من اختيار المتغيرات وتعريف أسماء المتغيرات الجديدة نضغط موافق (OK) ف يتم التنفيذ ويظهر المتغيران الجديدان "التقدير2" و "القسم2" في ملف البيانات "مثال4"، (الشكل 20.2)). ويمكنك رؤية نمط الترميز للمتغيرين من خلال نافذة المخرجات (Output).

ولاحظ أن ترميز المتغير "التقدير" قد تم بحيث أن قيم المتغير (A, B, C, D) تتناظر القيم (1, 2, 3, 4) في المتغير الجديد "التقدير2" على الترتيب. وأما في المتغير "القسم2"، فقد تم تعريف القيم (من 1 إلى 6) بحسب عدد الأقسام أبجديا، بداية من قسم الإحصاء ممثلاً بالقيمة 1 وانتهاء بقسم علم النبات ممثلاً بالقيمة 6.

	التقدير	القسم	التقدير2	القسم2
1	B	الإحصاء	2	1
2	A	الرياضيات	1	2
3	B	الإحصاء	2	1
4	B	الفيزياء	2	3
5	C	الكيمياء	3	4
6	D	علم النبات	4	6
7	A	الإحصاء	1	1
8	D	علم الحيوان	4	5
9	C	علم النبات	3	6
10	C	الرياضيات	3	2
11	C	الكيمياء	3	4
12	B	الإحصاء	2	1
13	A	الإحصاء	1	1
14	C	الرياضيات	3	2
15	B	الكيمياء	2	4

شكل 20.2: عرض بيانات ملف "مثال4" بعد تعريف المتغيران "التقدير2" و "القسم2".

4.5.2 تعريف دالة جديدة لمتغير (Compute Variable)


يُعد هذا الأمر في برنامج SPSS بمثابة الحالة العامة للترميز أو استخدام دوال حسابية وإحصائية في تعريف متغير جديد اعتماداً على المتغير الأصلي. واستخدام هذا الأمر يتضمن مجالات واسعة تتدرج من تعريف الدوال البسيطة، (مثل العمليات الحسابية البسيطة؛ جمع، طرح، ضرب، قسمة)، إلى تعريف الدوال الرياضية والإحصائية الأكثر تعقيداً.

و سنقوم هنا بتقديم بعض الأمثلة على استخدام هذا الأمر من خلال البيانات في الجدول التالي، (جدول (4.2))، والذي يتضمن أسعار النفط العالمية الشهرية لمزيج برنت بالدولار الأمريكي لخمسة سنوات افتراضية. و سنقوم بإدخال هذه البيانات في ملف بيانات جديد في برنامج SPSS باسم "أسعار النفط".

جدول 4.2: أسعار النفط العالمية الشهرية لمزيج برنت بالدولار الأمريكي لخمسة سنوات.

	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5
1	42	45	48	58	61
2	41	46	50	58	61
3	42	45	51	56	62
4	43	47	52	57	64
5	42	47	52	58	64
6	44	48	52	57	65
7	43	47	54	59	63
8	42	49	53	60	63
9	40	47	55	60	62
10	44	48	54	58	63
11	45	46	55	60	64
12	44	49	57	59	65

في شريط الأوامر العلوي، قم باختيار Transform>Compute Variable فتظهر نافذة حساب المتغير كما يظهر في الشكل (21.2).



شكل 21.2: نافذة تعريف دالة جديدة لمتغير، (حساب متغير)، لملف بيانات "أسعار النفط".


لنفرض الآن أننا نريد تعريف متغير جديد يمثل المجموع الشهري لأسعار النفط خلال السنوات الخمس، فنقوم في نافذة حساب المتغير بكتابة اسم المتغير الجديد، ولتكن "المجموع_الشهري"، في مربع المتغير المستهدف (Target Numeric Expression)، ثم ندخل الدالة أو العملية الحسابية المطلوبة في مربع الدالة الحسابية (Variable)، وهي مجموع القيم لكل شهر (والذي يمثله صفات المشاهدات) في المتغيرات الخمسة، وهكذا فإن العملية المطلوبة سيتم كتابتها كمجموع للمتغيرات الخمسة كما هو ظاهر في الشكل (21.2).

ويم تتفيد ذلك عن طريق اختيار المتغير الأول (السنة1) من مربع المتغيرات في يسار النافذة ونقله بالسهم إلى مربع الدالة الحسابية ثم الضغط على إشارة الجمع (+) في لوحة المفاتيح في وسط النافذة، ثم اختيار المتغير الثاني (السنة2) ونقله إلى مربع الدالة الحسابية ثم الضغط على إشارة الجمع وهكذا حتى اختيار المتغير الخامس (السنة5). بعد ذلك نضغط موافق (OK) للتنفيذ، وفي ملف البيانات الحالي، "أسعار النفط"، سيظهر المتغير الجديد باسم "المجموع_الشهري".

كمثال آخر، لنفرض أن الأسعار في السنة الخامسة كان بها خطأ في الرصد حيث أنها كانت أعلى من القيمة الصحيحة بمقدار دولارين، ونريد الآن تصحيح هذا الخطأ عن طريق تعريف متغير جديد. لذلك نقوم في نافذة حساب المتغير بكتابة اسم المتغير الجديد، ولتكن "السنة5_مصحح"، في مربع المتغير المستهدف ثم نقوم باختيار المتغير الذي سيتم التعامل معه، وهو "السنة5" من مربع المتغيرات ونقله إلى مربع الدالة الحسابية ثم نختار إشارة الطرح (-) في لوحة المفاتيح في وسط النافذة ونكتب القيمة 2 بعدها، ثم نضغط موافق فتحصل على المتغير الجديد المطلوب.

ويمكن استخدام بعض الدوال الإحصائية في تعريف متغير جديد، فمثلاً إذا ما أردنا حساب متغير جديد يمثل قيمة الوسيط (Median) لأسعار النفط الشهرية، (أي حساب الوسيط لأسعار النفط لكل شهر من أشهر السنة على مدى السنوات الخمسة)، فإننا نقوم بالآتي؛ في نافذة حساب المتغير بكتابة اسم المتغير الجديد، ولتكن "الوسيط_لسعر_الشهري"، في مربع المتغير المستهدف ثم نقوم باختيار الدوال الإحصائية (Statistical) من مربع مجموعات الدوال (Function group) في يمين النافذة، فتظهر قائمة بالدوال الإحصائية المتوفرة في مربع الدوال والمتغيرات الخاصة (Functions and Special Variables) (Median) أسفل منها. قم باختيار دالة الوسيط (Median) من بين تلك الدوال عن طريق النقر المزدوج عليها، (أو سحبها بالفأرة إلى المربع المرغوب).

عندما ستظهر دالة الوسيط في مربع الدالة الحسابية مع علامتي استفهام، قم بإلغاء الأقواس وعلامة الاستفهام ثم قم بفتح قوس جديد وإنقل المتغيرات "السنة1"، "السنة2"، "السنة3"، "السنة4"، و"السنة5_مصحح" بعد القوس المفتوح مع مراعاة تغيير لغة لوحة المفاتيح في جهازك إلى اللغة الإنجليزية وإدخال فواصل بين المتغيرات، ثم إغلاق القوس بعد ذلك، كما يوضح الشكل (22.2) لنافذة حساب المتغير. بعد ذلك اضغط موافق للتنفيذ.



شكل 22.2: حساب الوسيط الشهري في نافذة تعريف دالة جديدة لمتغير، لملف بيانات "أسعار النفط".

وبالتالي سيحتوي ملف بيانات "أسعار النفط" على المتغيرات التي تظهر في الشكل (23.2).

	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5	السنة 5 مجموع الشهري	السنة 5 مصحح	الوسيط_للسعر_الشهري
1	42	45	48	58	61	254	59	48
2	41	46	50	58	61	256	59	50
3	42	45	51	56	62	256	60	51
4	43	47	52	57	64	263	62	52
5	42	47	52	58	64	263	62	52
6	44	48	52	57	65	266	63	52
7	43	47	54	59	63	266	61	54
8	42	49	53	60	63	267	61	53
9	40	47	55	60	62	264	60	55
10	44	48	54	58	63	267	61	54
11	45	46	55	60	64	270	62	55
12	44	49	57	59	65	274	63	57

شكل 23.2: ملف بيانات "أسعار النفط" بعد تعريف المتغيرات الجديدة.

وهكذا، وكما ذكرنا أعلاه، يمكن استخدام أمر تعريف دالة جديدة لمتغير (Compute Variable) بطرق عديدة يمكن أن تكون مفيدة جداً أثناء إجراء التحليل الإحصائي للبيانات.

5.5.2 الترتيب في مجموعات (Binning)

هذه الطريقة من إعادة الترميز للمتغيرات تشبه إعادة الترميز في متغير مختلف الذي تناولناه سابقاً، إلا أنها تقوم "بقراءة" قيم مشاهدات المتغير وتعطي الخيار للمستخدم بأن يحدد المجموعات أو الفترات التي يرغب بتصنيف المتغير الأصلي اعتماداً عليها يدوياً أو تلقائياً.

جدول 5.2: البيانات الخاصة بمرتبات وعلاوات وخصومات الموظفين بالدينار الليبي. (المثال 5).


الموظف	المرتبات	العلاوات	الخصومات
1	480.500	120.050	25.000
2	635.700	165.500	70.750
3	390.550	95.050	15.500
4	345.590	85.000	12.750
5	730.600	170.750	75.750
6	980.050	185.500	90.000
7	1060.750	190.750	95.500
8	510.650	155.500	60.500
9	1150.500	195.750	100.500
10	560.400	160.750	65.000
11	490.900	110.050	20.500
12	870.750	180.000	85.750
13	910.950	190.500	95.000

في الجدول التالي، (جدول (5.2))، لدينا بيانات خاصة بعدد من موظفي إحدى الشركات وهي عبارة عن ثلاثة متغيرات هي مرتب الموظف والعلاوة والخسم السنوي بالدينار الليبي. قم أولاً بإدخال هذه البيانات في ملف في SPSS وحفظها باسم "مثال 5".

ولنفرض أننا نريد إعادة ترميز المتغير "المرتبات" إلى خمسة مجموعات أو فترات بحسب مقدار المرتب وهي (أقل من 400)، (401-600)، (601-800)، (800-1000)، وأكثر من 1000 وذلك باستخدام طريقة الترتيب في


مجموعات فنقوم بالآتي؛

في شريط الأوامر العلوي قم باختيار أمر تحويل (Transform) في مجموعات (المئوي) (Visual Binning). ستظهر عندها النافذة الخاصة بتحديد المتغير المطلوب إعادة ترميزه، (كما يشاهد في شكل 24.2)، وهو في مثلك "المرتبات" فنقوم باختياره والضغط على سهم النقل، ثم استمرار (Continue).



شكل 24.2: النافذة الخاصة بتحديد المتغير المطلوب إعادة ترميزه باستخدام طريقة الترتيب في مجموعات لملف البيانات "مثال 5".

بعد ذلك ستظهر لنا نافذة أخرى، (كما يظهر في الشكل (25.2))، والتي سيتم من خلالها تعريف المجموعات المرغوب تكوينها من المتغير الأصلي.



شكل 25.2: نافذة تعريف المجموعات للمتغير "المرتبات" في الملف "مثال5".

وبعد ستظهر ستظهر نافذة صغيرة للتأكد على أنه سيتم تكوين متغير واحد جديد، قم بالضغط على موافق (OK) في ظهر المتغير الجديد "المرتبات2" في ملف البيانات "مثال5" والذي يأخذ القيم من 1 إلى 5 والتي ترمز للمجموعة أو الفترة المنشورة. لاحظ أنه إذا ما تم استخدام أيقونة عرض وصف المتغير

من شريط الأيقونات العلوي فسيظهر في عمود المتغير الجديد وصف المجموعات التي تم تسميتها (بداية من "أقل من 400" إلى "أكثر من 1000").

الفصل الثالث

التحليل الاستكشافي للبيانات في SPSS (Exploratory Data Analysis (EDA) in SPSS)

في هذا الفصل، سيتم تناول المقاييس والطرق الإحصائية المختلفة¹ وتوضيح كيفية استخدامها في برنامج SPSS. هذه المقاييس، التي تدرج تحت مسمى الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics) مصحوبة ببعض التقديرات الاستدلالية البسيطة تُعرف حديثاً بالتحليل الاستكشافي للبيانات (Exploratory Data Analysis (EDA))، وتعُد المدخل الرئيسي لبوابة علم الإحصاء التطبيقي، حيث أنها توفر للباحث أو المستخدم للأساليب الإحصائية المعلومات الأولية التي تمكنه من استكشاف ما تمثله أو تصفه البيانات. وللوصول للاستخدام الأمثل لهذه المقاييس الإحصائية، لابد للقارئ أولاً من التعرف على أنواع البيانات الأساسية المستخدمة في التحليل الإحصائي.

1.3 أنواع البيانات (Data Types)

تمثل البيانات (Data) المادة الخام التي تزودنا بالمعلومات حول المجتمع الذي جمعت منه بعد استخدام الأسلوب أو الأساليب الإحصائية المناسبة. ونقصد بالمجتمع هنا المصدر الذي تم جمع² البيانات منه. لهذا، فإن مرحلة التعرف على البيانات هي مصدرها تعد من المراحل الهامة في التحليل الإحصائي الصحيح.

إن لفظ "بيانات" كثيراً ما يظهر في الكتب والمنشورات ووسائل الإعلام والمعاملات اليومية في العموم، وهو مصطلح من شامل، فالبيانات الشخصية التي تضم الاسم، العمر، النوع، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، وغيرها هي نوع من البيانات، والتاريخ الطبي للمريض والذي يضم القراءات الخاصة به مثل الوزن، نسبة السكر، ضغط الدم، درجات الحرارة المسجلة، وغيرها هي بيانات، وكذلك المشاهدات الناتجة عن تجربة كيميائية لقياس التفاعل الناتج عن دمج بعض المحاليل هي أيضاً بيانات. ولذلك فإنه يمكن القول بأن أي ظاهرة أو دراسة أو تجربة أو مراقبة لسير عملية معينة يمكن أن ينتج عنها جمِيعاً بيانات، فالبيانات هي المقاييس الفعلية التي يصف أو يعبر عما حدث في المجتمع أو الظاهرة.

¹ باعتبار أن القارئ مُلم بالحد الأدنى للمفاهيم والطرق الإحصائية الأساسية لكل من الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics) والإحصاء الاستدلالي (Inferential Statistics).

² نشير هنا إلى أن معظم النظريات الإحصائية تعامل مع البيانات على أنها عينة (Sample) أو عينات قد سُحبَت من مجتمع (Population) أو مجتمعات محددة باستخدام أساليب متعددة من المعاينة العشوائية (Random Sampling).

وفي كثير من الأحيان، قد يخلط البعض بين مفهوم "البيانات" ومفهوم "المعلومات"، وهما في الواقع مختلفان على الأقل من وجهة النظر الإحصائية، فعلم الإحصاء (في أبسط صوره) يتعامل مع البيانات كما أسلفنا على أنها المادة الخام التي ستصنف و/أو تحلل الظاهرة المدرستة، كما نرى في المثال التوضيحي الذي سنعرضه في الخطوات التسلسلية التالية:

1. لدينا بيانات؛ (درجات مجموعة من الطلبة (من 100 درجة) في مقرر اللغة العربية: 33، 42، 59، 61، ...، 25).
2. نستخدم الإحصاء الاستكشافي (مثلا: معدل الطلبة أو الوسيط يساوي 54 درجة).
3. حصلنا على معلومات؛ (مستوى الطلبة في مقرر اللغة العربية يعتبر ضعيفاً).
4. يمكن طرح التساؤل: ما هي الأسباب؟
5. يمكن جمع المزيد من البيانات واستخدام الإحصاء التحليلي الاستدلالي للحصول على معلومات إضافية وتقسيم ظاهرة ضعف الطلبة في هذا المقرر.

والبيانات الإحصائية، عادة ما تأخذ شكلًا محدداً يتكون من جدول (مكون من صفوف وأعمدة) بحيث تكون **المشاهدات (Observations)** هي مكونات الصفوف، وال**المتغيرات (Variables)** هي مكونات الأعمدة. والمتغير في جدول البيانات يشير إلى الصفة المميزة لشيء يمكن التعبير عنه بصورة كمية أو وصفية، فأي تجربة أو ظاهرة يمكن قياسها بوحدة قياس معرفة أو تصنيفها (إلى مستويات محددة مسبقاً) يمكن أن يعبر عنها بمتغير؛ فالطول (بالسنتيمتر أو القدم) لمجموعة من الأشخاص هو متغير، وال عمر الاستهلاكي (بالأشهر أو السنوات) لجهاز كهربائي هو متغير، وتقييمات الطلبة (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، راسب) تمثل أيضًا متغير.

وباستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، يتم التعامل مع هذه البيانات بصورة استكشافية أو تحليلية (استدلالية) بغية الحصول على المعلومات المطلوبة بلغة الأرقام (المقاييس) أو بالرسومات التوضيحية. وطرق التعامل الإحصائي مع البيانات واستخلاص المعلومات المباشرة وغير المباشرة منها يعتمد على طبيعة ونوع تلك البيانات، وينبغي على الباحث مراعاة تلك الطبيعة جيداً بهدف تحديد الأسلوب الإحصائي المناسب للتعامل معها. ويمكن من حيث الطبيعة أن نقسم أنواع البيانات (أي المتغيرات) إلى نوعين رئيسيين هما: البيانات الكمية¹ (Qualitative Data) والبيانات النوعية أو الوصفية (Quantitative Data)، والتي قد تسمى أيضًا بالبيانات القطاعية أو التصنيفية (Categorical Data).

¹ يقصد بالبيانات أو المتغيرات الكمية تلك التي يمكن قياسها بوحدة قياس معرفة، (مثل العمر، الوزن، الزمن، السعر، درجة الحرارة، نسب النجاح، ...)، ويفضل استخدام مصطلح متغيرات كمية عن متغيرات رقمية لأن المتغيرات الوصفية التي لا يمكن قياسها بوحدات قياس، (مثل الجنس، اللون، آراء الناس، المشاعر الإنسانية، التقديرات الدراسية، ...)، يمكن التعبير عنها بقيم رقمية أيضًا كما وضمنا في الفصل الأول، إلا أن ذلك لا يعني أنها أصبحت متغيرات كمية.

فالبيانات الكمية هي تلك البيانات التي تحتوي على مشاهدات تم قياسها ورصدها مباشرة بصورة قيم لها وحدة قياس كمية، مثل درجات الطلبة من 100 درجة، وأسعار النفط بالدولار، والمدة الزمنية المستغرقة لرحلة جوية بالساعات، وغيرها. وهذا النوع من البيانات تمثله متغيرات يمكن التعامل معها بواسطة العمليات الحسابية مباشرة.

أما البيانات التي يتم التعبير عنها بصفات أو تصنيفات، مثل النوع (ذكر، أنثى)، أو حالة الطقس المتوقعة (صحو، غائم، ممطر، ...)، أو رأي الجمهور في برنامج تلفزيوني معين (جيد، لا يأس به، سيئ)، فهذه البيانات تسمى بيانات نوعية أو قطاعية حيث أنها تأخذ قيمًا تحدد تصنيف المشاهدة إلى نوع أو قطاع محدد ولا يتم التعامل معها إحصائيًا بالعمليات الحسابية المباشرة حتى وإن تم إعطاء هذه الصفات أو التصنيفات رموزًا رقمية.

ويمكن تقسيم البيانات الكمية من حيث المقياس إلى نوعين أساسين هما:

1. **المقياس الفئوي (Interval Scale):** وهو الذي يسمح بترتيب المشاهدات على مقياس محدد بحيث يمكن تحديد القيمة الفعلية لكل مشاهدة، بدون اعتبار الصفر قيمة. ومن الأمثلة على هذا النوع من البيانات قياس درجة الحرارة عددياً أو قياس بعض الفترات الزمنية.

2. **المقياس النسبي (Ratio Scale):** وهو مشابه للمقياس الفئوي إلا أنه يعتبر الصفر من ضمن درجات القياس، لذلك فإنه في هذا المقياس يمكن حساب النسبة¹ بين قيمتين ضمن المفردات. وهذا النوع من المقاييس يكون شاملًا للعديد من أنواع البيانات الكمية مثل السعر والوزن والطول والزمن وغيرها.

ملاحظة:

يمكن تقسيم المتغيرات الكمية من حيث طبيعة الأرقام إلى متغيرات منفصلة (Discrete)، ومتغيرات متصلة (Continuous). فالمتغيرات الكمية المنفصلة تأخذ قيمًا في مجموعات أعداد منتهية أو غير منتهية وقابلة للعد، مثل الأعداد الصحيحة (Integers). أما المتغيرات الكمية المتصلة فهي تأخذ قيمًا ضمن فترة من الأعداد، وتشمل مجموعة الأعداد الحقيقة (Real Numbers).

أما البيانات أو المتغيرات الوصفية فتقسم إلى نوعين هما:

1. **المقياس الاسمي (Nominal Scale):** وهو يمثل تصنيف المشاهدات إلى مستويات أو قطاعات مختلفة، إلا أنه لا يمكن تحديد القيمة الفعلية لكل مستوى، ولا حتى ترتيب هذه المستويات بشكل تصاعدي أو تنازلي. فمثلاً، لا يمكن القول أن الإجابة "نعم" هي أفضل من الإجابة "لا" فيما يتعلق بسؤال معين. ومن أمثلة هذا النوع من البيانات نوع الشخص (ذكر، أنثى)، وأسماء الأشياء والألوان وما شابه ذلك.

¹ كأن نقول مثلاً أن طفلاً عمره 10 سنوات هو أكبر بمرتين من طفل عمره 5 سنوات.

2. **المقياس الترتيبية أو الرتبية (Ordinal Scale):** وهو على عكس النوع السابق، فطبيعته تسمح بترتيب المشاهدات وفق تدرج محدد من الأقل قيمة إلى الأكثر قيمة أو العكس، مثل تقديرات الطلبة (ممتاز، جيد جداً، جيد، ...)، إلا أنه لا يمكن حساب الفرق في القيمة بين أي مستويين من المستويات المرتبة.

وسواء كانت البيانات كمية أو وصفية أو مزيج بين الاثنين، فإنه يمكن التعامل معها من زاوية إحصائية بشكل مفرد، أي التعامل مع متغير واحد، وهو ما يُعرف بالتحليل الأحادي (Univariate Analysis)، أو التعامل مع عدة متغيرات في آن واحد، وهو ما يُعرف بالتحليل المتعدد¹ (Multivariate Analysis). والأساليب الإحصائية التي تُستخدم في التحليل الأحادي تعني أنه سيتم حساب تلك المقياسات لكل متغير على حدة، حتى وإن كانت مجموعة أو قاعدة البيانات مكونة من متغيرات عديدة.

ومثال على ذلك؛ بافتراض وجود بيانات بها ثلاثة متغيرات تمثل درجات طلبة في ثلاثة كليات مختلفة، فإنه إذا ما تم التعامل، (أي استخدام الأساليب الإحصائية)، مع درجات الطلبة لأي متغير بمفرده فإن ذلك يكون ضمن إطار التعامل مع التحليل الأحادي حتى وإن تم تنفيذ ذلك لكل المتغيرات. أما إذا ما تم استخدام أسلوب أو أساليب إحصائية تحتوي على صيغ تتعامل مع متغيرين² أو أكثر في نفس الوقت فإن ذلك يُسمى تحليل ثانوي، (في حالة استخدام متغيرين)، أو تحليل متعدد إذا ما تم إدراج أكثر من متغيرين في التحليل الإحصائي. وفيما يلي، سنقوم بإفاد مساحة لتوضيح كيفية تنفيذ تحليل البيانات الاستكشافي الأحادي والمتعدد باستخدام برنامج SPSS.

2.3 التحليل الاستكشافي الأحادي (Univariate EDA)

في معظم، إن لم يكن كل، الدراسات الإحصائية التي تتعلق بتحليل البيانات أو الدراسات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الطبية أو غيرها، والتي تشتمل على جانب يستخدم فيه التحليل الإحصائي للبيانات، يفضل عادة استخدام ما يُعرف بالتحليل الاستكشافي للبيانات للتعرف على **توزيع البيانات (Data Distribution)** وفحصها وذلك لعدة أسباب ذكر منها ما يلي:

1. كشف المشاكل والأخطاء التي قد توجد ضمن البيانات مثل **المشاهدات المتطرفة (Outliers)**، ابتعاد توزيع المتغيرات الكمية عن التوزيع الطبيعي، وجود أخطاء في ترميز البيانات، وجود قيم مفقودة (Missing Values)، وجود أخطاء في إدخال البيانات، وغيرها من المشاكل التي قد تتسبب في حصول الباحث على نتائج خاطئة أو مضللة.

¹ وتوجد حالة خاصة من التحليل المتعدد هو **التحليل الثنائي (Bivariate Analysis)**.

² من أشهر الأساليب الإحصائية التي تتعامل مع متغيرين أو أكثر في آن واحد هي مقاييس التغير والارتباط كما سنوضح لاحقاً.

2. التأكيد من مدى تبعية أو ملائمة البيانات للفرضيات التي قد يعتمد عليها استخدام معظم طرق التحليل الإحصائي الاستدلالي¹.

3. الحصول على معلومات أولية من البيانات تُعطي الباحث انطباعاً عما تمثله الظاهرة محل الدراسة والنمط أو السلوك الذي تسلكه البيانات.

4. التعرّف على العلاقات البسيطة، إن وُجدت، بين متغيرات الدراسة وذلك لبناء النموذج أو النماذج الأفضل ملائمة لتمثيل تلك العلاقات بحسب ما تتطلبه الدراسة أو مشكلة البحث.

ويعتمد التحليل الاستكشافي للبيانات على استخدام التمثيل البياني الإحصائي للبيانات (مثل المدرج التكراري، وشكل الصندوق، والأعمدة البيانية، ...، وغيرها)، إضافة لاستخدام مقاييس النزعة المركزية (ومن أهمها الوسط، والوسط، والريعيات، ...، وغيرها)، ومقاييس التشتت (ومن أهمها الانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف، ...، وغيرها)، إضافة لاستخدام مقاييس الارتباط بين المتغيرات.

وتجرد الإشارة هنا إلى ضرورة استخدام التحليل الاستكشافي للبيانات عند التعامل مع البيانات في أية دراسة أو مشكلة بحث حتى وإن لم يكن ذلك التحليل مطلوباً بحد ذاته، وذلك لاستكشاف سلوك هذه البيانات من جهة، واستكشاف الأخطاء أو العيوب التي قد تتعرض لها البيانات وإصلاحها إن وجدت من جهة أخرى.

وفيمما يلي، سنقوم بتناول كيفية تطبيق التحليل الاستكشافي للمتغيرات الوصفية أولاً يليها المتغيرات الكمية؛

3.3 التحليل الاستكشافي للمتغيرات الوصفية (EDA for Categorical Variables)

كما تمت الإشارة في البند (1.3) الخاص بتعريف أنواع البيانات، فقد تم توضيح أن المتغيرات الوصفية تكون عادة اسمية أو رتبية، ويتم عادة استخدام أشكال محددة من التمثيل البياني، أهمها الأعمدة البيانية والقطعات البيانية، إضافة لمقاييس محدودة، مثل النسبة والمنوال، وذلك لاستكشاف سلوك هذه الأنواع من المتغيرات. إلا أنه تجرد الإشارة هنا إلى أن بعض الإحصائيين يميلون للتعامل مع المتغيرات الوصفية الرتبية التي تأخذ خمسة مستويات أو أكثر على أنها متغيرات شبه كمية، أي أنه يمكن استخدام المقاييس الكمية لدراسة سلوكها.

عند بدء التعامل مع المتغيرات الوصفية، نقوم عادة بتلخيصها فيما يعرف بجدول التوزيع التكراري (Frequency Distribution Table)، وهو يشبه إلى حد ما جدول التوزيع التكراري المعروف للمتغيرات الكمية حيث يتم تكوين فترات لقيم المتغير الكمي وحساب التكرارات لها، أما في حال المتغير الوصفي فإنه يتم حساب التكرارات لكل

¹ معظم الأساليب الإحصائية التقليدية التي تعتمد على تقدير المعالم أو ما يعرف بالتقدير المعلمي (Parametric Estimation) تضع قيوداً أو فرضيات صارمة تشرط توفرها في البيانات المستخدمة في تنفيذ هذه الأساليب مثل كونها بيانات كمية لها وحدة قياس معروفة، أو أنها تتبع توزيعاً احتمالياً محدداً مثل التوزيع الطبيعي، أو أن تكون متغيرات الدراسة مستقلة، أو غير ذلك من الفرضيات. أما الأساليب التي تعتمد على التقدير غير المعلمي (Non-Parametric Estimation) فعادةً ما تكون قيودها أقل.


تصنيف من التصنيفات التي يأخذها هذا المتغير. ويجب الإشارة هنا إلى أن برنامج SPSS يقوم بتكوين جدول توزيع تكراري للمتغيرات عن طريق حساب التكرار لكل "قيمة" من قيم المتغير الذي يتم تعريفه بغض النظر ما إذا كانت هذه القيم كمية أو وصفية. وبالتالي، قد لا يكون من الملامن تكوين هذه الجداول للمتغيرات الكمية التي تحتوي على قيم كثيرة الاختلاف فيما بينها؛ (فمثلاً، المتغير الكمي الذي يمثل درجات طلبة من 100 درجة قد يكون له جدول توزيع تكراري يضم 101 تكرار مناظر لقيم المتغير على اعتبار أن الدرجات قد تتراوح من 0 إلى 100 درجة للطلاب، ومثل هذه الجداول قد لا يكون تلخيصاً جيداً لهذا المتغير).

1.3.3 التوزيع التكراري للمتغيرات الوصفية (Frequency Distribution for Categorical Variables)

سنقوم الآن باستخدام ملف بيانات متوفّر ضمن قاعدة البيانات المدرجة في برنامج SPSS، لتوضيح كيفية تكوين جدول التوزيع التكراري. ولفتح هذه الملفات، نقوم بالضغط على أمر ملف (File) في سطر الأوامر العلوي ثم نختار فتح (Open) ثم بيانات (Data)، فتظهر النافذة الخاصة بفتح البيانات. نقوم باختيار المجلد¹ التالي عن طريق اختيار المجلدات التسلسليّة المُتضمنة الواحد تلو الآخر؛

Program Files>IBM>SPSS>Statistics>23>Samples>English

فحصل على ملفات قاعدة البيانات في برنامج SPSS كما يظهر في الشكل (1.3). وسنقوم باختيار ملف البيانات المسمى "car_insurance_claims.sav" كما هو موضح في نفس النافذة.



شكل 1.3: نافذة ملفات قاعدة البيانات في SPSS.

¹ مجلد Program Files يكون في معظم أنظمة ويندوز ضمن المسار الأساسي وهو المسار (C:).

بعد فتح الملف، ستلاحظ أن البيانات تحتوي على خمسة متغيرات، (شكل (2.3))، تخص بيانات حول 128 شخصاً في إحدى شركات التأمين على السيارات.

	holderage	vehiclegroup	vehicleage	claimamt	nclaims	va
1	17-20	A	0-3	289	8	
2	17-20	A	4-7	282	8	
3	17-20	A	8-9	133	4	
4	17-20	A	10+	160	1	
5	17-20	B	0-3	372	10	
6	17-20	B	4-7	249	28	
7	17-20	B	8-9	288	1	
8	17-20	B	10+	11	1	
9	17-20	C	0-3	189	9	
10	17-20	C	4-7	288	13	
11	17-20	C	8-9	179	1	
12	17-20	C	10+	.	0	
13	17-20	D	0-3	763	3	
14	17-20	D	4-7	850	2	
15	17-20	D	8-9	.	0	
16	17-20	D	10+	.	0	
17	21-24	A	0-3	302	18	
18	21-24	A	4-7	194	31	


شكل 2.3: نافذة ملف البيانات "car_insurance_claims.sav" في برنامج SPSS

وهذه المتغيرات معرفة كالتالي؛

- :holderage عمر المؤمن على السيارة بالسنوات، ضمن الفئات العمرية؛ (17-20)، (20-21)، ...، (24-21)، ...، (60) فأكثر).
- :vehiclegroup فئة تصنيف السيارة، من ضمن الفئات؛ A، B، C، و D.
- :vehicleage عمر السيارة بالسنوات، من ضمن الفئات العمرية؛ (0-3)، (3-6)، (6-9)، (9-12)، (12-15)، (15-18)، (18-21)، (21-24)، (24-27)، (27-30)، (30-33)، (33-36)، (36-39)، (39-42)، (42-45)، (45-48)، (48-51)، (51-54)، (54-57)، (57-60)، (60-63)، (63-66)، (66-69)، (69-72)، (72-75)، (75-78)، (78-81)، (81-84)، (84-87)، (87-90)، (90-93)، (93-96)، (96-99)، (99-102)، (102-105)، (105-108)، (108-111)، (111-114)، (114-117)، (117-120)، (120-123)، (123-126)، (126-129)، (129-132)، (132-135)، (135-138)، (138-141)، (141-144)، (144-147)، (147-150)، (150-153)، (153-156)، (156-159)، (159-162)، (162-165)، (165-168)، (168-171)، (171-174)، (174-177)، (177-180)، (180-183)، (183-186)، (186-189)، (189-192)، (192-195)، (195-198)، (198-201)، (201-204)، (204-207)، (207-210)، (210-213)، (213-216)، (216-219)، (219-222)، (222-225)، (225-228)، (228-231)، (231-234)، (234-237)، (237-240)، (240-243)، (243-246)، (246-249)، (249-252)، (252-255)، (255-258)، (258-261)، (261-264)، (264-267)، (267-270)، (270-273)، (273-276)، (276-279)، (279-282)، (282-285)، (285-288)، (288-291)، (291-294)، (294-297)، (297-300)، (300-303)، (303-306)، (306-309)، (309-312)، (312-315)، (315-318)، (318-321)، (321-324)، (324-327)، (327-330)، (330-333)، (333-336)، (336-339)، (339-342)، (342-345)، (345-348)، (348-351)، (351-354)، (354-357)، (357-360)، (360-363)، (363-366)، (366-369)، (369-372)، (372-375)، (375-378)، (378-381)، (381-384)، (384-387)، (387-390)، (390-393)، (393-396)، (396-399)، (399-402)، (402-405)، (405-408)، (408-411)، (411-414)، (414-417)، (417-420)، (420-423)، (423-426)، (426-429)، (429-432)، (432-435)، (435-438)، (438-441)، (441-444)، (444-447)، (447-450)، (450-453)، (453-456)، (456-459)، (459-462)، (462-465)، (465-468)، (468-471)، (471-474)، (474-477)، (477-480)، (480-483)، (483-486)، (486-489)، (489-492)، (492-495)، (495-498)، (498-501)، (501-504)، (504-507)، (507-510)، (510-513)، (513-516)، (516-519)، (519-522)، (522-525)، (525-528)، (528-531)، (531-534)، (534-537)، (537-540)، (540-543)، (543-546)، (546-549)، (549-552)، (552-555)، (555-558)، (558-561)، (561-564)، (564-567)، (567-570)، (570-573)، (573-576)، (576-579)، (579-582)، (582-585)، (585-588)، (588-591)، (591-594)، (594-597)، (597-599)، (599-602)، (602-605)، (605-608)، (608-611)، (611-614)، (614-617)، (617-620)، (620-623)، (623-626)، (626-629)، (629-632)، (632-635)، (635-638)، (638-641)، (641-644)، (644-647)، (647-650)، (650-653)، (653-656)، (656-659)، (659-662)، (662-665)، (665-668)، (668-671)، (671-674)، (674-677)، (677-680)، (680-683)، (683-686)، (686-689)، (689-692)، (692-695)، (695-698)، (698-701)، (701-704)، (704-707)، (707-710)، (710-713)، (713-716)، (716-719)، (719-722)، (722-725)، (725-728)، (728-731)، (731-734)، (734-737)، (737-740)، (740-743)، (743-746)، (746-749)، (749-752)، (752-755)، (755-758)، (758-761)، (761-764)، (764-767)، (767-770)، (770-773)، (773-776)، (776-779)، (779-782)، (782-785)، (785-788)، (788-791)، (791-794)، (794-797)، (797-799)، (799-802)، (802-805)، (805-808)، (808-811)، (811-814)، (814-817)، (817-820)، (820-823)، (823-826)، (826-829)، (829-832)، (832-835)، (835-838)، (838-841)، (841-844)، (844-847)، (847-850)، (850-853)، (853-856)، (856-859)، (859-862)، (862-865)، (865-868)، (868-871)، (871-874)، (874-877)، (877-880)، (880-883)، (883-886)، (886-889)، (889-892)، (892-895)، (895-898)، (898-901)، (901-904)، (904-907)، (907-910)، (910-913)، (913-916)، (916-919)، (919-922)، (922-925)، (925-928)، (928-931)، (931-934)، (934-937)، (937-940)، (940-943)، (943-946)، (946-949)، (949-952)، (952-955)، (955-958)، (958-961)، (961-964)، (964-967)، (967-970)، (970-973)، (973-976)، (976-979)، (979-982)، (982-985)، (985-988)، (988-991)، (991-994)، (994-997)، (997-999)، (999-1000).
- :claimamt معدل قيمة التأمين المدفوعة من قبل الشركة بالدولار.
- :nclaims عدد مبالغ التأمين المدفوعة.

لاحظ أن المتغيرين الأول والثالث هما متغيران وصفيان رباعيان، والمتغير الثاني هو متغير وصفي اسمي، أما المتغيران الآخرين فهما كميان. وسنقوم الآن بتكوين جداول التوزيع التكراري للمتغيرات الثلاثة الأولى (الوصفية) على النحو التالي؛

نقوم من شريط الأوامر العلوي باختيار (Analyze> Descriptive Statistics> Frequencies)، فتظهر النافذة الخاصة بتنفيذ الجداول التكرارية فنقوم باختيار المتغيرات الثلاثة الأولى كما يظهر في الشكل (3.3). وفي يمين هذه النافذة، نلاحظ وجود بعض الخيارات الفرعية التي يمكن للمستخدم استخدامها للحصول على نتائج إضافية قد يرغب بها، وسنقوم هنا بالطرق لخيار الثاني وهو الرسم البياني (Charts)، وأما الخيار الأول فهو خاص بطلب حساب بعض المقاييس الإحصائية (مثل الوسط الحسابي والوسيط والريءات والانحراف المعياري وغيرها من مقاييس النزعة المركزية والتشتت)، وسيتم تناول استخدام هذه المقاييس لاحقاً بصورة أكثر تعمقاً¹ في هذا الفصل.




شكل 3.3: نافذة تنفيذ أمر تكرارات (Frequencies) لملف البيانات

. "car_insurance_claims.sav"

الآن إذا ما ضغطنا على أمر موافق (OK) في هذه النافذة فسنحصل على جداول التوزيع التكراري لكل متغير، إلا أننا في هذا المثال سنقوم باختيار تنفيذ الرسم البياني للمتغيرات للحصول على توضيح "مرئي" لتوزيع المتغيرات، أي الحصول على تمثيل بياني لما تمثله جداول التوزيع التكراري.

بالضغط على خيار الرسم البياني (Charts) في النافذة الحالية (شكل (3.3)) ستظهر نافذة فرعية كما يوضح الشكل (4.3) تشمل على ثلاثة أنواع من الرسم هي الأعمدة البيانية (Bar Charts)، القطاعات البيانية (Pie Charts)، والمدرجات التكرارية (Histograms). وسنقوم باختيار رسم القطاعات البيانية لتمثيل المتغيرات في مثالنا.

¹ بالنسبة لخيارات الثلاثة المتبقية في يمين الشكل (3.3)، فالخياران الثالث والرابع هما للحصول على النتائج المطلوبة بترتيبات معينة وأما الخيار الخامس فهو خاص بتطبيق أسلوب إعادة المعاينة أو البوتستрап (Bootstrap).



شكل 4.3: نافذة اختيار نوع الرسم البياني (Charts) من نافذة تنفيذ الجدول التكراري.

وفي القسم السفلي من النافذة في الشكل (4.3) يتوفر خيارات لعرض القيم على الرسم هما التكرارات (Percentages) والنسب (Frequencies)، وسنختار في مثالنا هنا خيار النسب¹. بعد الضغط على استمرار (Continue) في الشكل (4.3) ستحتفي النافذة الفرعية (3.3) فنقوم بالضغط على موافق (OK).

ستظهر النتائج المطلوبة في نافذة النتائج (Output)، وسيتم عرضها بالترتيب التالي بحسب النسق الذي تظهر عليه في برنامج SPSS،

أولاً: عدد المشاهدات لكل متغير (جدول (1.3)) وعدد القيم المفقودة. ونلاحظ أن عدد المشاهدات (N) هو 128 مشاهدة (المشار إليه بالفعل (Valid)) لكل متغير من المتغيرات الثلاثة، وأنه لا توجد أي قيمة مفقودة في أي متغير (وال المشار إليه بالمفقود (Missing)).

جدول 1.3: عدد المشاهدات لكل متغير في ملف البيانات .car_insurance_claims.sav"

Statistics				
	Policyholder age	Vehicle group	Vehicle age	
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0

ثانياً: جدول التوزيع التكراري لكل متغير، وسنقوم هنا بعرض جدول التوزيع التكراري للمتغير الأول فقط، (وهو المتغير Policyholder age) في جدول (2.3) ويمكنك الرجوع لنقية الجداول في نافذة النتائج في برنامج SPSS.


¹ في الرسم البياني في SPSS لن تظهر النسب أو القيم على القطاعات أو الأعمدة البيانية تلقائياً، بل يتم إظهارها على الشكل باستخدام نافذة محرر الرسم (Chart Editor) كما سنوضح لاحقاً.

جدول 2.3: جدول التوزيع التكراري للمتغير Policyholder age في ملف البيانات
."car_insurance_claims.sav"

Policyholder age					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	17-20	16	12.5	12.5	12.5
	21-24	16	12.5	12.5	25.0
	25-29	16	12.5	12.5	37.5
	30-34	16	12.5	12.5	50.0
	35-39	16	12.5	12.5	62.5
	40-49	16	12.5	12.5	75.0
	50-59	16	12.5	12.5	87.5
	60+	16	12.5	12.5	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

ويُلاحظ من الجدول (2.3) أن العامود الأول من اليسار يمثل التصنيف أو التقسيم للمتغير الوصفي (عمر المؤمن) وهو عبارة عن ثمانية تقسيمات تمثل ثمانية فئات عمرية، والعامود الثاني يمثل تكرارات كل تقسيم أي كل فئة عمرية، والعامودين الثالث والرابع يمثلان نسب الأشخاص الكلية¹ والفعالية على التوالي ضمن كل فئة عمرية. أما العامود الأخير فيمثل النسبة التراكمية، أي حاصل جمع نسبة كل فئة عمرية مع ما يسبقها. ومن هذا الجدول نلاحظ أن نسب الأشخاص في كل فئة عمرية هو متساوي ويساوي 12.5%. وكذلك الحال في المتغيرين الآخرين، فإننا نلاحظ تساوي نسب السيارات في التقسيمات الأربع أي أن نسبة السيارات في كل تقسيم هو 25%， وكذلك تساوي نسب الأشخاص من حيث

أعمار سياراتهم.




شكل 5.3: القطاعات البيانية للمتغير Policyholder age في ملف البيانات
."car_insurance_claims.sav"

ثالثاً: الرسم البياني، وقد تم اختيار القطاعات البيانية في مثلثنا، وسنقوم بعرض الرسم البياني للمتغير الأول فقط في الشكل (5.3) ويمكن الرجوع لبقية الرسومات في نافذة النتائج في برنامج SPSS. ويُلاحظ من الرسم البياني تساوي جميع القطاعات مما يدل على توزع عدد أو نسب أعمار الأشخاص في التقسيمات الثمانية. وكذلك الأمر بالنسبة للمتغيرين الآخرين حيث يُلاحظ تساوي توزيع النسب في القطاعات أو التقسيمات. وكما

¹ يقصد بالنسب الكلية التي تحتوي على القيم الفعلية والمفقودة إن وجدت، وحيث أن المتغير لا يحتوي على قيم مفقودة فالنسبة في العامودين الثالث والرابع تكون متساوية.

ذكرنا سابقاً، فإن نسب القطاعات لم تظهر في الشكل، لذلك إذا ما أردنا إظهارها على القطاعات أو على أي رسم بياني نقوم بالخطوات التالية:

في نافذة النتائج (Output) في SPSS للمثال السابق، قم بالنقر المزدوج (بالزر الإيسر للفأرة) على رسم القطاعات البيانية للمتغير (Policyholder age) فتظهر نافذة فرعية هي نافذة محرر الرسم (Chart Editor) كما يوضح الشكل (6.3 أ).



شكل 6.3: (أ) نافذة محرر الرسم (Chart Editor) لرسم القطاعات البيانية للمتغير (Policyholder age) و(ب) نافذة خواص محرر الرسم الخاصة بها.

قم بالضغط على الأيقونة المشار لها بالسهم في الشكل، والتي تمثل إظهار وسم البيانات (Show Data Label) والتي تمثل في مثالنا نسب القطاعات، عندها ستظهر نافذة فرعية أخرى، كما يشاهد في الشكل المجاور، الشكل (6.3 ب)، وفي نفس الوقت ستظهر تلك النسب على القطاعات في نافذة النتائج في SPSS. قم بعدها بالضغط على أمر الإغلاق (Close) في النافذة الأخيرة وكذلك يمكنك إغلاق نافذة محرر الرسم إذا لم يكن هنالك تعديلات تريدها. وستلاحظ بعد ذلك ظهور نسب الأعمار للمتغير المطلوب على القطاعات البيانية في نافذة النتائج.

وفي كلا النافذتين، (الشكل (6.3 أ، ب)), ستلاحظ وجود العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها للتعديل على الرسم مثل حجم الرسم، حجم ونوع الخطوط في الرسم، إضافة عنوان للرسم، تعديل أسماء محاور الرسم، تغيير مواضع وسم البيانات، تغيير الألوان في الرسم، وغيرها من الخيارات التي ستناول البعض منها لاحقاً.

ملاحظة:

في نافذة محرر الرسم، عند النقر المزدوج على أي جزء من الرسم ستظهر نافذة خواص ذلك الجزء بالتحديد ويمكنك من خلالها إجراء التعديلات المطلوبة.

2.3.3 الأعمدة البيانية لجدائل التوزيع التكراري (Bar plots of Frequency Distribution Tables)

تشبه رسومات الأعمدة البيانية للمتغيرات الوصفية، من حيث الشكل العام، رسومات المدرج التكراري والتي تستخدم لتمثيل التوزيع التكراري للمتغيرات الكمية. إلا أن الأعمدة البيانية غالباً ما تستخدم لتمثيل وعرض البيانات الوصفية غير الرقمية باستخدام تكراراتها. ويتم على الرسم توزيع مستويات أو تصنيفات المتغير الوصفي المختلفة على أحد المحاور، (المحور الأفقي عادة)، وتكرار الحدوث أو النسبة على المحور الآخر. وفي هذه الفقرة، س يتم من خلال المثال القائم شرح طريقة إدخال البيانات للمتغير الوصفي التي تكون مجهزة مسبقاً بصورة جدول توزيع تكراري كما هو سائد بشكل كبير في أوساط المتعاملين بالتحليل الإحصائي للبيانات.

البيانات في الجدول التالي، (الجدول (3.3))، تمثل أعداد الطلبة الذكور والإإناث في خمسة أقسام في كلية العلوم بجامعة بنغازي لعام 2012. وسيتم استخدام الأعمدة البيانية "التحويل" محتويات الجدول إلى "صورة" معبرة عما تمثله هذه البيانات.

جدول 3.3: توزيع أعداد الطلبة الذكور والإإناث في أقسام كلية العلوم بجامعة بنغازي.

القسم					
نوبات	كمياء	فيزياء	إحصاء	رياضيات	النوع ↓
470	510	170	120	190	ذكور
960	720	240	310	280	إناث
1430	1230	410	430	470	المجموع

ستكون أول خطوة هنا هي إدخال البيانات في ملف بيانات جديد في SPSS ولتكن باسم "أقسام كلية العلوم"، كما يظهر في الشكل (7.3). ولاحظ هنا أنه تم تعريف ثلاثة متغيرات هي "الطلبة" وهو متغير كمي يمثل أعداد الطلبة، و"النوع" وهو متغير وصفي اسمي يمثل نوع الطالب ذكر أو أنثى، و"القسم" وهو أيضاً متغير وصفي اسمي يمثل القسم الذي ينتمي إليه الطالب من بين خمسة أقسام.


وننوه هنا بأنه قد تكون ملف البيانات "أقسام كلية العلوم" من الجدول السابق، (جدول (3.3)), عن طريق إدخال قيم الصف الأول (190, 120, ..., 470) متباينة بقيم الصف الثاني (960, 310, ..., 280) كقيم للمتغير الأول وهو "الطلبة"، ثم تم إدخال تصنيف نوع الطالب والقسم الذي يتبع له، (وهما المتغيران "النوع" و"القسم")، بحسب ترتيب إدخال أعداد الطلبة، فمثلاً القيمة 190 تمثل الطلبة الذكور في قسم الرياضيات، والقيمة 120 تمثل الطلبة الذكور في قسم الإحصاء، وهكذا.

	النوع	القسم	الطلبة
1	ذكور	رياضيات	190
2	ذكور	إحصاء	120
3	ذكور	فيزياء	170
4	ذكور	كيمياء	510
5	ذكور	نبات	470
6	إناث	رياضيات	280
7	إناث	إحصاء	310
8	إناث	فيزياء	240
9	إناث	كيمياء	720
10	إناث	نبات	960

شكل 7.3: عرض بيانات ملف "أقسام كلية العلوم".

الآن سنقوم بتمثيل البيانات في ملف البيانات "أقسام كلية العلوم" باستخدام الأعمدة البيانات المصنفة (Clustered)، والذي سيتم من خلاله عرض أعداد الطلبة بحسب نوع الطالب والقسم التابع له. في شريط الأدوات


العلوي في برنامج SPSS قم باختيار Graphs > Legacy Dialogs > Bar فتظهر النافذة الفرعية التالية التي تتيح اختيار نوع الأعمدة البيانات؛ (شكل (8.3)).



شكل 8.3: نافذة اختيار نوع الأعمدة البيانات .(Clustered)

قم باختيار الأعمدة البيانات المصنفة كما هو مشار إليه بالسهم (Clustered) ثم اضغط تعريف (Define). ستظهر بعد ذلك نافذة أخرى، (شكل (9.3)), والتي سيتم من خلالها تعريف ترتيب متغيرات التصنيف، (والتي هي في مثانا الحالي تمثل نوع الطالب والقسم التابع له).

قم في تلك النافذة بالنقر على الخيار (Other statistic) والمشار إليه بالسهم، ثم عرف المتغيرات الثلاثة في ملف البيانات "أقسام كلية العلوم" بنفس الترتيب الموضح في الشكل (9.3) والمشار إليه بالأسماء، حيث أن المتغير الكمي "الطلبة" سيكون هو المتغير الأساسي والمتغير "القسم" سيمثل التصنيف على المحور الأفقي، والمتغير "النوع" سيكون ضمن تصنيف الأقسام.




شكل 9.3: نافذة تعريف المتغيرات للأعمدة البياناتية المصنفة لبيانات ملف "أقسام كلية العلوم".

بعد الانتهاء من تعريف المتغيرات¹ قم بالضغط على موافق (OK) في أسفل النافذة للتنفيذ. ستحصل مباشرة بعد ذلك على الأعمدة البياناتية المصنفة لأعداد الطلبة في نافذة المخرجات، كما هو في الشكل (10.3). ويمكن الوقوف على عدة ملاحظات من شكل الأعمدة البياناتية من أهمها:

- تميز قسمى النبات والكيمياء بوجود أعداد أكبر من الطلبة من باقى الأقسام.
- تفوق أعداد الطالبات على أعداد الطلبة في جميع أقسام الكلية وخاصة في قسمى النبات والكيمياء.
- أقل عدد للطلبة هو في قسم الفيزياء.

¹ يمكنك إدراج عناوين أو ملاحظات خاصة بك ضمن الرسم عن طريق الدخول إلى العناوين (Titles) في أعلى النافذة إلى اليمين. كما يمكنك أيضا الحصول على بعض الخيارات الإضافية على الرسم، (مثل فترات الثقة وغيرها) بالدخول إلى الخيارات (Options).



شكل 10.3: الأعمدة البياناتية المصنفة للطلبة بحسب النوع والقسم لبيانات ملف البيانات "أقسام كلية العلوم"

من جديد، يمكننا ولنفس المثال، (ملف البيانات "أقسام كلية العلوم")، استخدام الأعمدة البياناتية لممثل أعداد الطلبة في الأقسام بدون تصنيفهم إلى ذكور وإناث. ولتنفيذ ذلك، قم في شريط الأدوات العلوي قم باختيار

فتظهر النافذة الفرعية Graphs>Legacy Dialogs>Bar

التي نراها في الشكل (11.3). قم باختيار الأعمدة البياناتية

البسيطة (Simple) كما هو مشار إليه بالسهم ثم اضغط

تعريف (Define).

ستظهر بعد ذلك نافذة تعريف ترتيب المتغيرات التصنيف،

كما هو في الشكل (9.3) السابق، قم في تلك النافذة بالنقر

على الخيار إحصاءات أخرى (Other statistic) والمشار


إليه بالسهم، ثم عرف المتغيران "الطلبة" و"القسم" بنفس

الترتيب الموضح والمشار إليه بالأسماء ولكن بدون تعريف

المتغير الثالث وهو " النوع" ، حيث أن المتغير الكمي "الطلبة"


سيكون هو المتغير الأساسي والمتغير "القسم" سيمثل

التصنيف على المحور الأفقي.




شكل 11.3: نافذة اختيار نوع الأعمدة البياناتية البسيطة (Simple).

بعد الانتهاء من تعريف المتغيرات قم بالضغط على موافق (OK) في أسفل النافذة وستحصل بعد ذلك على الأعمدة البياناتية لأعداد الطلبة بحسب القسم فقط في نافذة المخرجات، كما هو في الشكل (12.3).



شكل 12.3: الأعمدة البيانات المصنفة للطلبة بحسب القسم لبيانات ملف البيانات "أقسام كلية العلوم".

ويمكننا من شكل (12.3) ملاحظة وجود أعداد أكبر من الطلبة في قسمي النبات والكيمياء، وكذلك انخفاض عدد طلبة قسم الفيزياء مقارنة بباقي أقسام الكلية، وهذه الملاحظات أمكن رؤيتها من الشكل (10.3) السابق أيضاً. ونشير هنا إلى أنه إذا ما تم اختيار الخيار الثالث (Stacked) في الشكل (8.3) فإننا سنحصل على أعمدة بيانات مصنفة بحسب القسم والنوع كما يظهر في الشكل (13.3).



شكل 13.3: الأعمدة البيانات المصنفة للطلبة بحسب القسم والنوع لبيانات ملف "أقسام كلية العلوم" باستخدام خيار .(Stacked)

ملاحظة:

يمكن استخدام القطاعات البيانية، كما أوضحنا سابقاً، مع بيانات المثال السابق لتمثيل أعداد الطلبة بحسب القسم (أو النوع) وسنحصل على نفس الملاحظات ولكن بتمثل بياني مختلف.

3.3.3 الأعمدة البيانية للمتغيرات الوهمية (Bar plots for Dummy Variables)

في بعض الأحيان قد نحتاج لمقارنة تغير أو توزع البيانات ضمن عدة متغيرات وصفية تأخذ طابعاً خاصاً مثل أن يتم المقارنة بين آراء الناس حول موضوع معين بحيث يمكن للشخص المستجيب أن يعطي أكثر من إجابة واحدة بنعم أو لا لنفس السؤال، أي أن يكون للشخص أكثر من خيار لكل إجابة بنعم أو لا، في هذه الحالة يتم تعريف مجموعة من المتغيرات، والتي تسمى عندها بالمتغيرات الوهمية، بحيث أن كل متغير من هذه المتغيرات يمثل استجابة الشخص بنعم أو لا لكل خيار. وقد سبق التعرض للمتغير الوهمي في الفصل الثاني، (البند (4.2))، وسوف نقدم مثال آخر هنا للمزيد من التوضيح؛

قامت إحدى مراكز الصحية المختصة بعلاج السمنة بتوزيع استبيان على مجموعة من الأشخاص لمعرفة آرائهم حول وجباتهم المفضلة من المطاعم المختلفة، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي، (جدول (4.3)) والرقم "1" يدل على اختيار الشخص لنوع الطعام المفضل، فمثلاً؛ الشخص الأول في الجدول يفضل تناول الدجاج واللحوم الحمراء والمثلجات، وهكذا.

جدول 4.3: آراء عينة من الأشخاص حول مأكولاته المفضلة.

	بيتزا	دجاج	سلطات	لحوم حمراء	مثلجات
1		1		1	1
2	1			1	1
3					1
4	1	1		1	
5	1	1	1	1	1
6	1			1	1
7					1
8	1			1	1
9			1		1
10			1	1	1
11	1	1			
12				1	1
13	1		1	1	1
14		1			
15		1		1	1
16				1	1
17	1			1	1
18		1			1
19	1	1			1
20	1		1		1

وبعد إدخال هذه البيانات في ملف جديد في برنامج SPSS، ول يكن باسم "المأكولات المفضلة"، كما نشاهد في الشكل (14.3) نقوم بالخطوات التالية:


	بيتزا	دجاج	سلطات	لحوم_حمراء	مليجات
1	.	1	.	1	1
2	1	.	.	1	1
3	1
4	1	1	.	1	.
5	1	1	1	1	1
6	1	.	.	1	1
7	1
8	1	.	.	1	1
9	.	.	1	.	1
10	.	.	1	1	1
11	1	1	.	.	.
12	.	.	.	1	1
13	1	.	1	1	1
14	.	1	.	.	.
15	.	1	.	1	1
16	.	.	.	1	1
17	1			1	1

شكل 14.3: عرض بيانات ملف "المأكولات المفضلة".

في شريط الأدوات العلوي قم باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Bar وبعد ظهور النافذة الفرعية الخاصة


باختيار نوع الأعمدة البيانية، (شكل (15.3))، قم بإبقاء اختيار الأعمدة البسيطة (Simple) ثم قم بالنقر على الخيار الثاني في الجزء الأسفل من النافذة والمشار إليه بالسهم السفلي لاختيار التعامل مع عدة متغيرات.

اضغط تعریف Define (Define) فتظهر نافذة جديدة لتعريف المتغيرات المطلوب تمثیلها باستخدام الأعمدة البيانية كما يوضح الشكل التالي، (شكل (16.3)).




شكل 15.3: نافذة اختيار تمثيل الأعمدة البيانية لأكثر من متغير.

في هذه النافذة، قم باختيار كل المتغيرات الخمسة كما هو مشار إليه في السهم رقم 1، ثم قم بنقلها إلى الخانة المشار إليها بالسهم رقم 2، (وهي خانة المتغيرات التي ستمثلها الأعمدة البيانية)، بعد ذلك انقر على زر الخيارات Options (الذي يشير إليه السهم رقم 3 فتظهر نافذة فرعية جديدة كما يوضح الشكل (17.3)).




شكل 16.3: نافذة اختيار المتغيرات في تمثيل الأعمدة البياناتية المتعددة.

في نافذة الشكل (17.3)، قم بالضغط على الخيار المشار إليه بالسهم، (والخاص باستثناء القيم المفقودة ضمن كل متغير وليس باستثناء الصفر)، ثم اضغط استمرار (Continue).



شكل 17.3: نافذة تعديل اختيار القيم المفقودة ضمن المتغيرات.


ستعود الآن للنافذة السابقة (شكل 16.3) ، قم عندها بالضغط على خيار تغيير الإحصاء (Change) والموجود أسفل الخانة التي تم نقل المتغيرات إليها، وستظهر عندها نافذة فرعية جديدة كما يظهر في الشكل (18.3).



شكل 18.3: نافذة اختيار الإحصاء المطلوبة للمتغيرات في تمثيل الأعمدة البيانية.

قم في هذه النافذة باختيار الإحصاء الخاصة بعدد المشاهدات لكل متغير، وهي في مثالنا الحالي ستكون عبارة عن مجموع آراء الناس أي مجموع الرقم 1 لكل متغير، بعد ذلك اضغط استمرار وستختفي النافذة الفرعية، اضغط موافق (OK) للتنفيذ. سحصل بعدها على الأعمدة البيانية المطلوبة في نافذة المخرجات، وهذه الأعمدة موضحة في الشكل (19.3).

ومن هذه الأعمدة يمكن بوضوح القول بأن الأشخاص الذين تم استبيانهم يفضلون تناول المثلجات كرغبة أولى إليها اللحوم الحمراء والبيتزا.



شكل 19.3: الأعمدة البيانية الممثلة لآراء الناس في الطعام المفضل لبيانات ملف "المأكولات المفضلة".

4.3 التحليل الاستكشافي للمتغيرات الكمية (EDA for Quantitative Variables)

كما وضمنا في البند الخاص بأنواع البيانات، فإن البيانات الكمية تتقسم إلى فئوية ونسبة، إلا أن هذا التقسيم لن يتم أخذها بالاعتبار من الناحية العملية إلا عند التعليق على المعلومات المستخلصة من البيانات كما سنلاحظ من خلال الأمثلة التي سنتناولها في هذا البند.


وتوجد عدة طرق ومقاييس لاستكشاف البيانات الكمية وهي تدرج في مفهوم الإحصاء الوصفي التقليدي تحت مسميات مقاييس النزعة المركزية (Central Tendency)، وهي تشمل أهم وأشهر المقاييس الإحصائية مثل الوسط الحسابي والوسط والمتوسط وغيرها، ومقاييس التشتت أو الاختلاف (Dispersion). وأهمها المدى والانحراف المعياري والتباين وغيرها. وكما هو الحال مع البيانات الوصفية، فإن التمثيل البياني الإحصائي يُعد أدلة هامة جداً تستخدم لتوضيح واستكشاف طبيعة وتوزيع البيانات كما سنرى.

من جديد، نذكر هنا بأنه يمكن التعامل مع أية متغيرات، كمية كانت أو وصفية، بشكل مفرد (التحليل الأحادي)، أو متعدد، أي التعامل مع عدة متغيرات في آن واحد، (التحليل المتعدد). والأساليب الإحصائية التي تُستخدم مع التحليل الأحادي تعني أنه سيتم حساب تلك المقاييس لكل متغير على حدة، حتى وإن كانت قاعدة البيانات مكونة من متغيرات عديدة. وسنقوم بداية بحساب أهم المقاييس الإحصائية لاستكشاف البيانات من خلال الأمثلة التالية.

باستخدام ملف البيانات "بيانات الطلبة"، (الذي تم تكوينه في الفصل الثاني)، والذي يمثل البيانات المتعلقة بـ 35 طالباً جامعياً في إحدى الأقسام العلمية، حيث تمثل المتغيرات فيه:

مقرر 1: درجة الطالب (من 100 درجة) في المقرر 1، مقرر 2: درجة الطالب في المقرر 2، مقرر 3: درجة الطالب في المقرر 3، العمر: عمر الطالب بالسنوات، النوع: جنس الطالب (1 = ذكر، و 2 = أنثى)، الفصل: ترتيب الفصل الدراسي للطالب (المرحلة)، الأسرة: عدد أفراد أسرة الطالب، والمنزل: عدد الحجرات في منزل الطالب.

سنقوم بحساب بعض المقاديس الإحصائية الهامة والوقوف على تفسيرها. فنذهب لشريط الأدوات العلوى في برنامج SPSS ونختار التالي: Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies ونختار التالي: Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies فتظهر نافذة الإدخال كما هو مبين في الشكل التالي، (شكل (20.3)):




شكل 20.3: نافذة الإدخال لأمر التكرارات (Frequencies).

في هذه النافذة، يمكن للمستخدم اختيار المتغير أو المتغيرات التي يرغب في حساب المقاديس الإحصائية والرسومات البيانية لها من المربع الإيسر المشار إليه بالسهم (1)، وسنقوم في مثالنا هذا باختيار جميع¹ المتغيرات الثمانية المتوفرة. وبعد اختيار كل المتغيرات نقوم بنقلها باستخدام السهم المشار إليه بالرقم (2)، إلى مربع المتغيرات (Variables). الآن سنقوم باختيار المقاديس التي نرغب بحسابها من خيار الإحصاءات (Statistics) المشار إليه بالسهم (3).

عندما ستظهر نافذة فرعية جديدة، (الشكل (21.3))، قم في هذه النافذة الفرعية باختيار المقاديس المشار إليها بالعلامة (√) وهي الوسط الحسابي (Mean)، الوسيط (Median)، المنوال (Mode)، الربعيات (Quartiles)، الانحراف المعياري (Std. Deviation)، القيمة الصغرى (Minimum)، والقيمة الكبرى (Maximum). أما


¹ لاختيار جميع المتغيرات مرة واحدة يمكن بعد النقر بالفأرة على المربع الإيسر الضغط على زر CTRL في لوحة المفاتيح والحرف A في آن واحد فيتم اختيار كافة المتغيرات.

المقاييس الأخرى المتوفرة ضمن الخيارات، (مثل المجموع (Sum) والتباين (Variance)، فليس هنالك حاجة لاستخدامها حالياً في هذا المثال وسنطرق لها لاحقاً بحسب الحاجة.



شكل 21.3: نافذة اختيار المقاييس الإحصائية ضمن نافذة التكرارات (Frequencies).

بعد اختيار المقاييس المطلوبة اضغط استمرار (Continue) فيتم العودة للنافذة السابقة (شكل 20.3)، ونقوم في تلك النافذة بالضغط على خيار الرسومات البيانية



شكل 22.3: نافذة اختيار الرسم البياني ضمن نافذة التكرارات (Frequencies).

(Charts) المشار إليه بالسهم (4) لاختيار الرسم البياني المطلوب. ستظهر عندئذ نافذة فرعية أخرى، (شكل 22.3))، والتي يمكن من خلالها اختيار عدم استخدام أي رسم بياني (None)، أو اختيار الأعمدة البيانية (Bar Charts)، أو اختيار القطاعات البيانية (Pie Charts)، أو اختيار المدرج التكراري (Histogram)، وسنقوم هنا باختيار المدرج التكراري، والذي سيتم تفصيله في البند القائم.

ونشير هنا في نفس النافذة إلى إمكانية اختيار إظهار منحنى التوزيع الطبيعي على الرسم البياني للمدرج التكراري، إلا أننا لن نقوم باستخدامه حالياً حيث أننا سنفرد له تعليقاً مطولاً عند تناول موضوع التوزيع الطبيعي.

ملاحظة:

إذا ما تم اختيار الأعمدة البيانية أو القطاعات البيانية في الشكل (22.3) فإنه يمكن اختيار عرض التكرارات أو النسب (Percentages) على الرسم من الخيار أصلف النافذة.

بعد اختيار الرسم المطلوب اضغط على استمرار (Continue) فيتم العودة للنافذة السابقة (شكل (20.3)). وإذا ما قمنا في تلك النافذة بإبقاء اختيار عرض الجداول التكرارية (Display Frequency Tables) المشار إليه بالسهم رقم (5)، فإن سنحصل عليها مع المقاييس والرسومات المطلوبة، إلا أنها في هذا المثال لن تكون بحاجة إليها لذلك سنقوم بإلغاء اختيار عرضها. نقوم بعد ذلك بالضغط على موافق (OK) في نافذة الشكل (20.3) فنحصل على النتائج المطلوبة تباعاً في نافذة المخرجات.

النتيجة الأولى، بحسب ترتيب العرض في نافذة المخرجات ستكون المقاييس الإحصائية المطلوبة لكافية المتغيرات الثمانية كما يوضح الشكل (23.3). في العمود الأول إلى اليسار، توجد أسماء المقاييس بالترتيب التالي؛ عدد المشاهدات (N Valid) وهو 35 مشاهدة، عدد القيم المفقودة (Missing) ويساوي صفرًا لعدم وجود قيم مفقودة في البيانات، المتوسط، الوسيط، المتوسط، الانحراف المعياري، القيمة الصغرى، القيمة الكبرى، الربعيات: الربع الأول، الثاني، والثالث، (لاحظ أنها معروضة باسم المئين 25، 50، و 75).

Statistics									
		درجة الطالب في المقرر 1	درجة الطالب في المقرر 2	درجة الطالب في المقرر 3	عمر الطالب بالسنوات	جنس الطالب	ترتيب الصنف الدراسي للطالب	عدد أفراد أسرة الطالب	عدد المجرات في منزل الطالب
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		71.31	72.97	55.34	22.14	1.49	5.06	6.00	4.11
Median		75.00	75.00	53.00	22.00	1.00	5.00	5.00	4.00
Mode		75 ^a	70	50 ^a	22	1	4	4 ^a	5
Std. Deviation		15.605	15.219	14.289	1.648	.507	1.846	3.058	1.278
Minimum		35	40	27	19	1	2	2	2
Maximum		94	96	95	25	2	8	12	6
Percentiles	25	63.00	66.00	49.00	21.00	1.00	4.00	4.00	3.00
	50	75.00	75.00	53.00	22.00	1.00	5.00	5.00	4.00
	75	84.00	85.00	60.00	23.00	2.00	7.00	9.00	5.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

شكل 23.3: المقاييس الإحصائية الاستكشافية لمتغيرات الملف "بيانات الطلبة".

ويلاحظ هنا أن النتائج أو المقاييس المحسوبة قد ظهرت بشكل فردي أو أحادي، بمعنى أن قيم المقاييس قد تم حسابها لكل متغير على حدة (في عمود مستقل)، ولا توجد نتيجة محسوبة باستخدام متغيرين أو أكثر في نفس الوقت. وبالنظر إلى هذه النتائج يمكننا استخلاص التالي:


- وإذا ما نظرنا إلى الوسط الحسابي للدرجات فإننا نلاحظ أن المقررين 1 و 2 لهما أوساط متقابلة تقترب من تقدير جيد جدا (72.97 و 71.31)، أما المقرر الثالث فيختلف وسطه عن المقررين الأولين ويتجه نحو التقدير مقبول (55.34). وضمن عائلة الأوساط أيضا، يلاحظ تساوي الوسيط للمقررين الأولين (75) واختلاف (ارتفاع) قيمته عن المقرر الثالث (53) بصورة كبيرة. هذه النتيجة تعطي انطباعاً "مبديعاً" بأن أداء الطالب في المقررين 1 و 2 هو أفضل من أداؤهم في المقرر 3.

- الارتفاع الطفيف في قيم الوسيط للمقررين الأولين يعكس وجود التواء بسيط إلى اليسار في توزيع¹ درجات الطلاب في هذين المقررين، بمعنى أن الدرجات تتجه إلى اليمين، أي تتجه نحو الدرجات الأعلى، وهذه الملاحظة تتوافق مع قيم الأوساط للدرجات.
- إذا ما نظرنا إلى القيم الكبرى للمقررات الثلاثة والتي يلاحظ تقاربه (94، 96، و 95 على الترتيب)، فإننا، وبعد قراءة النتائج السابقة، نستنتج وجود قيم متطرفة عاليًا في المقرر الثالث، بمعنى أن طالب أو أكثر قد حققوا درجات عالية جداً في هذا المقرر رغم تدني مستوى الأداء لغالبية الطلاب مما يُعد من الناحية الإحصائية "طرفًا" في قيم ذلك المتغير.
- بالنظر إلى قيم الربعيات في النتيجة السابقة فإننا نلاحظ أن قيم الربع الأول هي متقاربة في المقررين الأولين (63.5 و 67.5) وهذه القيم تعني أن تقديرات 75% من الطلاب (أي الأكثرية) هي تقريباً جيد في المقررين. كما أن قيم الربع الثالث للمقررين هي متقاربة جداً (83 و 84.5) مما يدل على تقارب توزيع درجات الطلاب في هذين المقررين. أما بالنسبة للمقرر الثالث، فمن الملاحظ أن قيم الربع الأول والثالث له متدنية كثيراً عن المقررين الأولين، وحيث أن قيمة الربع الثالث له هي 60، (مما يعني أن 75% من درجات الطلاب في هذا المقرر هي أقل من جيد)، فهذا كله يؤكّد أن أداء الطلاب في المقرر 3 كان تحت المستوى المرضي مقارنة بالمقررين 1 و 2.
- من قيم الانحراف المعياري للدرجات، نرى بأن متوسط الفروقات بين درجات الطلبة في المقررات الثلاثة هو متقارب جداً ويساوي 15 درجة تقريباً، بمعنى أن معدل الاختلاف في أداء الطلبة في أي مقرر من المقررات الثلاثة هو 15 درجة، وذلك يُعد اختلافاً كبيراً بين مستوى الطلبة ضمن كل مقرر من هذه المقررات.

1.4.3 المدرج التكراري (Histogram)

إن الكثير من تلك الاستنتاجات السابقة وغيرها يمكن قرائتها "بشكل مرئي" باستخدام التمثيل البياني، وعلى رأسها المدرج التكراري الذي ستكون نتائجه متوفّرة ضمن نافذة المخرجات، وسنقوم بعرض المدرجات التكرارية للمتغيرات الثلاثة الأولى في مثالنا الحالي، (ملف البيانات "بيانات الطلبة")، وهي درجات الطلبة في المقررات الثلاثة، في شكل واحد هنا، (شكل (24.3))، لتسهيل المقارنة بينها؛

¹ نذكر هنا أن مصطلح "توزيع" الدرجات يشير إلى نمط انتشار قيم المشاهدات ولا يقصد به التوزيع الاحتمالي للمتغير.



شكل 24.3: المدرجات التكرارية للمتغيرات درجات الطلبة في مقرر 1، 2، و 3 في الملف "بيانات الطلبة".


ويُلاحظ من المدرجات في الشكل (24.3) وجود التواء بسيط إلى اليسار في توزيع المقررين الأولين 1 و 2، أما قيم المقرر الثالث فتُظهر التواء إلى اليمين والذي ساعد على ظهوره وجود القيم المتطرفة العليا، (العاموديين الآخرين في يمين المدرج التكراري).

أما فيما يخص باقي المتغيرات الكمية؛ وهي عمر الطالب، عدد أفراد أسرة الطالب وعدد غرف منزل الطالب، فيتم دراسة توزيعاتها بشكل منفصل أي بدون مقارنتها مع بعضها البعض، (كما كان الحال مع درجات الطالب)، لأنها مقاسة بوحدات قياس مختلفة؛ فالعمر مقاس بالسنة وأفراد الأسرة بعدد الأشخاص وغرف المنزل مقاسة بعدها.

من الشكل (23.3)، يمكن ملاحظة التالي بالنسبة لمتغيرات "العمر"، "الأسرة"، و "المنزل":

- متوسط أو معدل أعمار الطلبة هو 22 سنة تقريباً، وهي أعمار منطقية تناسب وطبيعة المرحلة الدراسية لهم. ومعدل عدد أفراد أسرة الطالب هو 6 (بوسيط يساوي 5) وهو معدل قد يُعتبر مرتفع إلى حد ما عالمياً، وإن كان اعتيادياً بالنسبة للأسرة العربية. أما معدل عدد الغرف في منزل الطالب في هذه العينة فيساوي 4 غرف (للوسط والوسيط) وهذا المعدل من الغرف بالنظر إلى معدل أفراد أسر الطلبة (وهو 6) يعطي انطباعاً بوجود اكتظاظ في منازل هؤلاء الطلبة.
- من الانحراف المعياري للمتغيرات، نرى أن متوسط الفروقات بين أعمار الطالب هو أقل من سنتين، كما يُلاحظ أن هناك درجة تشتت كبيرة نوعاً ما ضمن عدد أفراد هؤلاء الطلاب، وأما عدد غرف منازل تلك الأسر فهي غير مختلفة كثيراً فيما بينها، حيث أن مقاييس تشتتها لها قيم منخفضة.

وبالنسبة للمدرجات التكرارية لمتغيرات العمر، عدد أفراد الأسرة، وعدد غرف المنزل، فإننا سنقوم بعرضها في الشكل التالي، (25.3)، للاختصار؛



شكل 25.3: المدرجات التكرارية لمتغيرات العمر، عدد أفراد الأسرة، وعدد غرف المنزل للطالب في الملف "بيانات الطلبة".

ومن هذه المدرجات التكرارية يمكن الوصول لنفس الملاحظات السابقة للمتغيرات الثلاثة. وننوه هنا إلى أن المدرجات التكرارية يمكن أن تستخدم لتوضيح سلوك المتغيرات من حيث مدى اقتربها من التوزيع الطبيعي كما سنوضح لاحقاً.


من جهة أخرى، فإنه يلاحظ أن متغير جنس الطالب قد أعطى على سبيل المثال متوسط قدره 1.49 ووسيط يساوي 1.00 وغير ذلك من قيم للمقاييس الأخرى والسبب في ذلك يرجع إلى كون هذا المتغير وصفي وتم تعريفه ليأخذ القيمة 1 للذكور والقيمة 2 للإناث، وبالتالي فإن قيم المقاييس الإحصائية لهذا المتغير لن تكون "حقيقية" نظراً لطبيعة المتغير، بمعنى أن قيمة المتوسط 1.49 ليس لها وحدة قياس. ولذلك يفضل عادة استخدام مقاييس مثل النسبة والمنوال مع المتغيرات الوصفية. وكذلك الأمر مع المتغير الذي يمثل ترتيب الفصل الدراسي للطالب. ولذلك لن يتم عرض المدرجات التكرارية الخاصة بهاذين المتغيرين هنا.

وعموماً، فإنه من الرسومات البيانية للمتغيرين يمكن القول بأن عدد الذكور هو متقارب جداً مع عدد الإناث في هذه البيانات مع وجود ارتفاع طفيف في عدد الذكور، وكذلك يلاحظ أن معظم مسجلون في فصول دراسية في المرحلة المتوسطة من الفصل الرابع إلى الفصل السادس.

1.1.4.3 تغيير الفترات في المدرج التكراري (Adjusting the Histogram)

في بعض الحالات، قد يكون من الملائم تعديل عدد أو طول الفترات ضمن المدرج التكراري بحسب وحدة قياس المتغير، ولعمل ذلك نقوم بالآتي:

في نفس المثال السابق، (ملف البيانات "بيانات الطلبة")، وفي نافذة المخرجات قم بالنقر المزدوج على المدرج التكراري الخاص بالمتغير "درجة الطالب في المقرر 1"، فتظهر نافذة محرر الرسم (Chart Editor) كما يوضح الشكل (26.3).




شكل 26.3: نافذة محرر الرسم للمدرج التكراري للمتغير "مقرر 1".

في هذه النافذة، قم بالنقر المزدوج من جديد على المدرج التكراري بالتحديد¹ وستظهر نافذة فرعية أخرى بعنوان خصائص (Properties)، كما في الشكل (27.3). ضمن خيار تحديد المدى (Binning)، وفي الجزء الخاص بمحور X (X Axis)، اختر تعديل حسب الطلب (Custom) ثم اختر طول الفترة (Interval width)، وفي المستطيل المقابل اكتب 10 وذلك لتعديل طول الفترة إلى 10 درجات، (حيث أن المتغير يمثل درجات طلبة تتراوح ما بين 0 إلى 100 لذلك سيكون من المناسب أن يكون طول الفترة 10 درجات).

وبعد تحديد طول الفترة اضغط تطبيق (Apply) ليتم تفديه التعديل المطلوب، قم بعدها بإغلاق النافذة بالضغط على إغلاق (Close).

¹ نذكر هنا أن مكان النقر يحدد الجزء الذي يرغب المستخدم بتعديلاته، فمثلاً إذا ما تم النقر على خلقية الرسم فستظهر نافذة فرعية خاصة بألوان الشكل والخلفية وغيرها، وهكذا بالنسبة للمواضع الأخرى في نافذة محرر الرسم.




شكل 27.3: نافذة خصائص الفترات في محرر الرسم.

نافذة خصائص الرسم (Figure Properties) هي نافذة تظهر بعد النقر على أي رسم في شاشة SPSS. يمكن من خلالها تغيير ملحوظات الرسم مثل لون الخطوط، حجم الخطوط، ونوع الخطوط. كما يمكن تغيير ملحوظات المدرج التكراري (Binning) مثل عدد الفترات أو طول كل فترة.

ستلاحظ الآن تغير طول فترات المدرج التكراري وكذلك تغير عدد الأعمدة في الشكل. سنقوم تاليًا بتغيير مظهر قيم بداية ونهاية كل فترة (عامود على الرسم) بحيث تظهر كل القيم على الشكل. لتنفيذ ذلك قم ضمن نافذة محرر الرسم السابقة بالنقر المزدوج على أي قيمة من قيم المحور X فتظهر نافذة فرعية جديدة قم ضمنها باختيار مقاييس (Scale) فتحصل على الخيارات المبينة في الشكل (28.3).

في تلك النافذة الفرعية، وفي الجزء الخاص بمدى توزيع القيم (Range)، سنقوم بتغيير مقدار الزيادة الرئيسية (Major Increment) من 20 إلى 10 درجات، ثم نضغط تطبيق (Apply) بعدها نقوم بـ إغلاق النافذة.

نافذة خصائص الرسم (Figure Properties) هي نافذة تظهر بعد النقر على أي رسم في شاشة SPSS. يمكن من خلالها تغيير ملحوظات الرسم مثل لون الخطوط، حجم الخطوط، ونوع الخطوط. كما يمكن تغيير ملحوظات المدرج التكراري (Binning) مثل عدد الفترات أو طول كل فترة.



شكل 28.3: نافذة خصائص مقاييس الرسم في محرر الرسم.

قد انتهينا من عمل التعديلات على شكل المدرج التكراري للمتغير المطلوب. يمكنك الآن إغلاق نافذة محرر الرسم وإجراء تعديلات على مواضع أخرى في الشكل نفسه أو الانتقال إلى رسم بياني آخر وإجراء أية تعديلات أخرى.


وبنفس الأسلوب يمكن تطبيق أي تعديلات على الرسومات البيانية بحسب الحاجة لها، وستلاحظ عدداً من التغييرات في نوافذ خصائص محرر الرسم بحسب نوع الرسم الذي تقوم بإجراء التعديل عليه.

ومن ضمن الرسومات البيانية الشهيرة في عرض البيانات ما يُعرف بشكل الصندوق والذي يقدم تقريرًا نفس المعلومات التي يقدمها المدرج التكراري مع بعض الإضافات الهامة، ويمكننا تقديم تعريف مبسط لهذا التمثيل البياني الهام بالصورة التالية؛

2.4.3 شكل الصندوق (The Boxplot)

شكل الصندوق هو ببساطة رسم بياني يتم من خلاله توضيح خمسة مقاييس هامة تمثل بحد ذاتها ملخصاً، قد يكون بمفرده كافياً في بعض الأحيان، لتوضيح سلوك البيانات. وهذا الرسم يمكن استخدامه لوصف مجموعة واحدة (متغير واحد) من البيانات أو للمقارنة بين متغيرين أو أكثر، إذ يمكن من خلاله مراقبة تشتت توزيع البيانات عن مركزها وكذلك ملاحظة مدى تمايزها، وأيضاً من خلال شكل الصندوق يمكننا التعرف على القيم المتطرفة بصورة واضحة جداً كما سنرى.


إن المقاييس الخمسة التي يعرضها الصندوق، والتي تسمى أيضاً بـ **ملخص الأرقام الخمسة (Five-Numbers Summary)**، هي القيمتين الدنيا والكبيرة، الربع الأول (Q_1)، الربع الثالث (Q_3)، والوسيط (\tilde{X}). ويكون الشكل التقليدي لرسم الصندوق على الصورة التالية، (شكل (29.3))؛



شكل 29.3: شكل بياني افتراضي لرسم الصندوق موضحاً عليه المقاييس الإحصائية المرتبطة به.

ويلاحظ من الشكل (29.3) أنه إذا لم توجد قيم متطرفة في توزيع البيانات، فإن القيمة العظمى ستكون هي القيمة عند الخط الذي يمثل الحد الأعلى في الصندوق، وكذلك الحال بالنسبة للقيمة الدنيا في البيانات. وللتوضيح كيفية استخدام شكل الصندوق لتمثيل توزيع المتغير ببياناً في برنامج SPSS، سنقوم باستخدامه لتمثيل المتغيرات الثلاثة الأولى من ملف البيانات "بيانات الطلبة"؛

في الشريط العلوي لبرنامج SPSS فتظهر النافذة التالية،
فقط باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Boxplot قم باختيار (شكل (30.3))؛




شكل 30.3: نافذة خيارات شكل الصندوق.

سنقوم هنا باختيار تنفيذ شكل الصندوق البسيط (Simple) والمشار إليه بالسهم رقم (1) في الشكل، (وسنطرق لشكل الصندوق باستخدام التصنيف تالياً)، ونختار تمثيل عدة متغيرات في آن واحد¹ كما يشير السهم رقم (2) في الشكل. ثم نضغط أمر تعريف (Define)، فتظهر نافذة جديدة جديدة كما يوضح الشكل (31.3).

قم في تلك النافذة باختيار المتغيرات الثلاثة الأولى، (وهي درجة الطالب في المقرر 1 والمقرر 2 والمقرر 3)، ونقلها إلى الخانة


العليا في يمين النافذة والمعنونة: الصناديق تمثل (Boxes Represents) كما هو مبين في الشكل، ثم اضغط موافق (OK).



شكل 31.3: نافذة تحديد المتغيرات لشكل الصندوق، (عدة متغيرات آنياً).

فيظهر الشكل المطلوب في نافذة المخرجات، كما يوضح الشكل (32.3). ونلاحظ من الشكل ما يلي:

¹ نشير هنا إلى أن اختيار التمثيل البياني لعدة متغيرات في آن واحد يتم استخدامه فقط عندما تكون المتغيرات لها نفس وحدة القياس وليس من وحدات قياس مختلفة.



شكل 32.3: شكل الصندوق للمتغيرات درجات الطلبة في مقرر 1، 2، و3 في الملف "بيانات الطلبة".

1. اقتراب الصندوق، والذي يمثل كتلة البيانات، في المتغيرين أو المقررين الأولين 1 و 2 إلى الجانب الأعلى في الرسم مما يُظهر التواء إلى اليسار في توزيع البيانات، وهذه دلالة على ارتفاع المستوى الدراسي للطلاب في هذين المقررين. إلا أن ما نراه في المتغير الثالث (المقرر 3) ليس التواء بالمعنى الصحيح، لأن كل المشاهدات في هذا المتغير، باستثناء النقاط (الدرجات) الثلاثة المتطرفة (حيث تمثل القيم على الرسم ترتيب القيمة المتطرفة) في أعلى الرسم، تتحصر في الجانب الأسفل.

2. أغلبية درجات الطالب في المقررين 1 و 2 تتحصر في الفترة (65 إلى 85) تقريباً، أما أغلبية الدرجات في المقرر 3 فتحصر في الفترة (50 إلى 60)، مما يدل على انخفاض مستوى الطالب في المقرر الثالث، كما ذكرنا سابقاً.

3. عدم ظهور قيم متطرفة في المقرر الأول، وظهور قيمة واحدة متطرفة (هي الدرجة 40) في المقرر الثاني، وكذلك ظهور قيم متطرفة دنیا (هما الدرجتان 27 و 33) في المقرر الثالث والتي قد لا تظهر في رسومات أخرى بوضوح، إضافة لقيم المتطرفة الثلاثة الكبرى الظاهرة.

4. انتشار البيانات (مثلاً بطول الصندوق) والذي يمثل تشتت درجات الطالب يبدو أكبر في المقررين 1 و 2 مما هو عليه في المقرر 3، إلا أن ذلك لم يكن جلياً واضحاً في النتائج والرسومات السابقة، ولا حتى بحساب الانحراف المعياري للمقررات الثلاثة؛ (من الشكل 23.3)، الانحرافات المعيارية للمقررات الثلاثة على الترتيب هي 15.605، 15.219، و 14.289 درجة، والتي تبدو مقاربة، وهذه في الواقع إحدى مزايا التمثيل الجيد لتوزيع البيانات في

رسم الصندوق. وننوه هنا إلى أن اقتراب قيمة الانحراف المعياري للمقرر الثالث من قيم المقررین الأولین سببه وجود القيم المتطرفة العلیا التي أدت لرفع قيمته.


من جديد، يمكن استخدام التمثیل البیانی لشكل الصندوق بطريقه تُظهر توزیع المتغیر الأساسي مصنفا بحسب متغیر (أو متغیرین)، فمثلا يمكننا باستخدام بيانات المثال الحالی تنفيذ شكل الصندوق لمتغير عمر الطالب بحسب النوع؛ ذكر أو أنثى.

لعمل ذلك، قم في الشريط العلوي لبرنامج SPSS باختیار Graphs>Legacy Dialogs>Boxplot وفي النافذة التي تظهر في الشکل (30.3) قم باختیار تنفيذ شكل الصندوق البسيط (Simple) والمشار إليه بالسهم رقم (1)، ثم قم باختیار الخيار الأول وهو خیار تمثیل متغیر واحد (Summaries of groups of cases). ثم نضغط أمر تعريف (Define)، فتظهر نافذة جديدة كما هو في الشکل (33.3).



شكل 33.3: نافذة تحديد المتغيرات لشكل الصندوق، (متغیر واحد).

قم في تلك النافذة باختیار المتغیر عمر الطالب في الخانة الأولى العلیا (Variable)، (كما يوضح الشکل)، ثم قم باختیار متغیر التصنيف أو التقسيم وهو متغیر جنس الطالب في الخانة الثانية (Category Axis)، ثم اضغط موافق فيظهر شكل الصندوق المصنف بحسب جنس الطالب في نافذة المخرجات، كما يوضح الشکل (34.3).
ونلاحظ من الشکل بوضوح أن الطلبة الذكور في العينة هم في الغالب أكبر سنًا من الطالبات.



شكل 34.3: شكل الصندوق المصنف لعمر الطالب بحسب النوع للمتغيرات في الملف "بيانات الطلبة".

ويمكن أيضاً، في نفس السياق، استخدام رسم الصندوق لتمثيل متغير ما اعتماداً على تصنifieه باستخدام متغيرين وليس متغير واحد فقط، (كما شاهدنا في الشكل السابق (34.3)). فمثلاً يمكننا في نفس المثال الحالي استخدام

شكل الصندوق لتمثيل متغير عمر الطالب بناءً على متغير الجنس ومتغير عدد حجرات منزله. لتنفيذ ذلك، قم في الشريط العلوي لبرنامج SPSS باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Boxplot التي تظهر في الشكل (35.3) قم باختيار تنفيذ شكل الصندوق المصنف (Clustered) والمشار إليه بالسهم رقم (1)، ثم قم باختيار الخيار الأول والمشار إليه بالسهم رقم (2) وهو خيار تمثيل متغير واحد. ثم اضغط أمر تعريف (Define)، فتظهر نافذة جديدة كما هو في الشكل (36.3).


شكل 35.3: نافذة خيارات شكل الصندوق مع اختيار رسم الصندوق المصنف.

قم في تلك النافذة باختيار المتغير عمر الطالب في الخانة الأولى العليا (Variable)، ثم قم باختيار متغير التصنيف الأول وهو متغير جنس الطالب في الخانة الثانية (Category Axis)، ثم اختر متغير التصنيف الثاني وهو عدد الحجرات في منزل الطالب في الخانة الثالثة (Define Clusters by)، ثم اضغط موافق فيظهر شكل الصندوق المصنف بحسب كلاً من جنس الطالب (في المحور الأفقي) وبحسب عدد حجرات المنزل (مقسماً للذكور وللإناث كل على حده) في نافذة المخرجات، كما يوضح الشكل (37.3).



شكل 36.3: نافذة تحديد المتغيرات لشكل الصندوق، (المتغير واحد مصنف بحسب متغيرين).

ونلاحظ من الشكل ارتفاع أعمار الطلبة الذكور في العينة في العموم، كما أنه يمكن القول بأن الطلبة الذكور في الغالب يقطنون في منازل أعداد حجراتها تتراوح ما بين حجرتين وأربعة حجرات، وأما الطالبات ففيقطن في منازل عدد حجراتها هو ثلاثة أو خمسة أو ستة حجرات على الأكثر.



شكل 37.3: شكل الصندوق لعمر الطالب مصنفاً بحسب النوع وعدد حجرات المنزل للطالب للمتغيرات في الملف "بيانات الطالبة".

3.4.3 الرسم الخطي أو مخطط الزمن (Line or Time Chart)

وهو نوع من الرسومات البيانية التي تهدف إلى توضيح التغير في مفردات البيانات خلال فترة زمنية معينة (سنوات، أشهر...، أو حتى مواسم). ويستخدم هذا النوع من الرسومات في الكثير من المجالات الإنتاجية أبرزها عرض التقارير الاقتصادية والصناعية. والتمثيل البياني لمخطط الزمن يتم برصد نقطة لكل قيمة من قيم المتغير مقابل كل وحدة زمنية ثم توصيل هذه النقاط بخطوط مستقيمة. ولتوضيح كيفية تنفيذ هذا النوع من الرسومات، لأخذ المثال التالي؛

أثناء إجراء دراسة تتعلق باختبار قوة تحمل خليط من المعادن المستخدمة في بناء جدران المنشآت العسكرية، تم في البداية عمل نموذج أولي وتم اختباره 8 مرات خلال ثمانية أشهر متالية مع زيادة درجة الحرارة المحيطة بالتدريج. ثم تم بعد ذلك إضافة معدن جديد لل الخليط وإعادة الاختبار تحت نفس درجات الحرارة المستخدمة مع الخليط الأول فكانت النتائج، (والتي تمثل مقاومة الخليط بالكيلوجرام)، كما هو موضح في الجدول المرفق (جدول (5.3))؛

جدول 5.3: نتائج مقاومة خليط المعادن قبل وبعد إضافة المعدن الجديد خلال فترة ثمانية أشهر.

الشهر	يناير	فبراير	مارس	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
(المقاومة قبل الإضافة)							
(المقاومة بعد الإضافة)							


ونقوم باستخدام مخطط الزمن لتمثيل التغير في مقاومة خليط المعدن قبل الإضافة خلال الأشهر المتلاحقة. وستكون الخطوة الأولى هي إدخال البيانات (في جدول (5.3)) في ملف بيانات جديد في SPSS، ول يكن باسم "مقاومة المعدن" كما يظهر في الشكل (38.3).



شكل 38.3: ملف بيانات "مقاومة المعدن".


بعد إدخال البيانات، قم في شريط الأدوات العلوي باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Line. فتظهر نافذة خيارات الرسم الخطي كما هو في الشكل (39.3). قم باختيار تنفيذ شكل الرسم الخطي البسيط (Simple) والمشار إليه

بالسهم رقم (1)، ثم قم بتحديد الخيار الخاص بتمثيل قيم المشاهدات (Values of individual cases) والمشار إليه بالسهم رقم (2).




شكل 39.3: نافذة خيارات الرسم الخطي.

اضغط بعد ذلك على تعرف (Define) فتظهر نافذة تعريف المتغيرات الخاصة بالرسم المطلوب، (الشكل (40.3))، في تلك النافذة سنقوم باختيار المتغير (المقاومة_قبل_الإضافة) في المربع الأول في الأعلى: الخط يمثل (Line Represents)، ومن أسفل ذلك المربع (Category Labels) نختار خيار متغير (Variable)، ثم نختار متغير "الشهر" في الشريط أدناه فنحصل على الشكل الباقي المطلوب، (شكل (41.3)).



شكل 40.3: نافذة تحديد المتغيرات للرسم الخطي لمتغير واحد.

من الرسم الخطي أو مخطط الزمن في الشكل (41.3)، نلاحظ وجود تذبذب في ارتفاع وانخفاض مقاومة المعدن قبل الإضافة خلال الأشهر المتتالية، فنلاحظ ارتفاع مقاومة المعدن من تجرب شهر يناير حتى شهر مارس ثم انخفاض مقاومة المعدن في شهر ابريل ثم ارتفاعها في مايو وهكذا.




شكل 41.3: الرسم الخطي لمتغير مقاومة_قبل_إضافة في ملف "مقاومة المعدن".

ويمكن أيضا استخدام الرسم الخطي لمقارنة التغير عبر الزمن بين متغيرين (أو أكثر)، ففي المثال الحالي، يمكننا مقارنة مقاومة المعدن قبل وبعد إضافة المعدن الجديد. ولتنفيذ ذلك، نقوم في شريط الأدوات العلوي باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Line.

نقوم باختيار تنفيذ شكل الرسم الخطي المتعدد (Multiple) والمشار إليه بالسهم رقم (3)، ثم نقوم بتحديد الخيار الخاص بتمثيل قيم المشاهدات والمشار إليه بالسهم رقم (2). نضغط بعد ذلك على تعريف (Define) فتظهر نافذة تعريف المتغيرات الخاصة بالرسم المطلوب كما هو موضح في الشكل (40.3) السابق.

في تلك النافذة نقوم باختيار كلا من المتغيرين (المقاومة_قبل_إضافة) و(المقاومة_بعد_إضافة) في الشريط الأول في الأعلى (Line Represents)، ومن أسفل ذلك الشريط (Category Labels) نختار خيار متغير (Variable)، ثم نختار متغير "الشهر" في الشريط أدناه فنحصل على الرسم الخطي المتعدد، (شكل (42.3)). ويُلاحظ من الرسم أن إضافة المعدن الجديد قد أدى إلى زيادة مقاومة الخليط بصورة عامة عبر الأشهر الثمانية.




شكل 42.3: الرسم الخطى لمتغيرى المقاومة_قبل_الإضافة و المقاومة_قبل_الإضافة فى ملف "مقاومة المعدن".

4.4.3 طبيعة توزيع المتغيرات (Normality of Variables)

تعرفنا فيما سبق على استخدام المدرج التكراري وشكل الصندوق لاستكشاف توزيع المتغيرات الكمية، ومن ضمن استخدامات هذين التمثيلين التعرف على التوزيع الاحتمالي للمتغير ما إذا كان طبيعياً أم لا. إلا أن كثير من المتخصصين يفضلون استخدام أسلوب آخر ضمن طرق الرسم البياني¹ للتحقق من توزع المتغير طبيعياً وهو رسم المئيان للمتغير ومطابقتها بغيرياتها في التوزيع الطبيعي. ولتوسيع الصورة لنأخذ المثال التالي؛


في ملف البيانات "بيانات الطلبة"، سنقوم بتطبيق رسم Q-Q للمقارنة بين مدى توزع المتغيرات الثلاثة طبيعياً. من شريط الأدوات العلوي قم باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Q-Q Plots، فنظهر عندها نافذة رسم Q-Q كما هو مبين في الشكل (43.3). في القسم العلوي الأيمن من النافذة (Test Distribution) يمكن ملاحظة وجود الخيار الخاص باختيار التوزيع الاحتمالي الذي ترغب برسم Q-Q له، وفي مثالنا الحالي نرغب برسم Q-Q لبعض المتغيرات ومقارنتها بالتوزيع الطبيعي، والذي يمثل الخيار الافتراضي للرسم.

¹ يمكن الإجماع على أن أفضل الأساليب الإحصائية للتأكد من التوزيع الاحتمالي للمتغيرات، ومن ضمنها التوزيع الطبيعي، هي اختبارات الفروض. وسوف نتطرق لاختبارات الخاصة بالتوزيع الطبيعي في الفقرة القادمة.



شكل 43.3: نافذة رسم Q-Q لملف البيانات "بيانات الطلبة".

سنقوم باختيار المتغيرات الثلاثة الأولى، وهي درجات الطلبة في ثلاثة مقررات، ونقلها إلى خانة المتغيرات، وبعدها نضغط موافق فنحصل على عدة نتائج من أهمها المتوسط والانحراف المعياري للمتغيرات إضافة لرسم Q-Q لكل متغير. وسنعرض في الشكل (44.3) التالي الرسومات للمتغيرات جنبا إلى جنب لتسهيل المقارنة.



شكل 44.3: رسم Q-Q لدرجات الطلبة في المقررات الثلاثة في الملف "بيانات الطلبة".

في رسم Q-Q أو P-P يتم التدقيق في مدى اقتراب النقاط، (والتي تمثل المشاهدات للمتغير)، من الخط القطري المرسوم، (والذي يمثل توزيع النقط الافتراضي للتوزيع الطبيعي)، وبالتالي كلما اقتربت نقاط المتغير من الخط القطري كلما دل ذلك على اقتراب توزيع المتغير من التوزيع الطبيعي. ومن الشكل (44.3) يمكننا القول بأن درجات

الطلبة في المقرر 1 هي الأكثر اقترباً من التوزيع الطبيعي مقارنة بدرجات الطلبة في المقررين الآخرين، ونلاحظ أيضاً ابتعاد المتغير الثالث، (درجات الطلبة في المقرر 3)، عن التوزيع الطبيعي بصورة كبيرة. إلا أنه، وكما ذكرنا سابقاً، يكون من المفضل إحصائياً اختبار توزيع المتغيرات طبيعياً باستخدام اختبارات الفروض وعدم الاعتماد كلياً على الرسم البياني كما سنرى في الفقرة التالية.

5.3 استخدام أسلوب استكشاف البيانات الشامل في SPSS (Using the Explore command in SPSS)

لاحظنا في الأمثلة السابقة كيفية استخدام المقاييس الإحصائية الوصفية والرسومات البيانية عن طريق اختيار أمر التكرارات (Frequencies) والإحصاءات الوصفية (Descriptives) الموجودة تحت قائمة Analyze>Descriptive Statistics) في شريط الأوامر العلوى في البرنامج. والآن سنعرف القارئ بكيفية استكشاف توزيع أو سلوك متغيرات الدراسة بصورة أعم وأشمل عن طريق استخدام أمر استكشاف (Explore) الموجود ضمن نفس القائمة السابقة.

وكمثال تطبيقي لاستكشاف البيانات، سنستخدم الجدول التالي، جدول (6.3)، والذي يضم بيانات تمثل عينة مكونة من 90 طالباً معظمهم من الطلبة القدامى، (الذين تأخر تخرجهم عن المدة الزمنية المعتادة، وهي ثمانية فصول دراسية تقريباً)، في كلية العلوم بجامعة بنغازي مقسمة بحسب التخصص أو القسم العلمي، (رياضيات (MA)، إحصاء (ST)، وفيزياء (PH))، وتشمل معدل الطالب، (على مقياس من 0.00 إلى 4.00 درجة)، جنس الطالب، وعدد الفصول الدراسية التي أنجزها الطالب.


جدول 6.3: معدلات عينة من 90 طالباً من طلبة كلية العلوم في جامعة بنغازي.

م	قسم علمي	جنس	نوع الكلية	رقم	م	قسم علمي	جنس	نوع الكلية	رقم	م	قسم علمي	جنس	نوع الكلية	رقم
1	MA	M	1.96	20	31	ST	F	1.60	12	61	PH	F	1.75	23
2	MA	M	1.57	18	32	ST	M	1.51	14	62	PH	F	1.67	19
3	MA	F	1.48	16	33	ST	F	1.98	14	63	PH	F	1.58	21
4	MA	F	1.58	21	34	ST	M	2.18	18	64	PH	F	1.41	21
5	MA	F	1.80	18	35	ST	F	1.64	18	65	PH	F	1.61	20
6	MA	F	1.26	15	36	ST	F	1.68	16	66	PH	M	1.53	20
7	MA	F	1.69	16	37	ST	F	1.90	17	67	PH	F	1.68	17
8	MA	M	1.26	14	38	ST	F	1.54	18	68	PH	F	1.46	19
9	MA	F	1.60	12	39	ST	M	1.56	13	69	PH	F	1.26	20
10	MA	F	1.89	13	40	ST	F	1.56	13	70	PH	F	1.62	19

(تابع) جدول 6.3: معدلات عينة من 90 طالبا من طلبة كلية العلوم في جامعة بنغازي.

11	MA	F	1.48	12	41	ST	F	1.88	13	71	PH	F	1.57	18
12	MA	F	2.25	11	42	ST	F	1.16	13	72	PH	F	2.09	13
13	MA	M	1.63	11	43	ST	F	1.74	12	73	PH	F	1.57	19
14	MA	F	1.50	11	44	ST	F	1.15	12	74	PH	F	1.45	19
15	MA	F	1.78	11	45	ST	F	1.25	13	75	PH	F	1.67	18
16	MA	F	1.84	11	46	ST	M	1.55	13	76	PH	F	1.78	18
17	MA	M	2.40	11	47	ST	M	1.45	13	77	PH	F	1.68	18
18	MA	M	2.09	11	48	ST	M	1.75	13	78	PH	F	1.53	17
19	MA	F	1.74	11	49	ST	F	2.01	13	79	PH	M	1.66	16
20	MA	F	1.52	9	50	ST	M	1.40	13	80	PH	F	1.66	16
21	MA	M	1.79	9	51	ST	M	1.63	13	81	PH	F	1.84	12
22	MA	F	3.15	8	52	ST	F	1.87	12	82	PH	F	1.79	16
23	MA	F	1.95	2	53	ST	M	1.78	5	83	PH	F	1.63	16
24	MA	F	3.39	7	54	ST	M	1.58	12	84	PH	F	1.73	16
25	MA	F	1.87	7	55	ST	F	1.88	11	85	PH	F	1.60	16
26	MA	F	3.18	8	56	ST	F	1.73	11	86	PH	F	1.75	16
27	MA	F	3.67	8	57	ST	M	1.36	10	87	PH	F	1.75	16
28	MA	F	1.49	8	58	ST	F	1.97	11	88	PH	F	1.81	16
29	MA	F	3.41	8	59	ST	F	1.47	11	89	PH	M	2.13	10
30	MA	F	1.86	7	60	ST	M	1.63	11	90	PH	M	2.31	12

قم بإدخال البيانات في ملف جديد في برنامج SPSS وحفظه باسم "معدلات الطلبة"، (مستخدما القيم 1، 2، و3 لتمييز الأقسام MA، ST، و PH على الترتيب، والقيم 1 و 2 لتمييز الذكور والإإناث على الترتيب)، بعد ذلك قم من شريط الأدوات العلوي باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Explore، وستظهر لك نافذة جديدة كما يوضح الشكل (45.3).




شكل 45.3: نافذة استكشاف البيانات (Explore) لملف "معدلات الطلبة".

في هذه النافذة، يمكنك اختيار المتغيرات التي ترغب في استكشافها، (مثل معدل_الطالب والفصل_الدراسي)، أي يمكنك حساب المقاييس الإحصائية والرسومات البيانية الأساسية لها عن طريق اختيارها ونقلها إلى مربع القائمة الأساسية (Dependent List)، بعد ذلك يمكنك الضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) لاختيار النتائج المطلوبة ثم خيار الرسومات (Plots) لاختيار الرسومات البيانية المطلوبة، مع ملاحظة ترك خيار الاثنين (Both) في أسفل النافذة كما هو.

في هذا المثال، سنترك للقارئ استكشاف بيانات الطلبة باستخدام الخطوات السابقة، وسنقوم باستخدام أمر الاستكشاف (Explore) عن طريق عرض النتائج مقسمة أو مصنفة بحسب تخصص الطالب (القسم_العلمي) وذلك لغرض مقارنة معدلات الطلبة القدامى بين الأقسام.


من جديد، قم باختيار المتغير "معدل_الطالب" في نافذة (Explore) ونقله إلى مربع القائمة (Dependent List)، بعد ذلك قم باختيار متغير التصنيف "القسم_العلمي" ونقله إلى مربع قائمة التصنيف (Factor List). الآن قم بالضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) فتظهر نافذة فرعية كما يظهر في الشكل (46.3)؛



شكل 46.3: نافذة خيار الإحصاءات ضمن نافذة الاستكشاف (Explore)

ستلاحظ في تلك النافذة اختيار مسبق لأمر "وصفي" (Descriptive) والذي سنتركه كما هو، وتلاحظ أسفل منه وجود مربع خيار نسبة الثقة لفترة الثقة للوسط الحسابي للمجتمع (Confidence Interval for Mean) وهي النسبة الافتراضية 95% والتي سنتركها أيضاً كما هي. قم بالنقر على المربع المقابل لخيار المئويات (Percentiles) والذي يوفر بعض المقاييس الهمامة لتوزيع المتغير كما سنوضح تالياً، ولاحظ أنه يمكنك أيضاً اختيار إظهار أبرز القيم المتطرفة للمتغير

في جدول خاص إذا ما قمت بالنقر على الخيار الخاص بها (Outliers)، وهو ما سنقوم بالتعرف له في البند الأخير من هذا الفصل، وسنعتمد هنا على أسلوب آخر لاكتشاف القيم المتطرفة كما سنرى. الآن اضغط استمرار (Continue) في هذه النافذة، وستعود للنافذة السابقة، في الشكل (45.3)، قم بعدها بالضغط على خيار الرسم (Plot) وستظهر نافذة جديدة كما هو موضح في الشكل التالي، شكل (47.3)؛



شكل 47.3: نافذة خيار الرسم ضمن نافذة الاستكشاف.

في المربع الأيمن من النافذة سنقوم باختيار عرض المدرج التكراري (Histogram) إضافة لخيار عرض رسم الساق والورقة (Stem and leaf). وسنقوم أيضاً باختيار عرض رسومات واختبارات التوزيع الطبيعي (Normality plots) في الخانة التي تليها، ثم نضغط استمرار بعد ذلك فنرجع لنافذة الاستكشاف السابقة والتي سنضغط فيها على موافق ليتم تنفيذ كل ما تم اختياره في النافذة الفرعية؛ نافذة الإحصاءات ونافذة الرسم.

في نافذة المخرجات، والتي نفتحها في ملف مخرجات خاص باسم "استكشاف معدلات الطلبة"، ستلاحظ ظهور عدد كبير من الجداول والرسومات البيانية والتي سنفرد البند القادم للتعليق عليها.

6.3 تفسير نتائج استكشاف البيانات (Interpreting the Results of Data Exploration)

تناولنا فيما سبق طرق متعددة لاستكشاف البيانات أو المتغيرات بصورة أحادية، (أي حساب المقاييس الإحصائية واستخدام التمثيل البياني لكل متغير على حده)، وهنا سنستعرض كيفية تفسير أهم النتائج الخاصة باستكشاف المتغيرات الأحادية، وأيضاً الاستكشاف المتضمن للتصنيف بحسب متغير وصفي.

في الفقرات السابقة لهذا البند، تناولنا المثال الخاص بمعدلات الطلبة القديمي، (ملف "معدلات الطلبة")، وتم استخدام أمر استكشاف (Explore) ضمن قائمة (Analyze>Descriptive Statistics) وتعريف المتغير "معدل_الطالب" كمتغير كمي نرحب باستكشاف طبيعته وتوزيعه، ومتغير "القسم_العلمي" كمتغير وصفي يُستخدم لتصنيف معدلات الطلبة بناء على التخصص؛ رياضيات (MA)، إحصاء (ST)، وفيزياء (PH)، وقد اقترحنا تخزين المخرجات باسم "استكشاف معدلات الطلبة".

في نافذة المخرجات هذه، سيكون عرض النتائج بالصورة التالية؛

1. البداية تكون عادة بجدول النتائج، والجدول الأول، الذي هو بعنوان ملخص معالجة المشاهدات (Case Processing Summary)، يتم فيه عرض عدد ونسبة المشاهدات في كل قسم، ونلاحظ أنها 30 مشاهدة لكل قسم بمجموع 90 مشاهدة كلية ولا توجد قيم مفقودة.

2. يضم الجدول الثاني، وهو بعنوان الإحصاءات الوصفية (Descriptives)، المقاييس الإحصائية لمتغير "معدلات_الطلبة" مقسمة بحسب التخصص أي بحسب القسم العلمي للطالب بحيث يضم الجزء الأول من الجدول

نتائج طلبة قسم الرياضيات (MA)، والجزء الثاني نتائج طلبة قسم الفيزياء (PH)، والجزء الثالث نتائج طلبة قسم الإحصاء (ST)، وهذا الترتيب في عرض النتائج هو بحسب الأبجدية الإنجليزية للتقسيمات MA ثم PH ثم ST.

من هذه المقاييس يمكننا استكشاف التالي:

- من قيم الوسط الحسابي (Mean) للطلبة في الأقسام يمكن القول بأن مستوى طلبة قسم الرياضيات هو أعلى من القسمين الآخرين. لاحظ أن القيمة على يمين الوسط الحسابي هي الخطأ المعياري له $(SE(\bar{X}_{MA}))$.
- بناء على ارتفاع قيمة الوسط الحسابي لمعدل طلبة قسم الرياضيات، فإن تقدير الوسط الحسابي لمجتمع معدلات طلبة قسم الرياضيات يتراوح في فترة ثقة أكبر من القسمين الآخرين، $2.25 < \mu_{MA} < 1.75$ ، أي أننا واثقون بنسبة 95% بأن معدلات طلبة قسم الرياضيات ستتراوح في العموم بين حدود الفترة السابقتين. أما بالنسبة لمعدلات طلبة قسمي الفيزياء والإحصاء فإن تقدير متوسطاتها في العموم سيتراوح في مجال أضيق، وهو $1.76 < \mu_{PH} < 1.61$ و $\mu_{ST} < 1.74 < 1.55$ تقريباً على التوالي.
- بمقارنة قيم الوسيط (Median) بقيم الوسط الحسابي لمعدلات الطلبة في كل قسم، نلاحظ أن معدلات الطلبة في قسم الرياضيات تحتوي على قيم متطرفة علياً بشكل ملحوظ، $\bar{X}_{MA} = 2.00 > \tilde{X}_{MA} = 1.79$. أما في قسمي الفيزياء والإحصاء فقيمة الوسيط والوسط الحسابي متقاربة من بعضها البعض.
- بالنظر لقيمة الانحراف المعياري (Std. Deviation) وقيمة المدى (Range) لمعدلات الطلبة في الأقسام، نستطيع القول بأن معدلات طلبة قسم الرياضيات الدراسية هي الأكثر اختلافاً أو تشتتاً، $S.D_{MA} = 0.67$ ، $Rang_{MA} = 2.41 - 0.67$ ، مقارنة بطلبة قسمي الفيزياء والإحصاء. وبالنظر إلى المدى الرباعي (Interquartile Range) فيمكن ملاحظة أن معدلات طلبة قسم الإحصاء هي الأكثر تجانساً. ويؤيد هذه الملاحظة القيم الصغرى والكبرى (Minimum and Maximum) لمعدلات الطلبة في كل قسم.
- قيمة اللتواء (Skewness) تشير إلى وجود التواء حاد إلى اليمين في توزيع معدلات طلبة قسم الرياضيات إليه قسم الفيزياء لكن بالتواء أقل حدة، أما بالنسبة لتوزيع معدلات قسم الإحصاء فيوجد التواء طفيف جداً إلى اليسار.


3. الجدول الثالث بعنوان المئينات (Percentiles) يضم مقاييس المئينات والرباعيات (Quartiles) والتي تعتبر من المقاييس الهامة في اكتشاف توزيع المتغيرات. فمثلاً، القيمة للمئين 25 (الربع الأول أيضاً) للأقسام العلمية الثلاثة تُظهر بأن 25% من معدلات الطلبة هي أقل من المعدل 1.57 تقريباً (1.55 للفيزياء، 1.57 للفيزياء، و 1.50 للإحصاء)، وهذا يعني أن ربع الطلبة مستواهم مقبول فأقل في الأقسام الثلاثة.

أما بالنسبة لقيم المئين 75 (وهي أيضاً قيمة الربيع الثالث)، فإن 75% من طلبة قسم الفيزياء والإحصاء معدلاتهم الدراسية هي مقبول فأقل، (1.75 و 1.87 على التوالي)، وأما بالنسبة لقسم الرياضيات فإن 25% من الطلبة معدلاتهم هي أكبر من 2.13 أي بتقدير جيد، وهذا في المجمل يعني بأن مستوى طلبة قسم الرياضيات هو أفضل، ويمكن التعمق في هذا الاستنتاج من خلال مراقبة قيم المئينات الأخرى في الجدول.

4. الجدول التالي في ترتيب النتائج هو الجدول الخاص باختبار التوزيع الطبيعي، وهو بعنوان (Test of Normality). وهو يضم اختبارين شهيرين هما اختبار شابيرو-ويلك (Shapiro-Wilk Test) واختبار كولموجروف-سميرنوف (Kolmogorov-Smirnov Test)، وكلاهما ويقوم باختبار الفرضية الصفرية التي تنصي بتبعدة توزيع المتغير أو العينة بتوزيع طبيعي؛ (العينة مسحوبة من مجتمع طبيعي: H_0).

وفي جدول النتائج نشاهد قيمة إحصاء الاختبار (Statistic)، ودرجة الحرية (df)، والقيمة الاحتمالية (Sig.). وحيث أن قاعدة قبول أو رفض الفرضية الصفرية هي (إذا كانت القيمة الاحتمالية (P-value) هي أقل من القيمة 0.05 نرفض الفرضية الصفرية)¹، فإنه يمكن القول من اختباري شابيرو-ويلك واختبار كولموجروف-سميرنوف أن معدلات طلبة قسم الإحصاء تتبع التوزيع الطبيعي، ومعدلات طلبة قسم الفيزياء تتراجح بين الطبيعية (اختبار كولموجروف-سميرنوف) وغير الطبيعية (اختبار شابيرو-ويلك)، أما معدلات طلبة قسم الرياضيات فإنها لا تتوزع بتوزيع طبيعي بإجماع الاختبارين.


5. يلي الجداول في ملف المخرجات الرسومات البيانية، وأولها المدرجات التكرارية لمتغير الدراسة بحسب القسم العلمي، وبمقارنة المدرجات التكرارية الثلاثة نلاحظ أن المدرج الخاص بمعدلات قسم الإحصاء هو الأقرب لتشكيل الشكل الناقصي المتماثل الشهير لمنحنى التوزيع الطبيعي، (شكل (48.3))، مع وجود التواء طفيف إلى اليسار.



شكل 48.3: منحنى التوزيع الطبيعي المعياري.

ومدرج معدلات قسم الفيزياء يوجد به التواء ظاهر إلى اليمين مع اقترابه إلى حد ما من التوزيع الطبيعي، أما المدرج التكراري الخاص بمعدلات قسم الرياضيات فهو أبعد ما يكون عن التوزيع الطبيعي مع وجود التواء كبير إلى اليمين في توزيع المشاهدات. وهذه النتائج متوافقة تماماً مع ما سبق. ويمكن متابعة هذه الملاحظات من خلال الشكل (49.3).

¹ حيث أن 0.05 هي احتمال الورق في خطأ من النوع الأول، (رفض الفرضية الصفرية وهي صحيحة).



شكل 49.3: المدرجات التكرارية للمعدلات في أقسام الرياضيات، الفيزياء، والإحصاء، على الترتيب من اليمين إلى اليسار في ملف المخرجات "استكشاف معدلات الطلبة".

6. الرسومات التالية في الترتيب هي رسومات الساق والورقة (Stem-and-Leaf Plots) للأقسام العلمية. وهذه الرسومات هي وسيلة بصرية جيدة في التعرف على توزيع المتغيرات، وبالذات التوزيع الطبيعي في المتغيرات التي تضم مشاهدات قليلة نسبياً. وفكرة رسم الساق والورقة هي بسيطة بحد ذاتها، إذ يمثل العمود الأول إلى اليسار تكرارات قيم المشاهدات للتغير، والعمود الثاني (الأوسط) الذي يمثل "الساق" والثالث الذي يمثل "الورقة" هما القيم الفعلية للمشاهدات موزعة تصاعدياً، (من أعلى الرسم إلى الأسفل)، بحيث يضم كل صف القيم القريبة من بعضها البعض.

ملاحظة:


في مثالنا الحالي، نجد أن الساق قد يمثل خانة القيمة الصحيحة للمعدل بينما تمثل الأوراق القيمة الأولى بعد الفاصلة العشرية، (كما هو الحال في رسمي قسم الرياضيات والإحصاء)، أو قد يمثل الساق خانة القيمة الصحيحة للمعدل مع القيمة الأولى بعد الفاصلة العشرية، (كما نلاحظ في رسم قسم الفيزياء). فمثلاً؛ في الرسم الأول الخاص بقسم الرياضيات نجد في الصنف الأول تحت عمودي الساق والورقة الشكل:

22 . 1 . والقيمة 2 تحت عمود التكرار ، وهذا يتم قراءته كالتالي:

توجد مشاهدتان (معدلان) كلاهما يبدأ بالقيمة 1.2، (وهوتين القيمتين هما فعلياً 1.26 و 1.26) ضمن المشاهدات)، ولهذا تكون قيمة التكرار 2، وهذا الأمر بالنسبة لباقي الصفوف في الرسم.

ولملاحظة ما إذا كان رسم الساق والورقة يعكس توزيعاً طبيعياً للمتغير، يمكنك اعتبار القيم في صفوف الساق والورقة بمثابة الأعمدة في المدرج التكراري، فالنظر إلى رسم الساق والورقة لقسم الإحصاء يمكنك ملاحظة امتداد القيم في الصفوف الوسطى وانحسارها في الصفوف العليا والسفلى، وهذا يشبه التوزيع الذي يمثله منحنى التوزيع الطبيعي ولكن بصورة مقلوبة. والميزة الأساسية في رسم الساق والورقة عن باقي الرسومات أنها توضح قيم


المشاهدات وتركمها (تكرارها) بصورة فعلية واضحة. وهكذا يمكننا من خلال الرسومات الثلاثة للساقي والورقة، (شكل (50.3))، ملاحظة اقتراب توزيع معدلات طلبة قسم الإحصاء من التوزيع الطبيعي بصورة أكبر من توزيع المعدلات في قسم الفيزياء، أما قسم الرياضيات فمعدلات طلبه تتبع عن التوزيع الطبيعي كل البعد، وهذه النتائج مؤيدة لما سبقها من نتائج اختبارات الفروض والمدرجات التكرارية.



شكل 50.3: شكل الساق والورقة للمعدلات في أقسام الرياضيات، الفيزياء، والإحصاء، على الترتيب من اليمين إلى اليسار في ملف المخرجات "استكشاف معدلات الطلبة".

إضافة إلى ما سبق، فإن رسم الساق والورقة يشكل أداة فعالة في التعرف على القيم المتطرفة في المتغير، فنلاحظ في قسم الرياضيات وجود خمسة معدلات متطرفة عليا عند النظر لصف الأخير في الرسم حيث نرى بأن التكرار يساوي 5، وظهور عبارة ($>=3.2$) (Extremes) والتي تدل على وجود قيم متطرفة وهي المعدلات التي هي أكبر من أو تساوي 3.2. وكذلك الأمر بالنسبة لقسم الفيزياء، حيث نرى وجود قيمة متطرفة صغرى (وهي 1.26)، وثلاثة قيم متطرفة عليا هي أكبر من أو تساوي المعدل 2.09. أما بالنسبة لمعدلات طلبة قسم الإحصاء فلا يُظهر الرسم أية قيمة متطرفة.


7. ننتقل الآن لرسم Q-Q، (شكل (51.3))، والذي تعرضنا له سابقاً، ونلاحظ أن رسم Q-Q الخاص بمعدلات طلبة قسم الإحصاء هو الأقرب للتوزيع الطبيعي، أما النقاط على الشكل الخاص بقسم الفيزياء فتبعد عن الخط المستقيم في القيم العليا، أما القيم في رسم معدلات قسم الرياضيات فتبعد في المجمل عن الخط المستقيم، مما يدل على ابتعاد توزيع المشاهدات في هذا القسم عن التوزيع الطبيعي. وهذه النتائج تدور في نفس فلك التعليقات السابقة للأقسام العلمية الثلاثة.



شكل 51.3: رسم Q-Q للمعدلات في أقسام الرياضيات، الفيزياء، والإحصاء، في ملف المخرجات "استكشاف معدلات الطلبة".


8. عندما يتم طلب رسم Q-Q في برنامج SPSS، فإنه يظهر عادة مرفقا لرسم آخر هو "نمط انتشار نقاط رسم (Detrended Normal Q-Q Plot)" "Q-Q". وهذا الرسم يمثل انتشار نقاط المشاهدات الفعلية مع قيمها المعيارية (Z Scores). فالمتغير الذي يتبع توزيعه طبيعيًا تكون النقاط فيه متجمعة أكثر ما يمكن حول الخط المستقيم الأفقي (عند القيمة صفر على المحور الصادي)، مما يعني اقتراب معظم قيم هذا المتغير من المركز، وبالتالي الاقتراب من التوزيع الطبيعي.

وفي مثمنا، نلاحظ، من شكل (52.3)، تجمع النقاط حول الخط الأفقي في الرسم الخاص بقسم الإحصاء، مما يدل على اقتراب توزيع معدلات الطلبة في هذا القسم من التوزيع الطبيعي. وفي الرسم الخاص بقسم الفيزياء، نلاحظ تجمع الكثير من النقاط حول الخط المستقيم وكذلك ابتعاد القيم العليا عنه مما يضع معدلات هذا القسم في موضع الشك في مدى اقترابها من التوزيع الطبيعي. أما معدلات طلبة قسم الرياضيات فهي بعيدة جداً عن التوزيع الطبيعي وهذا ما يعكسه ابتعاد معظم النقاط عن الخط المستقيم على الرسم.



شكل 52.3: رسم نمط انتشار نقاط Q-Q للمعدلات في أقسام الرياضيات، الفيزياء، والإحصاء، على الترتيب من اليمين إلى اليسار في ملف المخرجات "استكشاف معدلات الطلبة".

9. الرسم الأخير في مثنا، وهو شكل الصندوق (Boxplot)، تم عرضه لكل قسم علمي في شكل واحد، (شكل 53.3)، لتسهيل المقارنة بين توزيع المعدلات للأقسام.



شكل 53.3: شكل الصندوق للمعدلات في أقسام الرياضيات، الفيزياء، والإحصاء، على الترتيب من اليسار إلى اليمين، في ملف المخرجات "استكشاف معدلات الطلبة".

ويمكن الحصول على عدة استنتاجات من شكل الصندوق، من أهمها؛

- بالنظر إلى "طول" الصندوق المظلل لكل قسم، والذي يمثل توزيع أو انتشار المشاهدات¹، يمكن ملاحظة أن انتشار البيانات (معدلات الطلبة) في قسم الرياضيات هو الأكبر، وهذا يدل على الاختلاف الكبير في المستوى الدراسي للطلبة القدامى في هذا القسم، وعلى النقيض يمكن ملاحظة تجانس المستوى الدراسي للطلبة القدامى في قسم الفيزياء إلى حد كبير، (نظراً لأنكماش حجم الصندوق الخاص به). أما بالنسبة لقسم الإحصاء، فهناك تجانس إلى حد ما في المستوى الدراسي. وهذه الاستنتاجات قد تم الوصول لها سابقاً بطريقة رقمية من خلال حساب مقاييس التشتت لكل قسم علمي، (مثل الانحراف المعياري والمدى وغيرها).

- الخط الأفقي داخل كل صندوق مظلل، والذي يمثل قيمة الوسيط للمشاهدات لكل قسم، إضافة لارتفاع الصندوق المظلل ككل، يُظهر أن معدلات الطلبة في قسم الرياضيات هي الأعلى مقارنة بباقي الأقسام.

¹ إضافة لطول الأطراف، وهي الخطوط الخارجية من طرفي الصندوق المظلل لأعلى وأسفل، والتي تمثل القيم العليا والصغرى للمشاهدات ضمن سياق القيم المعتدلة، أي باستثناء القيم المتطرفة.

- النقاط المرقمة أعلى و/أو أسفل الصندوق تمثل القيم المتطرفة في المشاهدات، وهذه الأرقام تمثل ترتيب هذه القيم في المتغير. ويمكن بوضوح رؤية أن قسم الرياضيات يحتوي على خمسة قيم متطرفة عليا، (أكبرها هي القيمة السابعة والعشرون في المتغير، وهو المعدل 3.67 في ذلك القسم). وأما معدلات الطلبة في قسم الفيزياء، فتضم ثلاثة قيم متطرفة عليا، (أكبرها القيمة التسعون، وهو المعدل 2.31 في ذلك القسم)، وقيمة متطرفة صغرى، (القيمة التاسعة والستين، وهو المعدل 1.26 في ذلك القسم). وأما قسم الإحصاء فلا تظهر فيه معدلات متطرفة للطلبة القدامى.

وبهذا نكون قد استعرضنا أهم الاستنتاجات التي تم الحصول عليها من خلال استخدام بعض أدوات الإحصاء الاستكشافي الأساسية، وقد تكون من أبرز ملاحظات القارئ هي تكرار الحصول على نفس النتائج من خلال استخدام مقاييس إحصائية أو رسومات بيانية مختلفة، وأن هذا قد يُعد إهداراً لوقت، إلا أننا نجح هنا ببساطة إلى أن الحصول على نفس النتيجة أو الاستنتاج باستخدام أساليب مختلفة يُعد تأكيداً لهذا الاستنتاج ويعطي الباحث المزيد من الثقة والثبات في نتائج تحليله الإحصائي.

وكتمرين إضافي للقارئ، نقترح إعادة تطبيق هذا البند على نفس المتغير "معدل_الطالب" في ملف البيانات "معدلات الطلبة" بطريقتين:

1. باستخدام المتغير "جنس_الطالب" كمتغير تقسيم بدلاً عن المتغير "القسم_العلمي".
2. بدون إدراج متغير تقسيم، أي ترك مربع (Factor List) في نافذة استكشاف البيانات (Explore) في الشكل (45.3) فارغاً.

7.3 استكشاف القيم المتطرفة (Exploring the Extreme Values)

من خلال استخدامنا للتمثيل البياني للمتغيرات مثل المدرج التكراري وشكل الصندوق في الأمثلة السابقة، لاحظنا ظهور بعض القيم المتطرفة في بعض المتغيرات، وفي هذا البند، سنقدم طريقة تحديد هذه القيم المتطرفة من خلال استخدام أحد خيارات أسلوب الاستكشاف في برنامج SPSS، والذي تمت الإشارة إليه سابقاً؛

في ملف البيانات "معدلات الطلبة"، قم في شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Explore فتظهر نافذة الاستكشاف، كما يظهر في الشكل السابق (شكل (45.3))، قم في تلك النافذة باختيار المتغيرين "معدل_الطالب" و"الفصل_الدراسي" ونقلهما إلى مربع القائمة الأساسية (Dependent List). بعد ذلك اضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) في يمين النافذة فتظهر النافذة الفرعية الخاصة بالإحصاءات كما يظهر في الشكل السابق، (شكل (46.3)).

في تلك النافذة الفرعية سنقوم باختيار خيار القيم المتطرفة (Outliers) فقط ثم نضغط استمرار. وبعد العودة للنافذة الأساسية، سنختار عرض الإحصاءات فقط (Statistics) في الجزء الخاص بخيارات العرض (Display) في أسفل النافذة، ثم نضغط موافق.

في نافذة المخرجات، سنجعل على جدولين؛ الأول هو الجدول الخاص بأحجام العينات وعدد القيم المفقودة، وأما الجدول الثاني، (جدول 7.3 هنا)، فهو الجدول الخاص بالقيم المتطرفة. بالنسبة لمتغير معدل الطالب، فإن الجدول يظهر قيم متطرفة عليا (Highest) وصغرى (Lowest) لهذا المتغير، فمثلاً، نلاحظ وجود خمسة قيم متطرفة عليا (حيث أن العمود الثاني من اليمين (Case Number) يمثل ترتيب القيم المتطرفة في المتغير، والعمود الأول من اليمين (Value) يعرض القيمة المتطرفة)، وهي 3.67، 3.41، 3.39، 3.18، 3.15، و3.67.

جدول 7.3: القيم المتطرفة للمتغيرين "معدل_الطالب" و"الفصل_الدراسي"
في ملف البيانات "معدلات الطلبة".

Extreme Values			
		Case Number	Value
معدل الطالب	Highest	1	27
		2	29
		3	24
		4	26
		5	22
	Lowest	1	44
		2	42
		3	45
		4	69
		5	8
الفصل الدراسي للطالب	Highest	1	61
		2	4
		3	63
		4	64
		5	1
	Lowest	1	23
		2	53
		3	30
		4	25
		5	24

a. Only a partial list of cases with the value 1.26 are shown in the table of lower extremes.
b. Only a partial list of cases with the value 20 are shown in the table of upper extremes.

أما القيم المتطرفة الصغرى لهذا المتغير فهي أكثر من خمسة قيم حيث أن وجود الحاشية (a) فوق القيمة 1.26 يعني أنه قد تم عرض جزء فقط من القيم المتطرفة الصغرى لهذا المتغير. وهذا يعني أن الطلبة الذين تحصلوا على معدلات 3.15 فأكثر أو معدلات تتراوح حول المعدل 1.26 قد تم تصنيف معدلاتهم بأنها متطرفة بالنسبة لبقية الطلبة في الكلية.

وكذلك الأمر بالنسبة للمتغير الثاني، وهو الفصل الدراسي للطالب، فإن ترتيب الفصول الدراسية حول القيمة 20، (وال المشار إليه بالحاشية (b))، قد تم تصنيفهم بأنهم اجتازوا الحد الطبيعي لعدد الفصول الدراسية في هذه الكلية، أي أنهم قد تأخرموا في التخرج. وأما الطلبة الذين ترتيب فصولهم الدراسية 2، 5، و 7 فقد تم تصنيفها كقيم متطرفة صغرى مقارنة بباقي الطلبة.

من جديد، يمكننا باستخدام نفس نافذة الاستكشاف عرض القيم المتطرفة لمتغير أو أكثر باستخدام متغير تصيف وصفي أو أكثر كما سنرى؛

لنفس ملف البيانات "معدلات الطلبة"، قم في شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Explore وفي نافذة الاستكشاف، (شكل (45.3))، قم في تلك النافذة باختيار المتغير "معدل_الطالب" ونقله إلى مربع القائمة الأساسية (Dependent List)، واختيار المتغيرين "القسم_العلمي" و"جنس_الطالب" ونقلهما إلى مربع قائمة التصنيف (Factor List).

بعد ذلك اضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) في يمين النافذة وفي النافذة الفرعية الخاصة بالإحصاءات، (شكل (46.3))، قم باختيار خيار القيم المتطرفة (Outliers) فقط ثم اضغط استمرار. وبعد العودة للنافذة الأساسية، اختر عرض الإحصاءات فقط في الجزء الخاص بخيارات العرض في أسفل النافذة، ثم اضغط موافق.

في نافذة المخرجات، وإلى جانب الجداول الخاصة بأحجام العينات وعدد القيم المفقودة، سنلقي الضوء أولاً على الجدول الخاص بالقيم المفقودة لمتغير معدل الطالب مصنفا بناء على القسم العلمي الذي يتبعه الطالب، (جدول (8.3)):

جدول 8.3: القيم المتطرفة لمتغير "معدل_الطالب" مصنفا بحسب المتغير "القسم_العلمي" ، (ملف البيانات "معدلات الطلبة").

Extreme Values			
	قسم الطالب	Case Number	Value
معدل الطالب	MA	Highest 1	27
		2	29
		3	24
		4	26
		5	22
	ST	Lowest 1	8
		2	6
		3	11
		4	3
		5	28
	Highest	1	2.18
		2	2.01
		3	1.98
		4	1.97
		5	1.90

(تابع) جدول 8.3: القيم المتطرفة للمتغير "معدل_الطالب" مصنفاً بحسب المتغير "القسم العلمي" (ملف البيانات "معدلات الطلبة").

	Lowest	1	44	1.15
		2	42	1.16
		3	45	1.25
		4	57	1.36
		5	50	1.40
PH	Highest	1	90	2.31
		2	89	2.13
		3	72	2.09
		4	81	1.84
		5	88	1.81
	Lowest	1	69	1.26
		2	64	1.41
		3	74	1.45
		4	68	1.46
		5	78	1.53 ^a

a. Only a partial list of cases with the value 1.53 are shown in the table of lower extremes.

ومن هذا الجدول يمكننا ملاحظة التغييرات التي حدثت نتيجة استخدام متغير التصنيف "القسم العلمي" للطالب، فالقيم المتطرفة العليا لمعدلات الطلبة أصبحت مختلفة في كل قسم بحيث أن؛

- معدلات الطلبة المتطرفة العليا تتراوح ما بين 3.15 و 3.67، في قسم الرياضيات (MA)، وتتراوح ما بين 1.90 و 2.18 في قسم الإحصاء (ST)، وتتراوح ما بين 1.81 و 2.31 في قسم الفيزياء (PH).
- معدلات الطلبة المتطرفة الصغرى تتراوح ما بين 1.26 و 1.49، في قسم الرياضيات (MA)، وتتراوح ما بين 1.15 و 1.40 في قسم الإحصاء (ST)، وتتراوح حول 1.53 في قسم الفيزياء (PH).

وهذا يعني أن ما يُعد قيمة متطرفة في قسم معين قد لا يكون كذلك في قسم آخر، وهذا التصنيف قد يكون أكثر دقة في كثير من الأحيان في غياب التجانس في مستوى الطلبة بين الأقسام العلمية المختلفة. فمن النتيجة السابقة نستطيع القول بأن المعدلات المرتفعة "المتطرفة" للطلبة في قسم الرياضيات هي التي أدت لرفع الوسط الحسابي لمعدلات الطلبة في هذا القسم عن المعدلات في القسمين الآخرين.

وثانياً، بالنسبة للجدول الآخر في نافذة المخرجات، (جدول (9.3))، فيمكن ملاحظة أن؛

- معدلات الطلبة المتطرفة العليا تتراوح ما بين 2.09 و 2.40 للطلبة الذكور، وتتراوح ما بين 3.15 و 3.67 للطالبات.
- معدلات الطلبة المتطرفة الصغرى تتراوح ما بين 1.26 و 1.51 للذكور وتتراوح ما بين 1.15 و 1.26 للطالبات.

وهذا يسوف يعطي الانطباع بأن المستوى الدراسي للطالبات في العموم هو أعلى من الطلبة الذكور لأن القيم المتطرفة العليا ستؤدي لارتفاع الوسط الحسابي لمعدلات الطالبات.

جدول 9.3: القيم المتطرفة للمتغير "معدل_الطالب" مصنفاً بحسب المتغير "جنس_الطالب"، (ملف البيانات "معدلات الطلبة").

Extreme Values				
جنس الطالب			Case Number	Value
معدل الطالب	M	Highest	1	17
			2	90
			3	34
			4	89
			5	18
	Lowest	1	8	1.26
		2	57	1.36
		3	50	1.40
		4	47	1.45
		5	32	1.51
F	Highest	1	27	3.67
		2	29	3.41
		3	24	3.39
		4	26	3.18
		5	22	3.15
	Lowest	1	44	1.15
		2	42	1.16
		3	45	1.25
		4	69	1.26
		5	6	1.26

وعادة ما نقوم "بربط" النتائج الخاصة بالقيم المتطرفة بالنتائج العامة إذا ما تبين لنا وجود تأثير هام لتلك القيم ضمن متغيرات الدراسة، حيث أن زيادة عدد قيمة التطرف في مشاهدات المتغير تؤدي لتغيير النمط الذي يُظهره هذا المتغير.

الفصل الرابع

تحليل البيانات الاستدلالي في SPSS (Inferential Data Analysis in SPSS)

في الفصل السابق تناولنا أهم الطرق الإحصائية من مقاييس وتمثيل بياني لاستكشاف ووصف البيانات بغية الوصول لفهم واضح حول توزيع هذه البيانات وتحديد الأنماط التي تتبعها وتحويل ذلك إلى معلومات "تمهيدية" يمكن الاستفادة منها. وفي هذا الفصل، سنقوم باستعراض الأساليب الإحصائية التي تتضمن طرق تقدير المعالم وأختبارات الفروض المتعلقة بها، ويشمل ذلك تقدير معلم النماذج الإحصائية المختلفة، وذلك بهدف الوصول للمعلومات الكامنة ضمن طيات البيانات بصورة أكثر عمقة مما تم الوصول له بالأساليب الاستكشافية. وتدرج كل تلك المواضيع تحت مفهوم علم الإحصاء الاستدلالي (أو الاستنتاجي)، ذلك العلم الذي يتكون من مجموعة من الطرق التي تستخدم في استنتاج التقديرات والوصول لدلالات وأختبار الفرضيات الإحصائية المتعلقة بمجتمع ما أو أكثر.

1.4 الاستدلال حول الوسط الحسابي للمجتمع (Inference about the Population Mean)

يُقصد بالاستدلال حول الوسط الحسابي للمجتمع هنا تقدير معلمة المجتمع بنقطة أو بفترة، وأختبار مساواتها لقيمة مفترضة، ويندرج هذا الموضوع في كثير من كتب الاستدلال الاحصائي تحت عنوان تقدير أو اختبار العينة الواحدة والعينتين. وسنبدأ بتناول المجتمع الواحد.

1.1.4 الاستدلال حول الوسط لمجتمع واحد (Inference about the Mean of One Population)

توجد عدة صيغ لتقدير فترة الثقة للوسط الحسابي للمجتمع μ وإجراء الاختبارات المتعلقة به، وهذه الصيغ تختلف باختلاف حجم العينة ومعلومية تباين المجتمع، لذلك سيتم عرض الصيغة النظرية لفترة الثقة بمعلومية تباين المجتمع σ^2 ،

يتم تعريف $100(1-\alpha)\%$ فترة ثقة للوسط الحسابي μ بالصيغة التالية:

$$\mu_X: \bar{X} \mp Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

حيث \bar{X} هو الوسط الحسابي لعينة حجمها n مسحوبة من هذا المجتمع، و $Z_{\alpha/2}$ هي قيمة الإحصاء Z التي تتبع التوزيع الطبيعي المعياري باحتمال قدره $\alpha/2$.

ويتم اختبار الفرضية الصفرية (أو فرضية العدم):


$$H_0: \mu = \mu_0$$

عند مستوى معنوية α باستخدام الإحصاء Z_c بالصورة:

$$Z_c = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

ولعمل استدلال حول الوسط الحسابي لمجتمع في برنامج SPSS، نقوم أولاً بفتح ملف البيانات، وليكن ملف "بيانات الطلبة" على سبيل المثال. في هذا الملف، لفرض أننا نريد أولاً تقدير فترة الثقة لمجتمع أعمار الطلبة في تلك الكلية، واختبار فرضية حول قيمة معينة لمتوسط المجتمع (معلمة المجتمع)، فنقوم بالآتي:

في شريط الأدوات العلوي اختر الأمر Analyze>Compare Means>One-Sample T Test، فتظهر النافذة التالية، شكل (1.4)؛



شكل 1.4: نافذة تقدير واختبار الوسط الحسابي لمجتمع واحد (ملف بيانات "بيانات الطلبة").

لتقدير الوسط الحسابي لمتغير العمر، μ ، قم باختيار المتغير "عمر الطالب بالسنوات" ونقله إلى مربع متغير الاختبار (Test Variable(s)). الآن، ومن أمر خيارات (Options) يمكنك تحديد نسبة الثقة التي ترغب بتقدير فترة الثقة عندها، وتكون عادة النسبة الافتراضية 95%， وإذا رغبت بإيقائها كما هي فلا داعي للضغط على أمر خيارات. بعد ذلك قم بتحديد القيمة التي سيتم اختبار المعلمة عنها، ولتكن 22 سنة على سبيل المثال، أي أننا سنختبر الفرضية الصفرية $H_0: \mu = 22$. قم بكتابة 22 في مربع قيمة الاختبار (Test Value)، ثم اضغط موافق (OK).

ستظهر في نافذة المخرجات النتائج التالية، (الجدولين 1.4) و(2.4))، حيث يضم الجدول الأول حجم العينة، الوسط الحسابي للعينة (\bar{X})، الانحراف المعياري للعينة ($SD(X)$)، والخطأ المعياري للمقدار ($SE(\bar{X})$). وهذه المقاييس يمكن الحصول عليها باستخدام بطرق أخرى كما رأينا في الفصل الثالث، إلا أنها تأتي هنا مرفقة لأمر تقدير فترة الثقة واختبار الفروض.

جدول 1.4: جدول الإحصاءات لعينة واحدة لمتغير "العمر" في ملف "بيانات الطلبة".

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
عمر الطالب بالسنوات	35	22.14	1.648	.278

أما الجدول الثاني، (جدول 2.4))، فيضم قيم إحصاءة الاختبار¹ ودرجة الحرية لها، والقيمة الاحتمالية للاختبار وهي للاختبار من طرفين، (حيث لا يتوفّر هنا خيار إجراء الاختبار من طرف واحد)، وقيمة الفرق ($P\text{-value}$) وفترة الثقة للوسط الحسابي ($\bar{X} - \mu_0$).

جدول 2.4: جدول اختبار الوسط الحسابي لعينة واحدة لمتغير "العمر" في ملف "بيانات الطلبة".

One-Sample Test						
	Test Value = 22					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
عمر الطالب بالسنوات	.513	34	.611	.143	-.42-	.71


ومن هذه النتيجة، يمكن القول أننا نميل لقبول الفرضية الصفرية (حيث أن $P\text{-value} > 0.05$) بنسبة ثقة 95%， مما يعني قبول الادعاء القائل بأن متوسط أعمار الطلبة في المجتمع هو 22 سنة، وأن تقدير القيمة الحقيقية (المعلمة) لهذا المتوسط سيتراوح ما بين $(22.708 \leq 21.576 \leq 23)$ سنة.

1.1.1.4 استخدام أعمدة الخطأ (Using the Error Bars)

لنفرض بأننا نرغب في المثال السابق بالمقارنة بين فترات الثقة لمتوسط مجتمع درجات الطلبة للمقررات (المتغيرات) الثلاثة "مقرر 1"، "مقرر 2"، و"مقرر 3" في ملف البيانات "بيانات الطلبة". عندها يمكن استخدام الرسم البياني لأعمدة الخطأ (Error Bars) في تنفيذ ذلك. من شريط الأوامر العلوي نقوم باختيار الأمر Graphs>Legacy Dialogs>Error Bar.


¹ ننوه هنا إلى أنه في معظم البرامج الإحصائية يتم إطلاق مسمى اختبار t على الاختبارات التي تتضمن استخدام كلا من التوزيع الطبيعي Z وتوزيع t حيث أن قيم الإحصاء في التوزيع الثاني تقترب من التوزيع الطبيعي بزيادة حجم العينة.

في تلك النافذة، سنقوم بإبقاء اختيار الأعمدة البسيطة (Simple) كما هو ولكن سنختار التنفيذ لعدة متغيرات



(Summaries of separate variables) ثم نضغط على (Define) فتظهر نافذة جديدة كما في الشكل (3.4). في هذه النافذة، سنقوم باختيار المتغيرات التي نرغب بتنفيذ أعمدة الخطأ لها، (وهي المتغيرات الثلاثة الأولى في قائمة المتغيرات)، ونقلها إلى مربع أعمدة الخطأ (Error Bars) في يمين النافذة.


شكل 2.4: نافذة أعمدة الخطأ (Error Bars)



شكل 3.4: نافذة تعريف المتغيرات لرسم أعمدة الخطأ (ملف بيانات "بيانات الطلبة").

وتحت مربع أعمدة الخطأ، يوجد خيار خاص بما ستمثله هذه الأعمدة، (Bars Represent)، وإذا ما ضغطت على السهم الخاص به ستظهر ثلاثة خيارات هي؛ فترة الثقة للوسط، الخطأ المعياري للوسط، والانحراف المعياري. في مثالنا سنقي على الخيار الأول الافتراضي، وكذلك سنقي على اختيار 95% نسبة ثقة للفترة، ونضغط موافق في أسفل النافذة. سيظهر بعدها رسم أعمدة الخطأ للمتغيرات الثلاثة المختارة في نافذة المخرجات، كما نشاهد في الشكل (4.4). من الشكل يمكننا ملاحظة ارتفاع مستوى أداء الطلبة في المقررين 1 و 2 مقارنة بأدائهم في المقرر 3، (لاحظ أن النقطة المستديرة في منتصف كل عمود تمثل متوسط العينة).

وأيضاً يمكننا القول إنه في العموم، وكتقدير لمتوسط المجتمع الذي يمثل درجات الطلبة في المقررات الدراسية، أن مستوى الطلبة في المقررين 1 و 2 سيتراوح بين جيد وجيد جداً، (من 66 إلى 77 درجة تقريباً)، وأما في المقرر 3 فسيتراوح ضمن درجات التقدير مقبول.




شكل 4.4: التمثيل البياني لأعمدة الخطأ للمتغيرات "مقرر 1"، "مقرر 2"، و"مقرر 3"، (ملف بيانات "بيانات الطلبة").

ويمكن أيضاً استخدام أعمدة الخطأ للمقارنة بين فترات الثقة لمتغير واحد بناء على متغير تقسيم وصفي، فمثلاً، يمكننا تقدير ورسم فترتي ثقة لمتغير عمر الطالب، في نفس ملف البيانات "بيانات الطلبة" للذكور وللإناث ومقارنة الأداء الدراسي لكل منها.


في شريط الأوامر العلوي قم باختيار الأمر Graphs>Legacy Dialogs>Error Bar، ثم اختر التنفيذ لمجموعات من المشاهدات (Summaries for groups of cases) (Define)، ثم اضغط تعرف (Define) فتظهر نافذة جديدة كما في الشكل (5.4).

في هذه النافذة، سنقوم باختيار تمثيل أعمدة الخطأ لمتغير عمر الطالب باستخدام متغير جنس الطالب كمتغير تقسيم. قم، كما هو موضح في الشكل (5.4)، باختيار المتغير "عمر الطالب بالسنوات" في مربع المتغير (Variable)، ثم قم باختيار المتغير "جنس الطالب" في مربع محور التصنيف (Category Axis)، مع إبقاء (Category Axis) الخيار الافتراضي لفترة الثقة للوسط الحسابي، وخيار 95% نسبة ثقة للفترة كما هما.



شكل 5.4: نافذة اختيار تنفيذ أعمدة الخطأ لمجموعات من المشاهدات ضمن متغير باستخدام تقسيم لمتغير وصفي، (ملف بيانات "بيانات الطلبة").

بعد الضغط على موافق، سيظهر التمثيل البياني المطلوب لأعمدة الخطأ لعمر الطالب بناء على تقسيم المشاهدات بحسب جنس الطالب، (شكل (6.4)). ومن هذه الأعمدة يمكننا ملاحظة وجود ارتفاع ملحوظ في أعمار الطلبة الذكور مقارنة بالطالبات. كما يمكننا القول بأن تقدير الوسط الحسابي لمجتمع أعمار الطلاب الذكور سيكون في العموم أعلى من تقدير الوسط الحسابي لمجتمع أعمار الطالبات بنسبة ثقة 95%.



شكل 6.4: التمثيل البياني لأعمدة الخطأ لمتغير عمر الطالب بناء على تقسيم المشاهدات بحسب جنس الطالب، (ملف بيانات "بيانات الطلبة").

2.1.4 الاستدلال حول الوسط لمجتمعين (Inference about the Mean of Two Populations)

1.2.1.4 الاستدلال للعينات المستقلة (Inference about Independent Samples)

تعرف الصيغة العامة لـإحصاء اختبار الفرق بين متosteين ($H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$) بالصورة التالية:

$$Z_c = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}}$$

وذلك في الحالات التي تتضمن العينات المستقلة الكبيرة أو عند توفر قيم التباين للمجتمعين، ويُستخدم إحصاء t في الحالات الأخرى، (صغر حجم العينة أو عدم توفر معلومات حول تباينات المجتمعين)، والتي يجب أن يكون من المعلوم فيها تساوي أو عدم تساوي تباينات المجتمعين.

وتوجد طريقتين لإجراء استدلال حول الفرق بين الوسطين الحسابيين لمجتمعين في برنامج SPSS، الطريقة المختصرة والطريقة المطولة.

في الطريقة المختصرة: يتم إدخال قيم كل من حجم العينة، الوسط الحسابي للعينة، والانحراف المعياري للعينة وذلك لكل من العينتين مباشرة في نافذة التحليل كما سنوضح في المثال التالي؛


لنفرض أننا نريد إجراء استدلال إحصائي لفرق بين وسطي مجتمعات درجات الطلبة في المقررين 1 و 2 في ملف البيانات "بيانات الطلبة"، أي نريد اختبار الفرضية الصفرية؛ $0 = \text{مقرر}_2 \mu - \text{مقرر}_1 \mu$ ، وتقدير 95% فترة ثقة للفرق بينهما. لتنفيذ ذلك نحتاج لحساب قيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينتين (أي للمتغيرين) أولاً.

وبالتالي إما أن تكون قد حصلنا على تلك القيم من التحليل الاستكشافي للمتغيرين مسبقاً، أو نقوم بحساب تلك المقاييس مباشرة. في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Descriptives ثم اختيار المتغيرين "مقرر 1" و"مقرر 2" واختيار الوسط الحسابي والانحراف المعياري فقط من أمر الخيارات (Options) ثم الضغط على موافق فتححصل على القيم المطلوبة في نافذة المخرجات، (جدول (3.4)).

جدول 3.4: الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمقرري 1 و 2 في ملف البيانات "بيانات الطلبة".

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
درجة الطالب في المقرر 1	35	71.31	15.605
درجة الطالب في المقرر 2	35	72.97	15.219
Valid N (listwise)	35		

من جديد، وفي شريط الأدوات العلوي، قم باختيار Analyze>Compare Means>Summary فتظهر نافذة كما في الشكل (7.4). قم بإدخال القيم المطلوبة كما هو موضح في الشكل ثم اضغط موافق فتظهر النتائج مماثلة بثلاثة جداول في نافذة المخرجات، (جدول (4.4)).



شكل 7.4: نافذة إدخال القيم الخاصة بالاستدلال حول الفرق بين وسطي مجتمعين، (الطريقة المختصرة)، (ملف بيانات "بيانات الطلبة").

الجدول الفرعي الأول (أ) يضم قيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري والخطأ المعياري للوسط للعينتين. ويضم الجدول الفرعي الثاني (ب) نتائج اختبار الفرق بين الوسطين في حالتين؛ الأولى بافتراض تساوي تبايني المجتمعين، (Equal variances assumed)، والثانية بافتراض عدم تساوي تبايني المجتمعين، (assumed).

جدول 4.4: نتائج الاستدلال حول الفرق بين الوسطين الحسابيين لمجتمعين المقررین 1 و 2 في ملف البيانات "بيانات الطلبة".

Summary Data (أ)

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Sample 1	35.000	71.310	15.060	2.546
Sample 2	35.000	72.970	15.200	2.569

Independent Samples Test (ب)

	Mean Difference	Std. Error Difference	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	-1.660	3.617	-.459	68.000	.648
Equal variances not assumed	-1.660	3.617	-.459	67.994	.648

Hartley test for equal variance: F = 1.019, Sig. = 0.4783

95.0% Confidence Intervals for Difference (ج)

	Lower Limit	Upper Limit
Asymptotic (equal variance)	-8.749	5.429
Asymptotic (unequal variance)	-8.749	5.429
Exact (equal variance)	-8.877	5.557
Exact (unequal variance)	-8.877	5.557

وفي أسفل الجدول الفرعي الثاني (ب)، نلاحظ وجود نتائج اختبار تساوي تبايني المجتمعين، (اختبار هارتلی (Hartley test for equal variance))، ومنه يتضح قبول الفرضية الصفرية $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$: H_0 ، وبالتالي اعتماد نتائج اختبار الفرق بين وسطي المجتمعين الخاصة به في الصف الأول من الجدول. ومن هذه النتيجة نخلص إلى قبول الفرضية $\mu_2 - \mu_1 = 0$ ، حيث أن $P\text{-value} = 0.648$ ، أي الاعتقاد بتساوي معدلات درجات الطلبة في مجتمعي المقررین 1 و 2.

وأما الجدول الفرعي الثالث (ج)، فيضم فترة الثقة للفرق بين وسطي مجتمعي المقررین 1 و 2، (بتقدير تقريبي Asymptotic) وتقدير محدد (Exact)، ومنه يتضح أن $\mu_2 - \mu_1 < 5.55$ ، وهذا يعني أن درجات الطلبة في المقرر 1 ستكون في العموم أقل من درجات الطلبة في المقرر 2، وذلك بسبب كون الفرق بين التقديرتين هو أقرب للقيمة السالبة (-8.87).

أما في **الطريقة المطولة**: فيجب إدخال العينتين، (المطلوب تقدير الفرق بين متوسطات مجتمعيهما)، في متغير (عامود) واحد، وإدراج متغير وصفي يضم رمز التمييز بينهما، والمثال التالي يوضح هذه الطريقة. الجدول (5.4) يضم بيانات تمثل النتائج التي حصل عليها 20 شخصاً أجرروا مقابلات شخصية للعمل في قسم الموارد البشرية في شركتين، (حيث كان التقييم من 100 درجة):

جدول 5.4: نتائج المقابلات الشخصية
في الشركتين.

نتائج الشركة 2		نتائج الشركة 1	
70	1	71	1
56	2	55	2
60	3	62	3
71	4	70	4
20	5	23	5
58	6	56	6
82	7	80	7
75	8	74	8
65	9	66	9
70	10	68	10
40	11	43	11
55	12	56	12
89	13	90	13
57	14	56	14
40	15	42	15
71	16	70	16
70	17	68	17
39	18	40	18
60	19	58	19
59	20	60	20

و سنقوم بإدخال هذه البيانات في ملف جديد في SPSS باسم "المقابلات الشخصية"، عن طريق إدخال نتائج الشركة 1 متبوعة بنتائج الشركة 2 في عمود واحد، ثم إدخال رمز يميز بين نتائج الشركتين في العمود الثاني كما هو موضح في الشكل (8.4)، والذي يمثل مقطعاً من البيانات، مع التوضيح هنا إلى أنه تم إدخال القيمة 1 كرمز لشركة 1، والقيمة 2 كرمز لشركة 2 ثم تعريف ذلك في عمود القيم (Values).


الشركة	نتائج_الم مقابلات
16	70
17	68
18	40
19	58
20	60
21	70
22	56
23	60
24	71

شكل 8.4: مقطع من ملف بيانات
الم مقابلات الشخصية.

$$H_0: \mu_{\text{شركة 2}} - \mu_{\text{شركة 1}} = 0$$

و تقدير 95% فترة ثقة للفرق

بينهما، نقوم من شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Compare Means>Independent Samples T-Test فتظهر النافذة الخاصة بتعريف المتغيرات كما في الشكل (9.4)؛ في تلك النافذة، قم باختيار المتغير "نتائج_الم مقابلات" ونقله لمربع متغير الاختبار (Test Variable)، ثم قم بنقل المتغير "الشركة" إلى مربع متغير "التصنيف" (Grouping Variable)، وعندها "سيضيفي" أسفل ذلك المربع الأمر الخاص بتعريف التصنيفات أو المجموعات (Define Groups)، قم بالضغط عليه لتعريف العينة الأولى والثانية.



شكل 9.4: نافذة إدخال القيم الخاصة بالاستدلال حول الفرق بين وسطي مجتمعين، (الطريقة المطولة)، (ملف بيانات "الم مقابلات الشخصية").

بعد الضغط على أمر تعريف المجموعات، ستظهر النافذة الفرعية كما في الشكل (10.4)، قم بكتابة القيمة 1

للمجموعة (العينة) الأولى والقيمة 2 للمجموعة 2 (العينة) الثانية،

ثم اضغط استمرار لتعود للنافذة الأصلية، (شكل (9.4))

اضغط بعدها على موافق فتظهر نتائج الاستدلال الإحصائي

لتقدير الفرق بين وسطي مجتمعي نتائج الشركتين في نافذة


المخرجات، (جدول (6.4)). في ذلك الجدول، ستلاحظ وجود

قيم الوسط الحسابي للعينتين (الشركتين)، الانحراف المعياري

للعينتين، والخطأ المعياري للوسط الحسابي للعينتين في الجدول

الفرعي الأول (أ). وأما الجدول الفرعي الثاني (ب) فيحتوي على

نتائج اختبار الفروض وتقدير فترة الثقة.



شكل 10.4: نافذة تعريف العينتين في ملف بيانات "المقابلات الشخصية".

جدول 6.4: نتائج الاستدلال حول الفرق بين وسطين لمجتمعي الشركتين 1 و 2، (ملف بيانات "الم مقابلات الشخصية").

Group Statistics (أ)

	الشركة	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
	شركة1	20	60.40	15.288	3.419
	شركة2	20	60.35	16.239	3.631

Independent Samples Test (ب)

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means								
			F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
	نتائج المقابلات	Equal variances assumed	.023	.881	.010	38	.992	.050	4.987	-10.046-	10.146
نتائج الم مقابلات	Equal variances not assumed				.010	37.862	.992	.050	4.987	-10.047-	10.147

من الجدول الفرعي الثاني (ب) في الجدول (6.4)، يمكننا استنتاج التالي، (بقراءة أعمدة الجدول من اليسار لليمين):

- قبول الفرضية القائلة بتساوي تباينات مجتمعي الشركتين، ($P\text{-value} = 0.881$)، وبالتالي اعتماد النتائج الخاصة بهذه الفرضية، ($H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$).
- قبول الفرضية القائلة بتساوي الوسطين الحسابيين لمجتمعي الشركتين، ($P\text{-value} = 0.992$)، مما يعني تساوي أداء الأشخاص في المقابلات الشخصية في كلا الشركتين.
- التقدير $10.14 < \mu_{شركة2} - \mu_{شركة1} < 10.04$ – يؤكد نفس النتيجة السابقة وهي عدم وجود اختلاف معنوي (ذو أهمية) في معدل أداء الأشخاص في المقابلات الشخصية في الشركتين.

2.2.1.4 الاستدلال للعينات المرتبطة (غير المستقلة) (Inference about Paired Samples)


في هذا البند، سنستعرض كيفية تطبيق الاستدلال الإحصائي للفرق بين متواسطي مجتمعين في حال كون العينات غير مستقلة. ولنأخذ المثال التالي لشرح كيفية تنفيذ ذلك في برنامج SPSS:

البيانات في جدول (7.4)، تمثل قياس ضغط الدم لعينة من 15 مريضاً في إحدى المستشفيات قبل وبعد إعطاؤهم دواء تجاري موسع للأوردة الدموية. والمطلوب هو إجراء استدلال حول وجود فرق معنوي عند المرضى قبل وبعد تناولهم للدواء التجاري. وهذا الاستدلال سيشمل اختبار الفرضية $H_0: \mu_D = 0$ ، حيث μ_D هو الوسط الحسابي للفرق بين مشاهدات المجتمعين. قم بإدخال محتويات هذا الجدول في ملف بيانات جديد في SPSS باسم "عينات ضغط الدم" ، في عامودين (متغيرين)؛ الأول باسم "عينة 1" والثاني باسم "عينة 2" ، مع إدخال التعريفات "ضغط الدم قبل استخدام الدواء" و "ضغط الدم بعد استخدام الدواء" في خانة (Label).

جدول 7.4: نتائج قياس ضغط الدم لعدد 15 مريض قبل وبعد إعطاؤهم دواء تجاري.

العينة 2 (ضغط الدم بعد استخدام الدواء)		العينة 1 (ضغط الدم قبل استخدام الدواء)	
125	1	130	1
130	2	128	2
135	3	140	3
120	4	115	4
150	5	146	5
152	6	150	6
120	7	123	7
159	8	160	8
160	9	156	9
152	10	150	10
115	11	112	11
115	12	110	12
170	13	175	13
162	14	160	14
180	15	178	15

الآن، في شريط الأوامر العلوي، قم باختيار Analyze>Compare Means>Paired-Samples T Test فتظهر النافذة التالية، (شكل (11.4)). في تلك النافذة، قم أولاً بالضغط على زر التحكم (CTRL) في لوحة المفاتيح في جهازك ثم انقر على المتغير الأول ثم الثاني، ("ضغط الدم قبل استخدام الدواء" و "ضغط الدم بعد استخدام الدواء")، وبعد تحديدهما قم بنقلهما معاً إلى مربع المتغيرات المرتبطة (Paired Variables)، وستلاحظ أن كلا المتغيرين قد تم وضعهما في نفس الصنف.



شكل 11.4: نافذة تحديد العينات المرتبطة للاستدلال حول الفرق بين وسطي مجتمعين لملف بيانات "عينات ضغط الدم".

اضغط موافق بعد ذلك وستظهر النتائج في نافذة المخرجات كما يوضح الجدول (8.4). في الجدول الفرعي الأول (أ)، وكالمعتاد سنلاحظ ظهور النتائج الخاصة بالوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينتين، وكذلك الخطأ المعياري لتقدير الوسط الحسابي. أما الجدول الفرعي الثاني (ب)، فيمثل معامل الارتباط بين العينتين والذي سنتناوله بالتفصيل لاحقاً عندما نتطرق لموضوع الارتباط بين المتغيرات في الفصل الخامس.

جدول 8.4: نتائج الاستدلال حول الفرق بين الوسطين الحسابيين لعينتين مرتبطتين في ملف البيانات "عينات ضغط الدم".

Paired Samples Statistics (أ)

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 ضغط الدم قبل استخدام الدواء	142.20	15	21.926	5.661
	143.00	15	21.378	5.520

Paired Samples Correlations (ب)

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ضغط الدم قبل استخدام الدواء & ضغط الدم بعد استخدام الدواء	15	.986	.000

Paired Samples Test (ج)

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)			
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% C. I. of the Difference							
				Lower	Upper						
Pair 1 ضغط الدم قبل استخدام الدواء - ضغط الدم بعد استخدام الدواء	-.800-	3.649	.942	-2.821-	1.221	-.849-	14	.410			

أما الجدول الفرعي الثالث (ج)، فيضم نتائج الاستدلال حول الفرق بين الوسطين لعينتين المرتبطتين ومنها نستنتج عدم وجود فرق معنوي بين العينتين قبل استخدام الدواء وبعد استخدامه، ($P\text{-value} = 0.410$). وتقدير 95% فترة ثقة لفرق بين الوسطين هو $1.221 < \mu_D < 2.821$ – والذي يؤكّد نفس النتيجة السابقة.

4.4 اختبار تساوي تباينات المجتمع (Testing the Equality of Population Variances)

تناولنا في الجزء المتعلق بالاستدلال حول الفرق بين وسطي المجتمع، (للعينات المستقلة)، أهمية التحقق من تساوي أو عدم تساوي تباينات المجتمع قبل اختبار تساوي الأوساط. إلا أن التحقق من تساوي تباينات المجتمع، أو بصورة أبسط، التتحقق من مدى تجانس المشاهدات بين المتغيرات، عادة ما يكون مفيداً للباحث باختلاف الأسلوب الذي يتبعه في التحليل الإحصائي. وتوجد بضعة اختبارات يمكن استخدامها لاختبار الفرضية؛ $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$ ، اختبار بارتليت (Leven's Test) و اختبار ليفين (Bartlett's Test) إلا أن برنامج SPSS لا يتضمن اختبار بارتليت لتجانس التباين، لذلك سنتناول اختبار ليفين في البند التالي؛

1.2.4 اختبار ليفن (Leven's Test)

يمكن اعتبار أن اختبار ليفين هو ببساطة تحليل تباين في اتجاه واحد (One-way ANOVA) حيث يكون المتغير الرئيسي فيه (Z) هو الفرق المطلق بين قيمة المشاهدة (Y) ومتوسط المجموعة (\bar{Y}) التي تتتمى لها المشاهدة، أي أن $Z_{ij} = |Y_{ij} - \bar{Y}_{..}|$ ، حيث Y_{ij} هي المشاهدة j في المجموعة i . وتكون إحصاء اختبار ليفن (W) تتبع توزيع F بدرجات حرية $(1 - k)$ و $(N - k)$ ، بالصورة التالية:

$$W = \frac{N - k}{k - 1} \frac{\sum_{i=1}^k N_i (Z_{i..} - Z_{..})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{N_i} (Z_{ij} - Z_{i..})^2}$$

حيث؛ k هو عدد المجموعات (المتغيرات)، N_i هو عدد المشاهدات في المجموعة i ، N هو عدد المشاهدات الكلي. (وننوه هنا إلى أن صيغة ليفين قد تستخدم أيضاً وسيط المجموعة (المتغير) عوضاً عن استخدام الوسط الحسابي في الصيغة السابقة).

جدول 9.4: أسعار شواحن الهواتف النقالة

بالدينار الليبي في ثلاثة متاجر مختلفة.

	A	B	C
المتجر	المتجر A	المتجر B	المتجر C
1	72	60	60
2	80	63	50
3	74	59	51
4	86	64	54
5	50	59	40
6	71	66	45
7	51	74	49
8	90	60	79
9	47	61	59
10	40	70	52

بالنسبة لاختبار ليفين، فإنه يمكن تنفيذه في برنامج SPSS في أكثر من موضع، كما لاحظنا سابقاً عند اختبار الفرق بين الأوساط الحسابية، أو كما سنقوم بعرضه من خلال المثال التالي؛

البيانات التالية تمثل أسعار 10 أنواع من شواحن الهواتف النقالة بالدينار الليبي في ثلاثة متاجر مختلفة، A، B، وC، (جدول (9.4))، والمطلوب هنا اختبار ما إذا كان هنالك اختلاف ذو أهمية (معنوية) بين تباين الأسعار في المتاجر، أي اختبار الفرضية $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma_C^2$.


لتنفيذ اختبار ليفين، سنقوم بإدخال البيانات من الجدول (9.4) في ملف بيانات جديد في SPSS باسم "أسعار الشواحن" بحيث يتم إدخال قيمة المتجر A أولاً في العامود الأول متبوعة بقيمة المتجر B في نفس العامود ثم المتجر C. بعد ذلك سنقوم بتمييز القيم للمتجر الأول بالرقم 1، وتتميز قيم المتجر الثاني بالرقم 2، والمتجر الثالث بالرقم 3، كما نشاهد في الشكل (12.4).

	المجموعات	أسعار_الشواحن
1	A	72
2	A	80
3	A	74
4	A	86
5	A	50
6	A	71
7	A	51
8	A	90
9	A	47
10	A	40
11	B	60
12	B	63
13	B	59
14	B	64
15	B	50

شكل 12.4: ملف بيانات "أسعار الشواحن".

لتطبيق اختبار ليفين، قم من شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Explore الاستكشاف (Explore)، (والتي تم التطرق لاستخدامها سابقاً في الفصل الثالث). قم في تلك النافذة بنقل المتغير "أسعار_الشواحن" إلى مربع قائمة المتغيرات الأساسية (Dependent List) ونقل المتغير "المجموعات" إلى مربع قائمة متغيرات التصنيف (Factor List).

وحيث أننا مهتمون في هذا المثال باختبار تساوي التباينات فقط، فسنقوم باختيار خيار الرسم البياني (Plots) في الجزء الخاص بالعرض (Display) في أسفل النافذة، لأن اختبار ليفين يقع ضمنها. من جديد قم بالنقر على خيار الرسم (Plots) في أعلى نافذة الاستكشاف على اليمين، فتظهر النافذة الفرعية الخاصة بالرسم (Explore: Plots)، (شكل 13.4)). قم بـإلغاء الخيار الافتراضي لرسم الساق والورقة Spread vs Level with Levene (Stem-and-leaf) لأننا لسنا بحاجة إليه هنا، وفي الجزء السفلي للنافذة (Spread vs Level with Levene Test) قم باختيار الخيار الرابع¹، (بدون تحويل Untransformed) ثم اضغط استمرار للعودة إلى نافذة الاستكشاف الأولى.



شكل 13.4: النافذة الفرعية الخاصة بالرسم لنافذة الاستكشاف.

(يمكنك أيضاً، في الشكل (13.4)، ملاحظة إمكانية اختيار عرض الرسم الخاص باختبار الطبيعي (Normality) عن طرق رسم QQ وإجراء اختبارات الطبيعية، وذلك لكل مجموعة). الآن وفي نافذة الاستكشاف قم بالضغط على موافق فتظهر النتائج المطلوبة في نافذة المخرجات. الجدول الأول في نافذة المخرجات كالمعتاد في معظم نتائج برنامج SPSS


¹ الخيارات المتاحة لاختبار ليفين هي خيارات خاصة بتحويل قيمة المتغير الأساسي الذي يضم المجموعات.

هو خاص بعدد المشاهدات الموجودة والمفقودة في كل مجموعة ونسبة. أما الجدول الثاني فيضم نتائج اختبار ليفين، (جدول (10.4))، وفي هذا الجدول نلاحظ أن العمود الأول إلى اليسار يضم تقسيم النتائج بحسب طريقة حساب إحصاءة ليفين (W) اعتماداً على الوسط الحسابي أو الوسيط أو غيرها من الخيارات.

جدول 10.4: نتائج اختبار ليفين لملف البيانات "أسعار الشواحن".

Test of Homogeneity of Variance				
	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
أسعار_الشواحن	Based on Mean	8.810	2	.001
	Based on Median	4.435	2	.022
	Based on Median and with adjusted df	4.435	2	.026
	Based on trimmed mean	8.608	2	.001

من هذه النتائج، (تحديداً $P\text{-value} = 0.001$)، يمكننا القول بأنه يمكن رفض الفرضية الصفرية القائلة بتساوي التباينات في المجتمع، بمعنى أننا نعتقد أسعار الشواحن مختلفة فيما بينها ضمن كل متجر في العموم. وهذه النتيجة يمكن ملاحظتها بصرياً من خلال الشكل التالي، (شكل (14.4))، والذي يعرض توزيع المشاهدات لكل مجموعة (متجر) عن طريق شكل الصندوق. وللإظهار أن أسعار الشواحن في المتجر الأول (A) هي الأكثر اختلافاً مقارنة بالمتاجر الآخرين. وأما بالنسبة للتمثيل البياني الأخير في نافذة المخرجات، (Spread vs Level Plot)، والذي لن يتم عرضه هنا، فهو يظهر انتشار وسيطات المجموعات الثلاثة حيث تمثل النقطة الأولى (من اليسار) المجموعة A، ثم المجموعة C ثم المجموعة B، وستلاحظ من ذلك الرسم أيضاً مدى اختلاف الأسعار في المتجر A عن باقي المتاجر.



شكل 14.4: شكل الصندوق للمجموعات الثلاثة في ملف بيانات "أسعار الشواحن".

ويمكن تنفيذ اختبار ليفين أيضاً عند استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد. في شريط الأدوات العلوي قم باختيار Analyze>Compare Means>One-way ANOVA وفي نافذة التحليل اضغط على الخيارات (Options) واختر منها اختبار تجانس التباين (Homogeneity of variance test) ثم اضغط استمرار. اضغط موافق في النافذة الأصلية فتحصل على النتيجة المطلوبة، (جدول (11.4)).

جدول 11.4: نتائج اختبار ليفين باستخدام أسلوب تحليل التباين، لملف البيانات "أسعار الشواحن".

Test of Homogeneity of Variances			
أسعار_الشواحن			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
8.810	2	27	.001

3.4 جداول الاقتران واختبار الاستقلالية (Contingency Tables and Test for Independence)

جدوال الاقتران هي جداول يتم من خلالها تنظيم عرض متغيرين بشكل صفوف وأعمدة، بحيث تمثل الصفوف مستويات (تقسيمات) المتغير الأول وتمثل الأعمدة مستويات المتغير الثاني، وتضم "الخلايا" الناتجة عن التقاء الصفوف والأعمدة التكرارات الناتجة عن "اقتران" أي مستويين. ويتم تكوين جداول الاقتران عادة من المتغيرات الوصفية، إلا أنه يمكن إعادة ترميز المتغيرات الكمية إلى وصفية ثم استخدامها لتكون الاقتران، وسنبدأ بشرح الحالة الأولى؛

1.3.4 تكوين جداول الاقتران من متغيرات وصفية

(Contingency Tables from Categorical Variables)

لتوضيح طريقة تكوين جداول الاقتران من متغيرين وصفيين لنأخذ المثال التالي؛ البيانات التالية، (في جدول (12.4))، تمثل متغيرين بما مستوى الإنتاج ومستوى الأرق لعينة مكونة من 90 عامل في أحد مصانع الحديد والصلب، حيث تم تقسيم مستوى الأرق إلى ثلاثة مستويات هي منخفض، متوسط، ومرتفع، وتم تقسيم مستوى الإنتاج إلى ثلاثة مستويات أيضاً هي ضعيف، مقبول، وجيد.

وكان المطلوب أولاً تكوين جدول اقتران لهذين المتغيرين بهدف التعرف على توزيع العمال بحسب مستويات الأرق، وتوزيع مستويات الإنتاج، وتوزيع مستويات الإنتاج مقتربة بمستويات الأرق عند العمال وذلك من خلال التكرارات والنسب لهذه المستويات.

سنبدأ بإدخال هذين المتغيرين في ملف بيانات جديد في SPSS باسم "مستوى الأرق". بحيث نعطي المتغير الأول "مستوى_الإنتاج" القيم: 1، 2، و 3 للمستويات: ضعيف، مقبول، وجيد على الترتيب، ونعطي المتغير الثاني

"مستوى_الأرق" القيم: 1، 2، و 3 للمستويات: منخفض، متوسط، مرتفع على الترتيب. مع تعريف هذه القيم بنفس الأسماء في عمود القيم (Values) في نافذة المتغيرات (Variable View).

جدول 12.4: مستوى الإنتاج ومستوى الأرق لعينة من 90 عامل في أحد المصانع.

مستوى الأرق	مستوى الإنتاج										
1	مرتفع	جيد	21	متوسط	ضعيف	41	مرتفع	ضعيف	61	متوسط	جيد
2	مرتفع	ضعيف	22	متوسط	مقبول	42	مرتفع	ضعيف	62	منخفض	مقبول
3	مرتفع	ضعيف	23	مرتفع	ضعيف	43	متوسط	ضعيف	63	مرتفع	ضعيف
4	منخفض	جيد	24	مرتفع	ضعيف	44	منخفض	مقبول	64	متوسط	جيد
5	مرتفع	ضعيف	25	متوسط	مقبول	45	متوسط	مقبول	65	مرتفع	مقبول
6	متوسط	مقبول	26	متوسط	ضعيف	46	منخفض	جيد	66	مرتفع	جيد
7	مرتفع	مقبول	27	منخفض	جيد	47	مرتفع	ضعيف	67	متوسط	مقبول
8	متوسط	جيد	28	متوسط	مقبول	48	مرتفع	ضعيف	68	منخفض	جيد
9	مرتفع	جيد	29	منخفض	ضعيف	49	مرتفع	ضعيف	69	متوسط	مقبول
10	مرتفع	جيد	30	مرتفع	جيد	50	مرتفع	ضعيف	70	متوسط	جيد
11	مرتفع	ضعيف	31	مرتفع	ضعيف	51	متوسط	جيد	71	مرتفع	ضعيف
12	متوسط	ضعيف	32	متوسط	ضعيف	52	متوسط	مقبول	72	مرتفع	مقبول
13	منخفض	مقبول	33	متوسط	مقبول	53	منخفض	جيد	73	مرتفع	مقبول
14	متوسط	مقبول	34	مرتفع	ضعيف	54	منخفض	ضعيف	74	منخفض	جيد
15	منخفض	جيد	35	مرتفع	ضعيف	55	منخفض	مقبول	75	متوسط	مقبول
16	مرتفع	ضعيف	36	منخفض	جيد	56	منخفض	ضعيف	76	مرتفع	جيد
17	مرتفع	ضعيف	37	مرتفع	ضعيف	57	منخفض	مقبول	77	مرتفع	ضعيف
18	متوسط	مقبول	38	متوسط	مقبول	58	منخفض	ضعيف	78	منخفض	جيد
19	متوسط	ضعيف	39	مرتفع	مقبول	59	منخفض	ضعيف	79	مرتفع	ضعيف
20	منخفض	جيد	40	متوسط	مقبول	60	منخفض	مقبول	80	متوسط	مقبول

الآن لتكوين جدول الاقتران للمتغيرين، قم في شريط الأدوات العلوي باختيار Analyze>Descriptive

، فتظهر النافذة Statistics>Crosstabs

الخاصة بتكوين الجداول المشتركة


(Crosstabs)، كما نرى في شكل (15.4).

في تلك النافذة، قم بنقل المتغير

"مستوى_الأرق" إلى مربع الصنوف


(Row(s))، ونقل المتغير "مستوى_الإنتاج"

إلى مربع الأعمدة (Column(s)).



شكل 15.4: النافذة الخاصة بتكوين جداول الاقتران.

اضغط في تلك النافذة على خيار الخلايا (Cells) فتظهر النافذة الفرعية الخاصة باختيار ما نود إظهاره في



شكل 16.4: نافذة خيار الخلايا في جداول الاقتران.

يحتوي الجدول الأول على عدد المشاهدات الفعلية والقيم المفقودة ونسبها. أما الجدول الثاني في المخرجات، (جدول 13.4)، فهو جدول الاقتران الخاص بالمتغيرين الوصفيين للمتغيرين "مستوى_الإنتاج" و"مستوى_الأرق".

جدول الاقتران المطلوب، (شكل 16.4)، قم في تلك النافذة باختيار إظهار النسب للصفوف والأعمدة والمجموع في مربع النسب (Percentages) كما هو موضح في الشكل. ثم اضغط استمرار للعودة للنافذة السابقة، (شكل 15.4)). وفي تلك النافذة يمكننا إضافة تمثيل الأعمدة البيانية بحسب التقييمات للمتغيرين، وذلك باختيار عرض الأعمدة البيانية المصنفة (Display clustered bar charts) في أسفل النافذة. قم بعد ذلك بالضغط على موافق. ستظهر بعد ذلك النتائج في نافذة المخرجات، بحيث

جدول 13.4: جدول الاقتران للمتغيرين "مستوى_الإنتاج" و"مستوى_الأرق" في ملف البيانات "مستوى الأرق".

Crosstabulation * مستوى_الإنتاج


		مستوى_الإنتاج			Total
مستوى_الأرق	منخفض	Count	5	9	12
	% within	19.2%	34.6%	46.2%	100.0%
	مستوى_الإنتاج	13.5%	32.1%	48.0%	28.9%
	% of Total	5.6%	10.0%	13.3%	28.9%
متوسط	Count	7	14	7	28
	% within	25.0%	50.0%	25.0%	100.0%
	مستوى_الإنتاج	18.9%	50.0%	28.0%	31.1%
	% of Total	7.8%	15.6%	7.8%	31.1%
مرتفع	Count	25	5	6	36
	% within	69.4%	13.9%	16.7%	100.0%
	مستوى_الإنتاج	67.6%	17.9%	24.0%	40.0%
	% of Total	27.8%	5.6%	6.7%	40.0%
Total	Count	37	28	25	90
	% within	41.1%	31.1%	27.8%	100.0%
	مستوى_الإنتاج	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	41.1%	31.1%	27.8%	100.0%

ونلاحظ وجود أربعة قيم في كل خلية في الجدول. هذه القيم هي التكرار، النسبة لتصف، النسبة للعامود، والنسبة للكل. فمثلاً في الخلية الأولى؛ (مستوى إنتاج ضعيف ومستوى أرق منخفض)، نجد أن عدد العمال الذين هم إنتاجهم ضعيف ولديهم مستوى أرق منخفض عدهم 5 عمال، ويمثلون 19.2% بالنسبة للعمال الذين لديهم مستوى أرق منخفض، ويمثلون 13.5% بالنسبة للعمال الذين مستوى إنتاجهم ضعيف، ويمثلون 5.6% بالنسبة لكل العمال.

وبالتالي، يمكننا الحصول على العديد من المعلومات من جدول الاقتران عن توزيع العمال بحسب مستويات الإنتاج ومستويات الأرق أهمها ما يلي:

- الخلية التي لها أعلى نسبة للمجموع هي التي تمثل العمال الذين مستوى إنتاجهم ضعيف ومستوى الأرق لديهم مرتفع (%27.8)، وهذا يعني أن العمال الذين يعانون من الأرق في النوم بصورة كبيرة يكون مستوى إنتاجهم ضعيف. ويؤيد تلك النتيجة أيضاً نسبة المجموع للعمال الذين مستوى إنتاجهم جيد ومستوى الأرق لديهم منخفض (%13.3).
- نسبة العمال الذين لديهم مستوى أرق مرتفع هي 40% وهي نسبة تعد كبيرة، أما نسبة العمال الذين لديهم مستوى أرق متوسط فهي 31.1%， وبالتالي فإنه بجمع هاتين النسبتين يمكن القول بأن 71.1% من العمال يعانون من مستويات أرق متوسطة إلى مرتفعة في النوم.
- نسبة العمال الذين إنتاجهم جيد هو 27.8% أي أقل من ثلث العمال، ونسبة العمال الذين إنتاجهم ضعيف هو 41.1% وهذا يعكس الوضع السيئ للإنتاج في هذا المصنع.

أما النتيجة الأخيرة في نافذة المخرجات، (شكل (17.4))، فهي الأعمدة البيانية المصنفة بحسب مستويات الإنتاج ومستويات الأرق لدى العمال. وهذه الأعمدة تمثل النتائج المذكورة سابقاً بشكل مرئي.



شكل 17.4: الأعمدة البيانية المصنفة لملف البيانات "مستوى الأرق".

2.3.4 تكوين جداول الاقتران من متغيرات كمية (Contingency Tables from Quantitative Variables)

في بعض الدراسات، قد نقوم بتحويل بعض المتغيرات الكمية إلى وصفية، أي إلى مستويات، وذلك بهدف استخدامها في بعض الأساليب الإحصائية التي تتطلب هذا النوع من المتغيرات، أو بهدف الحصول على تلخيص لنمط معين في البيانات. ولتكوين جدول اقتران من متغير كمي وآخر وصفي أو من متغيران كمييان، لتأخذ المثال التالي؛

البيانات في الجدول (14.4) تمثل معدلات فيتامين دال (Vit. D) وأعمار عينة مكونة من 60 شخصا إضافة لتصنيفهم ذكور وإناث.

جدول 14.4: معدلات فيتامين دال (Vit. D) وأعمار عينة مكونة من 60 شخصا.

	ذكور	أعمر	ذكور	ذكور	أعمر	ذكور						
1	53	26	ذكر	21	55	26	أنثى	41	72	26	ذكر	ذكر
2	61	28	ذكر	22	69	29	أنثى	42	28	81	أنثى	أنثى
3	81	20	ذكر	23	68	20	أنثى	43	39	66	ذكر	ذكر
4	25	51	أنثى	24	58	36	ذكر	44	27	20	أنثى	أنثى
5	20	30	أنثى	25	57	25	أنثى	45	48	24	أنثى	أنثى
6	71	25	أنثى	26	24	79	ذكر	46	67	29	أنثى	أنثى
7	80	21	أنثى	27	20	20	أنثى	47	25	20	أنثى	أنثى
8	65	28	ذكر	28	90	20	أنثى	48	39	78	ذكر	ذكر
9	30	74	ذكر	29	26	25	أنثى	49	46	23	أنثى	أنثى
10	22	80	ذكر	30	35	34	أنثى	50	58	26	أنثى	أنثى
11	77	26	ذكر	31	38	39	أنثى	51	67	80	ذكر	ذكر
12	50	30	أنثى	32	56	25	ذكر	52	81	28	ذكر	ذكر
13	65	24	ذكر	33	47	75	ذكر	53	36	45	ذكر	ذكر
14	23	22	أنثى	34	30	26	أنثى	54	35	69	ذكر	ذكر
15	61	26	ذكر	35	25	77	ذكر	55	24	20	أنثى	أنثى
16	46	24	أنثى	36	68	29	أنثى	56	31	84	ذكر	ذكر
17	31	76	ذكر	37	35	79	ذكر	57	21	80	ذكر	ذكر
18	35	78	ذكر	38	26	80	ذكر	58	84	32	ذكر	ذكر
19	26	80	ذكر	39	24	24	أنثى	59	78	75	ذكر	ذكر
20	48	23	أنثى	40	39	36	أنثى	60	88	77	ذكر	ذكر

ونلاحظ من هذه البيانات أن المتغيران "معدل فيتامين دال"، (المقياس بوحدة نانومول) و"العمر"، (المقياس بالسنة) هما متغيران كميان، ولتكوين جدول اقتران خاص بهما يجب أولاً تحويلهما إلى متغيرات وصفية تأخذ مستويات محددة.

لنقم أولاً بإدخال المتغيرات الثلاثة من جدول (14.4) في ملف بيانات جديد في SPSS باسم "فيتامين دال" ، (شكل (18.4))، بحيث يتم إعطاء القيمة 1 للذكور والقيمة 2 للإناث، ثم تعريف تلك القيم في خانة القيم (Values) كالمعتاد، وسنعطي المتغيرات الثلاثة الأسماء "العمر" ، "فيتامين_dal" ، و"النوع" .

	العمر	فيتامين_dal	النوع
1	53	26	1
2	61	28	1
3	81	20	1
4	25	51	2
5	20	30	2
6	71	25	2
7	80	21	2
8	65	28	1
9	30	74	1
10	22	80	1
11	77	26	1
12	50	30	2
13	65	24	1


شكل 18.4: المتغيرات "العمر" ، "فيتامين_dal" ، و"النوع" في ملف البيانات "فيتامين دال".

في الفصل الثاني، وفي الجزء الخاص بإعادة ترميز القيم في متغير مختلف (Recode into Different Variable)، تناولنا كيفية تكوين متغير جديد عن طريق تعريف قيم أو مستويات جديدة له من المتغير الأصلي، وهنا سنقوم أيضاً بتعريف متغيران جديدان؛

بالنسبة للمتغير الأول، "العمر" ، سنقوم بتحويله إلى متغير يأخذ ثلاثة مستويات هي الفئات العمرية؛ (أقل من 30)، (من 30 إلى 50)، و(51 فأكثر)، وسنستخدم القيم 1، 2، و 3 لترميز الفئات العمرية السابقة على التوالي.

وأما المتغير "فيتامين_dal" فسيتم إعطائه المستويات الثلاثة المعدة من قبل الأطباء المتخصصين وهي (أقل من 30) وفيها يصنف الشخص بأنه يعاني من نقص في فيتامين دال، و(من 30 إلى 75) ويصنف فيها الشخص بأن مستوى فيتامين دال غير كافي، و(أكثر من 75) وهو المستوى الطبيعي لفيتامين دال عند الإنسان البالغ. وسنعطي القيمة 1 للمستوى (أقل من 30) والقيمة 2 للمستوى (من 30 إلى 75) والقيمة 3 للمستوى (أكثر من 75).


الآن قم باختيار أمر تحويل (Transform) من شريط الأوامر العلوي، ثم اختر إعادة ترميز في متغير مختلف (Recode into Different Variables). ستظهر عندها نافذة إعادة الترميز في متغير جديد، كما يشاهد في الشكل (19.4). سنقوم باختيار المتغير "العمر" ، ونقله إلى مربع المتغيرات (Numeric Variable). وفي خانة المتغير المُخرج (Output Variable) إلى اليمين، نقم بتسمية المتغير الجديد بالاسم "الفئة_العمرية" وكتابة فئات العمر" في مربع الوصف (Label)، ثم نضغط على أمر تغيير (Change)، فيلاحظ حدوث هذا التغيير في مربع المتغيرات حيث سيظهر فيها النص "العمر --> الفئة_العمرية".



شكل 19.4: نافذة إعادة الترميز في متغير مختلف لملف البيانات "فيتامين دال".

بعد ذلك سنقوم بتعريف القيم التي نود إعادة كتابتها في المتغير الجديد باستخدام قيم متغير "العمر"، فنقوم باختيار أمر تعريف القيم القديمة والجديدة (Old and New Values) (Old and New Values) في الشكل (19.4)، فتظهر نافذة جديدة كما يرى في الشكل (20.4).

في هذه النافذة، لتعيين القيمة الأولى، والتي تشمل كل الأعمار التي هي أقل من 30 سنة، نحتاج لاستخدام الخيار المدى، القيمة فأقل (Range, LOWEST through value). فنكتب أولاً القيمة المحددة للتصنيف الأول وهي القيمة 1 في خانة القيمة الجديدة (New Value)، ثم نكتب القيمة 29، (وهي القيمة¹ الأقل من 30 سنة مباشرة في متغير العمر)، ثم نضغط إضافة (Add) (Add).



شكل 20.4: نافذة تعريف القيم القديمة والجديدة لمتغير "العمر" في خيار إعادة الترميز في متغير مختلف لملف البيانات "فيتامين دال".

¹ ننوه هنا إلى أنه إذا ما تم كتابة القيمة 30 في خانة (Range, LOWEST through value) فإن هذا التصنيف سيشمل على العمر 30 سنة من ضمنه.

لتعيين القيمة الثانية، وهي القيمة 2 للتصنيف الثاني وهو الأعمار من 30 إلى 50 سنة، نكتب القيمة 2 في خانة القيمة الجديدة (New Value) ثم نضغط على الخيار المدى (Range) فتظهر خانتان فارغتان أسفل منه. يتم إدخال القيمة 30 في الخانة العليا والقيمة 50 في الخانة السفلية والضغط على (Add).

لتعيين القيمة الثالثة، وهي القيمة 3 للتصنيف الثالث، وتمثل الأشخاص الذين أعمارهم 51 سنة فأكثر، نكتب القيمة 3 في خانة القيمة الجديدة (New Value) ثم نضغط على الخيار المدى، القيمة فأكبر من (Range, value through HIGHEST) ونكتب فيه القيمة 51، ثم نضغط على (Add). وبعد الانتهاء من تعيين كل القيم المحددة للتصنيفات السابقة نضغط على استمرار (Continue). سنعود بعد ذلك للنافذة السابقة، (شكل 19.4)، نقوم بعدها بالضغط على موافق فبظهر المتغير الجديد "الفئة_العمرية" في نافذة عرض البيانات في ملف البيانات "فيتامين دال".

الآن وللانتهاء من تعريف المتغير الجديد "الفئة_العمرية"، قم بتعريف القيم 1، 2، و3 في عمود القيم (Values) في نافذة المتغيرات (Variable View) لمستويات الثلاثة؛ (أقل من 30)، (من 30 إلى 50)، و(51 فأكثر).

من جديد، وبنفس الكيفية، سنقوم بتعريف متغير جديد لتحويل متغير "فيتامين_dal" إلى متغير وصفي ذو ثلاثة مستويات. في نافذة إعادة ترميز في متغير مختلف¹ (Recode into Different Variables) سنقوم باختيار المتغير "فيتامين_dal" ، ونقله إلى مربع المتغيرات (Numeric Variable) . وفي خانة المتغير المخرج (Output) إلى اليمين، نقوم بتسمية المتغير الجديد بالاسم "مستويات_فيتامين_dal" وكتابة "مستويات فيتامين dal" في مربع الوصف (Label)، ثم نضغط على أمر تغيير (Change)، فلاحظ حدوث هذا التغيير في مربع المتغيرات حيث سيظهر فيها النص "فيتامين_dal --> مستويات_فيتامين_dal".

بعد ذلك نقوم بتعريف قيم المتغير الجديد فنقوم باختيار أمر تعريف القيم القديمة والجديدة (Old and New Values) ثم تعيين القيمة الأولى وهي 1، والتي تشمل كل معدلات فيتامين دال التي هي أقل من 30 نانومول، في الخيار المدى، القيمة أقل (Range, LOWEST through value)، ونكتب القيمة 1 في خانة القيمة الجديدة (New Value)، ثم نكتب القيمة 29، (وهي القيمة الأقل من 30 نانومول مباشرة)، ثم نضغط إضافة (Add).

¹ عند استخدام الأوامر في برنامج SPSS بصورة متتالية في نفس الجلسة لملف بيانات ما، فإنك ستلاحظ وجود الخيارات والإعدادات التي قمت بها موجودة كما هي، وهذه الخاصية قد تكون مفيدة في كثير من الأحيان عندما تقوم بتكرار تحليل إحصائي معين وإجراء تغييرات محددة، أما في حالات أخرى، مثل المثال الحالي، فإننا نكون بحاجة لإلغاء ما تم تعريفه للمتغير السابق وكتابة التعريفات الجديدة.

لتعيين القيمة الثانية، وهي القيمة 2 للتصنيف الثاني وهي المعدلات من 30 إلى 75 نانومول، نكتب القيمة 2 في خانة القيمة الجديدة (New Value) ثم نضغط على الخيار المدى (Range) فتظهر خانتان فارغتان أسفل منه. يتم إدخال القيمة 30 في الخانة العليا والقيمة 75 في الخانة السفلية والضغط على (Add).

لتعيين القيمة الثالثة، وهي القيمة 3 للتصنيف الثالث، وهي معدلات فيتامين دال التي هي أكثر من 75 نانومول، نكتب القيمة 3 في خانة القيمة الجديدة (New Value) ثم نضغط على الخيار المدى، القيمة فـأكبر من (Range, Add) value through HIGHEST (value through HIGHEST) ونكتب فيه القيمة 76، ثم نضغط على (Continue). وبعد الانتهاء من تعيين كل القيم المحددة للتصنيفات السابقة نضغط على استمرار (Continue). سنعود بعد ذلك للنافذة السابقة، (شكل 19.4)، نقوم بعدها بالضغط على موافق فيظهر المتغير الجديد "مستويات_فيتامين_dal" في نافذة عرض البيانات في ملف البيانات "فيتامين دال"، وللانتهاء من تعريف المتغير الجديد "مستويات_فيتامين_dal"، قم بتعريف القيم 1، 2، و 3 في عمود القيم (Values) في نافذة المتغيرات (Variable View) للمستويات الثلاثة؛ (أقل من 30)، (من 30 إلى 75) و(أكبر من 75)، ويكون الشكل النهائي لملف البيانات "فيتامين دال"، شكل (21.4).

	العمر	فيتامين_dal	النوع	الفئة_العمرية	مستويات_فيتامين_dal
1	53	26	ذكر	أقل من 30	أقل من 30
2	61	28	ذكر	أقل من 30	أقل من 30
3	81	20	ذكر	أقل من 30	أقل من 30
4	25	51	أنثى	أقل من 30	من 30 إلى 75
5	20	30	أنثى	أقل من 30	من 30 إلى 75
6	71	25	أنثى	أقل من 30	أقل من 30
7	80	21	أنثى	أقل من 30	أقل من 30
8	65	28	ذكر	أقل من 30	أقل من 30
9	30	74	ذكر	من 30 إلى 50	من 30 إلى 75
10	22	80	ذكر	أقل من 30	أقل من 30
11	77	26	ذكر	أقل من 30	أقل من 30
12	50	30	أنثى	من 30 إلى 50	من 30 إلى 75
13	65	24	ذكر	أقل من 30	أقل من 30

شكل 21.4: ملف البيانات "فيتامين دال" بعد تعريف المتغيرين الجديدين "الفئة_العمرية"

و"مستويات_فيتامين_dal".

بعد أن تم تحويل المتغيران الكمييان "العمر" و "فيتامين_dal" في ملف البيانات "فيتامين دال" إلى متغيرين وصفيين رباعيين، سنقوم الآن بتكوين جدول الاقتران لهما؛

قم في شريط الأدوات العلوي باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Crosstabs، فتظهر النافذة الخاصة بتكوين الجداول المشتركة (Crosstabs). في تلك النافذة، قم بنقل المتغير "الفئة_العمرية" إلى مربع الصور (Row(s)، ونقل المتغير "مستويات_فيتامين_dal" إلى مربع الأعمدة (Column(s)).

اضغط في تلك النافذة على خيار الخلايا (Cells) وقم باختيار إظهار النسب للصفوف والأعمدة والمجموع في مربع النسب (Percentages)، ثم اضغط استمرار للعودة للنافذة السابقة.

وفي تلك النافذة قم بإضافة تمثيل الأعمدة البيانية بحسب التقسيمات للمتغيرين، وذلك باختيار عرض الأعمدة البيانية المصنفة (Display clustered bar charts) في أسفل النافذة. قم بعد ذلك بالضغط على موافق.


ستظهر بعد ذلك النتائج في نافذة المخرجات، بحيث يحتوي الجدول الأول على عدد المشاهدات الفعلية والقيم المفقودة ونسبتها. أما الجدول الثاني فهو جدول الاقتران، والذي يظهر في جدول (15.4)، ومنه نستطيع ملاحظة أن النسبة الأكبر بروزا هي نسبة الأشخاص الأكبر سنا (15 سنة فأكثر) الذين لديهم نقص حاد في معدل فيتامين دال، (31.7%).

جدول 15.4: جدول الاقتران للمتغيرين "الفئة_العمرية" و"مستويات_فيتامين_dal" في ملف البيانات "فيتامين دال".

Crosstabulation

		مستويات فيتامين دال			Total	
		أقل من 30	من 30 إلى 75	أكثر من 75		
العمر	أقل من 30 فئات	Count	7	2	7	16
		فئات العمر	43.8%	12.5%	43.8%	100.0%
		مستويات فيتامين دال	21.9%	14.3%	50.0%	26.7%
		% of Total	11.7%	3.3%	11.7%	26.7%
من 30 إلى 50	Count	6	9	5	20	
		فئات العمر	30.0%	45.0%	25.0%	100.0%
		مستويات فيتامين دال	18.8%	64.3%	35.7%	33.3%
		% of Total	10.0%	15.0%	8.3%	33.3%
51 فأكثر	Count	19	3	2	24	
		فئات العمر	79.2%	12.5%	8.3%	100.0%
		مستويات فيتامين دال	59.4%	21.4%	14.3%	40.0%
		% of Total	31.7%	5.0%	3.3%	40.0%
Total		Count	32	14	14	60
		فئات العمر	53.3%	23.3%	23.3%	100.0%
		مستويات فيتامين دال	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	53.3%	23.3%	23.3%	100.0%

كما يمكن، من الأعمدة البيانية المصنفة للمتغيرين (شكل (22.4))، ملاحظة ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالنسبة أو التكرارات الأخرى.



شكل 22.4: الأعمدة البيانية المصنفة للمتغيرين "الفئة_العمرية" و"مستويات_فيتامين_ DAL" في ملف البيانات "فيتامين DAL".

3.3.4 اختبار الاستقلالية (Test for Independence)

يُعد اختبار الاستقلالية من الاختبارات الهامة المستخدمة في دراسة العلاقات بين المتغيرات الوصفية، باستخدام جداول الاقتران، ويُعرف أيضاً باختبار بيرسون مربع كاي (Pearson's Chi-Square Test). وتعُرف إحصاء الاختبار الخاصة به، والتي تتبع توزيع مربع كاي بدرجات حرية تساوي $(r-1)(c-1)$ ، بالصورة:

$$\chi_c^2 = \sum_{i=1}^{rc} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

حيث o_i هو التكرار المشاهد في الخلية، $e_i = \frac{\text{مجموع العامد} \times \text{مجموع الصف}}{\text{المجموع الكلي}}$ هو التكرار المتوقع للخلية، r =عدد الصفوف، و c =عدد الأعمدة.

ويتم في اختبار الاستقلالية اختبار الفرضية الصفرية؛ توجد استقلالية بين المتغيرين (الصفوف والأعمدة) H_0 ، وبالتالي فإن رفض الفرضية الصفرية يعني وجود علاقة ذات معنوية بين بعض أو كل مستويات المتغيرين في جدول الاقتران.

وقبل البدء في تنفيذ اختبار الاستقلالية، سنعرف بعض المقاييس الإحصائية التي تستخدم كمقاييس إضافية لدراسة الارتباط بين متغيري جدول الاقتران، والتي تعتمد على قيمة إحصاء مربع كاي في حسابها، وتسمى مقاييس الترابط بناء على مربع كاي (Measures of Association based on Chi-Square)؛

1.3.3.4 معامل فاي (Phi Coefficient)

يعرف معامل فاي للارتباط بالصورة التالية:

$$\varphi = \sqrt{\frac{\chi_c^2}{n}}$$

حيث χ_c^2 هي قيمة إحصاء مربع كاي المحسوبة من جدول الاقتران، و n هو عدد المشاهدات (التكرارات) الكلي في جدول الاقتران. وكلما اقتربت قيمة φ من الصفر كلما دل ذلك على ضعف العلاقة بين المتغيرين الوصفيين، وبالمقابل كلما اقتربت من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على قوة العلاقة.

2.3.3.4 معامل الاقتران (Contingency Coefficient)

معامل الاقتران، والذي يُعرف أيضاً بمعامل الاقتران لبيرسون (Pearson's Contingency Coefficient)، هو أيضاً أحد المقاييس التي تستخدم لقياس درجة العلاقة بين متغيري جدول الاقتران، ويعتمد أيضاً مثل معامل فاي على إحصاء مربع كاي، ويُعرف بالصورة:

$$C = \sqrt{\frac{\chi_c^2}{n + \chi_c^2}}$$

حيث χ_c^2 هي قيمة إحصاء مربع كاي ، و n هو عدد التكرارات الكلي في جدول الاقتران. وينطبق عليه ما ينطبق على معامل كاي في التعليق على قيمته المحسوبة. ويمكننا أيضاً ملاحظة العلاقة بين صيغتي كل من المعاملين كالتالي:

$$C = \sqrt{\frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}}$$

3.3.3.4 معامل كرامر V (Cramer's V Coefficient)

يُعرف معامل كرامر V ، والذي يعتمد هو الآخر في حسابه على إحصاء مربع كاي، بالصورة التالية:

$$V = \sqrt{\frac{\chi_c^2}{nk}}$$

حيث χ_c^2 هي قيمة إحصاء مربع كاي، n هو عدد التكرارات الكلي في جدول الاقتران، و k هو الحد الأدنى لعدد الصفوف وعدد الأعمدة في جدول الاقتران، أي أن $(r, c) = \text{Min.}$. ويكون التعليق على قيمته كما هو الحال مع

المعاملين السابقين، معامل فاي ومعامل الاقتران. ويمكن ملاحظة العلاقة بين صيغتي كل من معامل كرامر ومعامل فاي كالتالي:

$$V = \sqrt{\frac{\varphi^2}{k}}$$

4.3.3.4 معامل كندل تاو (Kendall's Tau Coefficient)

وهو معامل يُستخدم أيضا لحساب الارتباط بين متغيرين وصفيين، إلا أنه يتميز تحديدا بالتعامل مع المتغيرات الوصفية الرتبية. وتتوفر لهذا المعامل ثلاثة صيغ بحسب طبيعة جدول الاقتران ستتناولها فيما يلي:

- معامل كندل تاو B (Kendall's Tau-B)

ويستخدم عادة في جدول الاقتران المربعة، (التي تتساوى فيها عدد مستويات الصفوف والأعمدة). ونُعرف صيغة المعامل بالصورة:

$$\tau_b = \frac{P - Q}{\frac{n(n - 1)}{2}}$$

حيث n هو عدد التكرارات الكلية في جدول الاقتران، و P و Q هما عدد الأزواج (من الخلايا) المتفقة (Concordant) وغير المتفقة (Discordant) على الترتيب. ولتوضيح كيفية حساب هاتين القيمتين من جداول الاقتران ذات الحجم 2×2 , أي التي تحتوي على صفين وعامدين، (حيث أن حساب القيمتين من الجداول الأكبر حجما يكون أكثر تعقيدا باستخدام الحل اليدوي)، اعتبر جدول الاقتران ذو القيم الافتراضية التالي، (جدول (16.4)):

جدول 16.4: جدول اقتران 2×2 افتراضي.

		المتغير الأول	
		المستوى 1	المستوى 2
المتغير الثاني	المستوى 1	<i>a</i>	<i>b</i>
	المستوى 2	<i>c</i>	<i>d</i>

لهذا الجدول، يتم حساب قيم كل من P و Q بالصورة التالية:

$$Q = a \times d + b \times c$$

- معامل كندل تاو B مع التصحيح في حالة التساوي (Kendall's Tau-B with correction for ties)

وهو نفس المعامل السابق مع إضافة تصحيح في الحسابات للخلايا عند تساوي قيم P و Q .

• معامل كندل تاو C (Kendall's Tau-C)

ويستخدم هذا المعامل في جداول الاقتران غير المربعة، أي التي يكون فيها عدد الصفوف وعدد الأعمدة غير متساوي، ويأخذ الصيغة التالية:

$$\tau_c = \frac{P - Q}{n^2(\min(r, c) - 1)2 \min(r, c)}$$

حيث $\min(r, c)$ هي القيمة الأقل للصفوف والأعمدة.

وكما هو الحال مع معاملات الارتباط السابقة، فإن القيمة الأعلى لمعامل كندل، أي الأقرب للواحد الصحيح، تكون مؤشراً على قوة العلاقة بين المتغيرين، ونظراً لوجود امكانية أن تكون $Q > P$ فإن معامل كندل قد يأخذ القيمة السالبة، وهذا يكون مؤشراً على وجود علاقة عكسية بين المتغيرين.

5.3.3.4 معامل جاما (Gamma Coefficient)

يعتمد معامل جاما لارتباط بين متغيري جدول الاقتران على قيم P و Q أيضاً مثل معامل كندل، وتُعرف صيغته كالتالي:

$$\gamma = \frac{P - Q}{P + Q}$$


وتكون قيمته محصورة بين -1 و 1 كما هو الحال مع معامل كندل.

الآن سنقوم بشرح خطوات تنفيذ اختبار الاستقلالية لجدول الاقتران مع حساب معاملات الارتباط السابقة، ولنستخدم ملف البيانات الأخير، "فيتامين دال". في هذا الملف، سنبدأ باختبار العلاقة بين المتغيرين "مستويات_فيتامين_dal" و "الفئة_العمرية".

في شريط الأدوات العلوي قم باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Crosstabs، فتظهر النافذة الخاصة بتكوين الجداول المشتركة (Crosstabs). في تلك النافذة، قم بنقل المتغير "الفئة العمرية" إلى مربع الصنفوف (Row(s)، ونقل المتغير "مستويات_فيتامين_dal" إلى مربع الأعمدة (Column(s)).

الآن قم بالضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) في يمين النافذة، فتظهر نافذة جديدة، (شكل (23.4))، خاصة باختيار اختبار مربع كاي للاستقلالية ومعاملات الارتباط المتعلقة بجدول الاقتران. لاحظ أننا قمنا في تلك النافذة باختيار اختبار مربع كاي، ومعامل الاقتران ومعامل فاي وكرامر V ومعامل كندل تاو B و C.

نضغط بعد تلك الاختيارات استمرار (Continue) للعودة للنافذة الأصلية. لاحظ أننا لن نقوم باختيار إظهار نسب الخلايا ونسب مجاميع الصفوف والأعمدة من خيار الخلايا (Cells) لأنه قد سبق التطرق لها. الآن اضغط موافق في النافذة الأصلية للحصول على النتائج المطلوبة.



شكل 23.4: نافذة اختيار اختبار الاستقلالية ومعاملات الارتباط لجدول الاقتران.

ستظهر في نافذة المخرجات أربعة جداول؛ الجدول الأول يمثل عدد المشاهدات الفعلية والقيم المفقودة ونسبة، والجدول الثاني هو جدول الاقتران للمتغيرين "مستويات_فيتامين_ DAL" و"الفئة_العمرية"، والجدول الثالث، (جدول $\chi^2_c = 16.552$)، يضم نتائج اختبار مربع كاي للاستقلالية، لاحظ من الصف الأول من الجدول أن $\chi^2_c = 16.552$ وأن القيمة الاحتمالية ($P-value = 0.002$) وهذا يدفعنا لرفض الفرضية الصفرية القائلة بوجود استقلالية بين المتغيرين (الصفوف والأعمدة)، والاستدلال بوجود علاقة ذات أهمية بين معدلات فيتامين DAL وأعمار الأشخاص في العموم. ويرتبط هذه النتيجة مع ما توصلنا له من جدول (22.4)، نستطيع تأكيد انخفاض معدلات فيتامين DAL لدى الأشخاص في الفئة العمرية 51 سنة فأكبر.

جدول 17.4: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلالية للمتغيرين "مستويات_فيتامين_DAL" و"الفئة_العمرية" لملف البيانات "فيتامين DAL".

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.552 ^a	4	.002
Likelihood Ratio	16.285	4	.003
Linear-by-Linear Association	7.956	1	.005
N of Valid Cases	60		

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.73.

والملاحظة الموجودة في أسفل الجدول هي للتتبّيه بوجود 4 تكرارات متوقعة (e_i) قيمها أقل من 5 في حساب قيمة إحصاء مربع كاي.

أما الجدول الرابع في نافذة المخرجات، (جدول 18.4)، فيضم النتائج الخاصة بقيم معاملات الارتباط الخاصة بجدول الاقتران للمتغيرين المعندين. وبالنظر إلى قيم الاحتمالية (P-value) لكل المعاملات، نجد أن جميعها أقل من 0.05 وبالتالي نستطيع القول بوجود علاقة ذات معنوية عالية بين معدلات فيتامين دال والفئة العمرية. لاحظ ارتفاع قيم بعض المعاملات مثل معامل فاي ومعامل الاقتران، ولاحظ أيضاً الإشارة السالبة لمعاملات كندل مما يدل على وجود علاقة عكسية بين المتغيرين.

جدول 18.4: معاملات الارتباط لجدول الاقتران للمتغيرين "مستويات_فيتامين_dal" و"الفئة_العمرية"، لملف "فيتامين دال".

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standardized Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.525			.002
	Cramer's V	.371			.002
	Contingency Coefficient	.465			.002
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	-.347	.114	-3.020	.003
	Kendall's tau-c	-.329	.109	-3.020	.003
N of Valid Cases		60			


a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

4.3.4 اختبار الاستقلالية باستخدام متغيرات تصنيف إضافية

(Test for Independence using additional Classification Variables)

في بعض الدراسات، قد تكون بحاجة لتحليل العلاقة بين متغيرين وصفيين بوجود متغير ثالث أو أكثر يتضمن/يتضمن مستويات يمكن تصنيف العلاقة بين المتغيرين الأساسيين بناءً عليها، ولتوسيع الفكرة لنعد لملف البيانات "فيتامين دال" مرة أخرى، حيث أننا سنقوم الآن باختبار العلاقة بين المتغيرين "مستويات_فيتامين_dal" و"الفئة_العمرية" بناءً على تصنيف الشخص ذكر كان أم أنثى، وأهمية هذه الخطوة تكمن في التحقق من أنه إذا ما وجدت علاقة قوية بين المتغيرين الأساسيين فهل للمتغير الثالث "أثر" على تلك العلاقة أم لا.

في شريط الأدوات العلوى قم باختيار Analyze>Descriptive Statistics>Crosstabs، فتظهر النافذة الخاصة بتكوين الجداول المشتركة (Crosstabs). في تلك النافذة، (شكل 24.4)، قم بنقل المتغير "الفئة العمرية" إلى مربع الصنوف (Row(s)، ونقل المتغير "مستويات_فيتامين_dal" إلى مربع الأعمدة (Column(s)) كما نفذناه سابقاً، ولتعريف المتغير الثالث، متغير "النوع"، قم بنقل هذا المتغير إلى مربع الطبقات (Layer 1 of 1) في أسفل النافذة كما هو موضح في الشكل.



شكل 24.4: تعريف متغير تصنيف إضافي في النافذة الخاصة بتكوين جداول الاقتران.

وننوه هنا إلى أنه يمكن إضافة أكثر من متغير تصنيف في هذا المربع باستخدام زر التالي (Next) الظاهر في النافذة إذا ما تطلب الأمر، إلا أنه في مثالنا الحالي لدينا متغير تصنيف إضافي واحد فقط وهو "النوع".

في خيار الإحصاءات (Statistics) قم باختيار اختبار مربع كاي، ومعلم الاقتران ومعامل فاي وكرامر V ومعجمي كندل تاو B و C ثم اضغط استمرار. وفي نافذة جدول الاقتران، (شكل (24.4))، قم من جديد بالنقر على خيار الخلايا (Cells) وتأكد من عدم اختيار إظهار النسب لعدم الحاجة لها حاليا، ثم اضغط استمرار وفي النافذة الأصلية اختر عرض الأعمدة البيانية المصنفة (Display clustered bar charts)، ثم اضغط موافق.

في نافذة المخرجات، نلاحظ أن جدول الاقتران، (جدول (19.4))، قد تم تقسيمه بحسب الذكور (القسم الأول من الجدول)، والإإناث (القسم الثاني)، والكل (القسم الثالث).

ويمكن من هذا الجدول مراقبة التكرارات، (أو النسب إذا ما أردنا)، للذكور على حده أو الإناث. إلا أنه من عيوب هذا التقسيم أن بعض الخلايا ستكون فيها التكرارات مساوية للصفر وخاصة في العينات الصغيرة كما هو الحال في جدولنا الحالي.

وأهم ما يلاحظ في الجدول (19.4) أن التكرار الأعلى للذكور (10) كان للذكور الذين أعمارهم 51 سنة فأكثر ومستوى فيتامين دال لديهم أقل من 30 نانومول. وأما بالنسبة للإناث، فمعدلات الفيتامين التي تقل عن 30 نانومول كانت متوزعة بصورة متقاربة للفئات العمرية الثلاثة.

جدول 19.4: جدول الاقتران للمتغيرين "مستويات فيتامين دال" و"الفئة العمرية" باستخدام متغير " النوع كمتغير تصنيف، (ملف البيانات "فيتامين دال").

فئات العمر * مستويات فيتامين دال * النوع Crosstabulation

Count

النوع		مستويات فيتامين دال			Total
		أقل من 30	من 30 إلى 75	أكثر من 75	
ذكر	فئات	أقل من 30	0	0	6
	العمر	من 30 إلى 50	0	5	5
		فأكثر 51	10	3	15
	Total		10	8	31
	أنثى	أقل من 30	7	2	1
	العمر	من 30 إلى 50	6	4	0
Total		فأكثر 51	9	0	9
	Total		22	6	1
	فئات	أقل من 30	7	2	7
	العمر	من 30 إلى 50	6	9	5
Total		فأكثر 51	19	3	2
	Total		32	14	14
					60

أما الجدول التالي في نافذة المخرجات، (جدول (20.4))، فنلاحظ فيه ما يلي؛

جدول 20.4: نتيجة اختبار مربع كاي للاستقلالية للمتغيرين "مستويات فيتامين دال" و"الفئة العمرية" باستخدام متغير " النوع كمتغير تصنيف، (ملف البيانات "فيتامين دال").

Chi-Square Tests

النوع		Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
ذكر	Pearson Chi-Square	22.584 ^b	4	.000
	Likelihood Ratio	27.207	4	.000
	Linear-by-Linear Association	15.888	1	.000
	N of Valid Cases	31		
أنثى	Pearson Chi-Square	6.635 ^c	4	.156
	Likelihood Ratio	8.300	4	.081
	Linear-by-Linear Association	2.627	1	.105
	N of Valid Cases	29		
Total	Pearson Chi-Square	16.552 ^a	4	.002
	Likelihood Ratio	16.285	4	.003
	Linear-by-Linear Association	7.956	1	.005
	N of Valid Cases	60		

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.73.
b. 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.55.
c. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .31.

من الصف الأول في القسم الأول من الجدول، الخاص بالذكور، نرى أن $\chi^2_c = 22.584$ وأن القيمة الاحتمالية (P-value = 0) وهذا يدفعنا لرفض الفرضية الصفرية؛ توجد استقلالية بين المتغيرين (الذكور) H_0 ، والقول بوجود علاقة ذات أهمية بين معدلات فيتامين دال وأعمار الرجال في العموم. ومن الصف الأول في القسم الثاني من الجدول، الخاص بالإإناث، نرى أن $\chi^2_c = 6.635$ وأن القيمة الاحتمالية (P-value = 0.156) وهذا يدفعنا لقبول الفرضية الصفرية؛ توجد استقلالية بين المتغيرين (الإناث) H_0 ، والقول بعدم وجود علاقة بين معدلات فيتامين دال وأعمار النساء في العموم. وتنتأكد هذه النتائج من خلال حساب معاملات الارتباط في جدول (21.4).

جدول 21.4: معاملات الارتباط لجدول الاقتران للمتغيرين "مستويات_فيتامين_dal" و"الفئة_العمرية" باستخدام متغير " النوع كمتغير تصنيف، (ملف البيانات "فيتامين دال").


Symmetric Measures					
النوع		Value	Asymptotic Standardized Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
ذكر	Phi	.854			.000
	Nominal by Cramer's V	.604			.000
	Nominal Contingency Coefficient	.649			.000
	Ordinal by Kendall's tau-b	-.694	.089	-7.148	.000
	Ordinal Kendall's tau-c	-.665	.093	-7.148	.000
	N of Valid Cases	31			
أنثى	Phi	.478			.156
	Nominal by Cramer's V	.338			.156
	Nominal Contingency Coefficient	.431			.156
	Ordinal by Kendall's tau-b	-.269	.136	-1.797	.072
	Ordinal Kendall's tau-c	-.203	.113	-1.797	.072
	N of Valid Cases	29			
Total	Phi	.525			.002
	Nominal by Cramer's V	.371			.002
	Nominal Contingency Coefficient	.465			.002
	Ordinal by Kendall's tau-b	-.347	.114	-3.020	.003
	Ordinal Kendall's tau-c	-.329	.109	-3.020	.003
	N of Valid Cases	60			

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

حيث نلاحظ من الجدول، (في القسم الأول)، أن جميع معاملات الارتباط للمتغيرين "مستويات_فيتامين_dal" و"الفئة_العمرية" قيمها مرتفعة عند الذكور، إضافة لكونها ذات معنوية، (كل القيم الاحتمالية P-value=0)، وهذا يدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين عند الرجال.

أما عند النساء، (في القسم الثاني من الجدول (21.4))، فالوضع على النقيض، إذ نلاحظ أن جميع القيم الاحتمالية P-value>0.05، مما يدفعنا للقول بعدم وجود علاقة معنوية بين "مستويات_فيتامين_dal" و"الفئة_العمرية" عند النساء.

وهذه النتائج يمكن ملاحظتها بصورة مرئية من خلال الأعمدة البيانية المصنفة لكل من الذكور والإإناث في الشكل .(25.4).



شكل 25.4: الأعمدة البيانية المصنفة للمتغيرين "الفئة_العمرية" و"مستويات_فيتامين_ DAL" للذكور (إلى اليمين)، والإإناث (إلى اليسار)، (ملف البيانات "فيتامين DAL").

وكخلاصة لما سبق من النتائج الخاصة بدراسة العلاقة بين متغيري "مستويات_فيتامين_DAL" و"الفئة_العمرية"، والتي تشمل جدول الاقتران المتضمن للنسب، الأعمدة البيانية المصنفة، اختبار الاستقلالية، ومعاملات الارتباط لجدول الاقتران بوجود متغير تصنيف النوع)، نستطيع القول بوجود علاقة عكسية قوية بين معدلات فيتامين DAL وأعمار الرجال، حيث أن الرجال الذين اجتازوا الخمسين عاما هم أكثر عرضة لنقص فيتامين DAL في أجسامهم.

4.4 تحليل التباين (Analysis of Variance (ANOVA))

يُعد مفهوم تحليل التباين من المفاهيم الهامة والأساسية في نظرية الاستدلال الإحصائي، حيث أنه يعتمد على مقارنة تساوي متطلبات عدة مجتمعات، (ثلاثة فأكثر)، من خلال تحليل الاختلاف بين تلك المتطلبات، وهو ما يُعرف بتحليل التباين في اتجاه واحد (One-way ANOVA)، أو تحليل الاختلاف بين المتطلبات وداخل المجتمعات (أو المجموعات) معا، وهو ما يُعرف بتحليل التباين في اتجاهين (Two-way ANOVA). وسنبدأ بشرح كيفية تنفيذ التحليل الأول؛

1.4.4.1 تحليل التباين في اتجاه واحد (One-way ANOVA)

سنستخدم ملف البيانات "معدلات الطلبة" لتوضيح كيفية تنفيذ تحليل التباين في اتجاه واحد في SPSS، حيث يمثل "معدل_الطالب" المتغير الرئيسي أو التابع في التحليل ويمثل "القسم_العلمي" متغير تقسيم المجموعات والتي تمثل الأقسام العلمية الثلاثة؛ الرياضيات (MA)، الإحصاء (ST)، والفيزياء (PH). وسيكون الهدف هو

التحقق من تجانس/اختلاف المستوى الدراسي للطلبة في الأقسام الثلاثة، أي اختبار الفرضية الصفرية:


$$H_0: \mu_{MA} = \mu_{ST} = \mu_{PH}$$

في شريط الأوامر العلوي، قم باختيار Analyze>Compare Means>One-Way ANOVA، فتظهر نافذة تحليل التباين في اتجاه واحد (One-way ANOVA) كما يوضح الشكل (26.4). قم في تلك النافذة بنقل المتغير "معدل_الطالب" إلى المربع الخاص بالمتغير التابع (Dependent List) ونقل المتغير "القسم_العلمي" إلى المربع الخاص بمتغير التصنيف أو المجموعات (Factor).



شكل 26.4: نافذة تحليل التباين في اتجاه واحد لملف البيانات "معدلات الطلبة".

اضغط على أمر الخيارات (Options) فتظهر النافذة الفرعية التالية، (شكل (27.4))، قم فيها باختيار عرض المقاييس الإحصائية الوصفية (Descriptive) واختبار تساوي التباينات (Homogeneity of variance test) (Descriptive) والتمثيل البياني للمتوسطات (Means plot)، وهذه الخيارات في الواقع قد تم التطرق إليها في مواضع سابقة في الكتاب إلا أننا نقوم باختيارها هنا لتكون جزءاً مكملاً لنتائج تحليل التباين. بعد الانتهاء من اختيار ما سبق اضغط استمرار للعودة للنافذة الأصلية للتحليل.




شكل 27.4: نافذة الخيارات ضمن نافذة تحليل التباين في اتجاه واحد.

حيث أننا نقوم حالياً باختبار تساوي ثلاثة متوسطات، فمن المتوقع أن تكون إما كلها متساوية، (وهذا ما ينتج عن قبول الفرضية الصفرية لاختبار تحليل التباين)، أو أن نرفض تلك الفرضية الصفرية والذي سينتاج عنه وجود متوسطان متساويان على الأقل، بمعنى أننا في مثلثنا الحالي سنكون بحاجة لاختبار تساوي المتوسطات في ثلاثة حالات هي؛

$$H_0: \mu_{ST} = \mu_{MA} = \mu_{PH}$$

μ_{PH} ، بمعنى اختبار تساوي المستوى الدراسي للطلبة في كل قسمين على حدة، وهو ما يتم باستخدام اختبار تساوي الأوساط في مجتمعين كما شرحنا سابقاً في هذا الفصل.

لذلك، وكخطوة استباقية، سنقوم باختيار تنفيذ هذه الاختبارات "الفرعية" للحصول على معلومات إضافية تساعدنا في الحكم النهائي على مدى تجانس المستوى الدراسي للطلبة في الأقسام العلمية. ولعمل ذلك قم باختيار خيار التحليل البَعْدِي (Post Hoc)، والذي سيُظهر النافذة الفرعية التالية، (شكل (28.4))؛



شكل 28.4: نافذة التحليل البَعْدِي في تحليل التباين في اتجاه واحد.

قم في تلك النافذة باختيار اختبارات المقارنة المتعددة لبونفيروني (Bonferroni)، ويمكن التحكم بمستوى المعنوية المطلوب من مربع (Significance level) في أسفل النافذة، وسنقي هنا على مستوى المعنوية الافتراضي وهو 0.05. قم بعدها بالضغط على استمرار للعودة للنافذة الأصلية، وفي تلك النافذة اضغط موافق.

ستظهر بعد ذلك النتائج المطلوبة في نافذة المخرجات، والجدول الأول في هذه النتائج، (جدول (22.4))، يضم القيم المحسوبة للمعدلات في كل قسم من الأقسام الثلاثة، وهذه القيم تشمل الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، الخطأ المعياري لتقدير الوسط الحسابي، فترة الثقة لتقدير الوسط الحسابي للمجتمع، والقيمة الصغرى والكبيرة للمعدلات. وهذه المقاييس قد تم التعليق عليها في الفصل الثالث لنفس البيانات.

جدول 22.4: بعض المقاييس الإحصائية لمعدلات الطلبة في الأقسام العلمية لملف البيانات "معدلات الطلبة".

Descriptives								
معدل الطالب								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
MA	30	2.0027	.67117	.12254	1.7520	2.2533	1.26	3.67
ST	30	1.6463	.25022	.04568	1.5529	1.7398	1.15	2.18
PH	30	1.6857	.21144	.03860	1.6067	1.7646	1.26	2.31
Total	90	1.7782	.45550	.04801	1.6828	1.8736	1.15	3.67

والجدول الثاني في نافذة المخرجات، (جدول 23.4)، يمثل نتيجة اختبار تجانس تباينات معدلات الطلبة في الأقسام العلمية الثلاثة باستخدام اختبار ليفين، ومنه نستنتج وجود اختلاف بين تباينات معدلات الطلبة، ($P-value = 0$).

جدول 23.4: اختبار تجانس التباينات لبيانات "معدلات الطلبة" في الأقسام في ملف البيانات "معدلات الطلبة".

Test of Homogeneity of Variances			
معدل الطالب	Levene Statistic	df1	df2
	14.098	2	87

أما الجدول الثالث، (جدول 24.4)، فيمثل النتيجة الرئيسية في هذا التحليل الإحصائي وهو جدول تحليل التباين في اتجاه واحد.

جدول 24.4: جدول تحليل التباين في اتجاه واحد لمعدلات الطلبة في الأقسام الثلاثة في ملف البيانات "معدلات الطلبة".

ANOVA					
معدل الطالب	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.290	2	1.145	6.159	.003
Within Groups	16.176	87	.186		
Total	18.466	89			

ومن هذا الجدول يمكننا الجزم بوجوب رفض الفرضية الصفرية القائلة بتساوي المتوسطات الثلاثة، (حيث أن القيمة الاحتمالية $P-value = 0.003$)، وهذا يدل على وجود متقطنان مختلفان على الأقل، (أي وجود قسمان على الأقل يختلف فيما بينهما مستوى الطلبة الدراسي)، ضمن المتوسطات الثلاثة. وهذا يدفعنا لإجراء اختبارات المقارنة المتعددة للمتوسطات في الجدول التالي، جدول (25.4)؛

جدول 25.4: جدول اختبارات المقارنة المتعددة للمتوسطات في أقسام الرياضيات، الإحصاء، والفيزياء في ملف البيانات "معدلات الطلبة".

Multiple Comparisons						
Dependent Variable:	معدل الطالب	Bonferroni	Mean Difference (I-J)	Std. Error	95% Confidence Interval	
					Sig.	Lower Bound
MA	ST		.35633*	.11133	.006	.0846 .6281
	PH		.31700*	.11133	.017	.0452 .5888
ST	MA		-.35633*	.11133	.006	-.6281 -.0846
	PH		-.03933	.11133	1.000	-.3111 .2324
PH	MA		-.31700*	.11133	.017	-.5888 -.0452
	ST		.03933	.11133	1.000	-.2324 .3111

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ومن هذا الجدول يتبيّن لنا ما يلي:

1. وجود اختلاف بين معدلات الطلبة في قسمي الرياضيات والإحصاء، حيث أن القيمة الاحتمالية لاختبار


$$H_0: \mu_{MA} = \mu_{ST}$$

2. وجود اختلاف بين معدلات الطلبة في قسمي الرياضيات والفيزياء أيضاً، حيث أن القيمة الاحتمالية لاختبار

$$H_0: \mu_{MA} = \mu_{PH}$$

3. وجود تكافؤ بين معدلات الطلبة في قسمي الإحصاء والفيزياء، حيث أن القيمة الاحتمالية لاختبار الفرضية

$$H_0: \mu_{ST} = \mu_{PH}$$



شكل 29.4: التمثيل البياني لمتوسطات الأقسام الثلاثة.

والنتيجة الأخيرة في نافذة المخرجات، شكل (29.4)، تُظهر التمثيل البياني لمتوسطات المعدلات في الأقسام العلمية الثلاثة، ونلاحظ فيها بوضوح مدى اختلاف (ارتفاع) متوسط معدلات الطلبة في قسم الرياضيات عن قسمي الإحصاء والفيزياء.

2.4.4 تحليل التباين في اتجاهين (Two-way ANOVA)

في تحليل التباين في اتجاه واحد، رأينا كيف أن الاهتمام كان متركزاً على دراسة الاختلاف بين عدة مجموعات، (والتي تكون عادة ممثلة بأعمدة البيانات)، أما في تحليل التباين في اتجاهين، فإنه إضافة لاختبار الأعمدة وختبار الصفوف، (اتجاه واحد أيضاً)، فإننا نقوم بدراسة تداخل الأعمدة والصفوف معاً، أي كأننا ندرس العلاقة بين متغيرين. ولتوضيح كيفية تفزيز تحليل التباين في اتجاهين لأخذ المثال التالي؛

البيانات في الجدول (26.4) تمثل أطوال عينة مكونة من 20 طفلاً بالسنتيمتر تم تقسيمهم إلى خمسة مجموعات (أعمدة الجدول)، كل مجموعة تم إعطاؤها نوع محدد من الحليب (Milk1, Milk2, ..., Milk5)، ويدخل كل مجموعة من هذه المجموعات الخمسة تم اعتماد أربعة أنواع من فيتامين دال (Vit.D1, ..., Vit.D4) بواقع نوع واحد من الفيتامين لكل طفل، (وهو ما تمثله صفوف الجدول)، وذلك خلال عدة سنوات، بمعنى أن الطفل الأول في العينة، (القيمة الأولى في أعلى يسار الجدول)، والذي طوله 95 سم، قد تم إعطاؤه نوع الحليب (Milk1) ونوع الفيتامين (Vit.D1)، وهذا.

جدول 26.4: أطوال عينة من الأطفال بالستيمر بحسب نوع الحليب ونوع الفيتامين المستخدم.

		نوع حليب الأطفال				
		Milk1	Milk2	Milk3	Milk4	Milk5
نوع فيتامين دال	Vit.D1	95	101	93	96	100
	Vit.D2	97	100	98	97	94
	Vit.D3	120	116	125	118	122
	Vit.D4	90	88	93	89	87

سنقوم أولاً بإدخال هذه البيانات في ملف جديد في SPSS باسم "أطوال الأطفال"، بحيث يتم تعريف ثلاثة متغيرات كالتالي:


- المتغير الأول، باسم "طول_الطفل"، ويمثل أطوال جميع الأطفال في العينة، حيث يتم إدخال قيم العامود الأول (Milk1) أولاً ثم قيم العامود الثاني (Milk2) تحتها، وهكذا حتى العامود الخامس (Milk5).
- المتغير الثاني، باسم "نوع_الحليب"، ويمثل نوع حليب الأطفال المعطى لكل طفل، حيث سيتم إعطاء القيمة 1 لأول أربعةأطفال، والقيمة 2 لثاني أربعةأطفال، وهكذا حتى القيمة 5 التي ستعطى لآخر أربعةأطفال. مع ملاحظة إعطاء القيم من 1 إلى 5 التعريف (Milk1) إلى (Milk5) على الترتيب في خانة القيم (Values) في نافذة المتغيرات.
- المتغير الثالث، باسم "نوع_الفيتامين"، ويمثل نوع الفيتامين المعطى لكل طفل، حيث سيتم إعطاء القيم 1، 2، 3، 4 لكل أربعةأطفال بدء من الأعلى، إلى الأسفل. مع ملاحظة إعطاء القيم من 1 إلى 4 التعريف (Vit.D1) إلى (Vit.D4) على الترتيب في خانة القيم (Values) في نافذة المتغيرات.

عند الانتهاء سيأخذ ملف البيانات الشكل التالي، (شكل (30.4)):

	طول_الطفل	نوع_الحليب	نوع_الفيتامين
1	95	Milk1	Vit.D1
2	97	Milk1	Vit.D2
3	120	Milk1	Vit.D3
4	90	Milk1	Vit.D4
5	101	Milk2	Vit.D1
6	100	Milk2	Vit.D2
7	116	Milk2	Vit.D3
8	88	Milk2	Vit.D4
9	93	Milk3	Vit.D1
10	98	Milk3	Vit.D2
11	125	Milk3	Vit.D3

شكل 30.4: ملف البيانات "أطوال_الأطفال" في SPSS.

ولتنفيذ تحليل التباين في اتجاهين، اختر Analyze>General Linear Model>Univariate في شريط الأدوات العلوي فتظهر النافذة التالية، (شكل (31.4)):




شكل 31.4: نافذة تحليل التباين في اتجاهين لملف البيانات "أطوال_الأطفال".

في هذه النافذة، قم باختيار المتغير "طول_ال طفل" كمتغير تابع (Dependent Variable)، والمتغيران "نوع_الحليب" و"نوع_الفيتامين" كمتغيرات تقسيم (Fixed Factor(s)) كما هو موضح في الشكل السابق.

الآن اضغط على خيار النموذج (Model) فتظهر نافذة فرعية، (كما يظهر في الشكل (32.4))، وسنقوم بتنفيذ أربعة أمور في تلك النافذة، كما يظهر فيها:

1. تغيير خيار تحديد النموذج (Specify Model) إلى مخصص (Custom).
2. نقل كل من المتغيرين "نوع_الحليب" و"نوع_الفيتامين" إلى مربع النموذج (Model) إلى اليمين.
3. اختيار النوع اتجاهين (All 2-way) من النافذة التي هي في المنتصف (Build Term(s)).
4. اختيار عدم إظهار ثابت النموذج (Include intercept in model) في أسفل النافذة.

وبعد تنفيذ الخطوات السابقة، اضغط استمرار للعودة للنافذة الأصلية.



شكل 32.4: نافذة اختيار نوع النموذج في تحليل التباين في اتجاهين لملف البيانات "أطوال_الأطفال".

في النافذة الأصلية، (شكل (31.4))، قم بالنقر على خيار الرسم (Plots) لاختيار عرض التغير في المتوسطات لأطوال الأطفال مرة مع نوع الحليب ومرة مع نوع الفيتامين ومرة أخرى مع الاثنين في آن واحد. لتنفيذ ذلك، قم بالخطوات الثلاثة التالية، (في الشكل (33.4)):)

1. انقل المتغير "نوع_الحليب" إلى المحور الأفقي (Horizontal Axis) ثم اضغط إضافة (Add) لاختيار



شكل 33.4: نافذة اختيار عرض الرسم في تحليل التباين في اتجاهين لملف البيانات "أطوال_الأطفال".


1. انقل المتغير "نوع_الحليب" إلى المحور الأفقي (Horizontal Axis) ثم اضغط إضافة (Add)

عرض رسم هذا المتغير.

2. بالمثل انقل المتغير "نوع_فيتامين" إلى المحور الأفقي (Horizontal Axis) ثم اضغط إضافة (Add) لاختيار عرض رسم هذا المتغير أيضا.

3. الآن انقل المتغير "نوع_الحليب" من جديد في خانة المحور الأفقي (Horizontal Axis) والمتغير "نوع_فيتامين" إلى خانة الخطوط المنفصلة (Separate Lines) ثم اضغط إضافة (Add)

بعد ذلك اضغط استمرار للعودة للنافذة الأصلية، (شكل (31.4))، وفي تلك النافذة اضغط من جديد خيار التحليل البعدي (Post Hoc)، والذي سيُظهر نافذة فرعية جديدة، (شكل (34.4))، قم بعدها باختيار إجراء مقارنات بين أوساط مستويات المتغيرين "نوع_الحليب" و"نوع_الفيتامين" عن طريق نقلهما إلى مربع اختبارات التحليل البعدي (Post Hoc Tests for) (Bonferroni)، ثم اختيار إجراء اختبارات المقارنة المتعددة لبونفريونى (Post Hoc Tests for Bonferroni)، والضغط على استمرار. وفي النافذة الأصلية اضغط موافق.



شكل 34.4: نافذة اختيار المقارنات المتعددة للأوساط في تحليل التباين في اتجاهين لملف البيانات "أطوال_الأطفال".

ستظهر النتائج المطلوبة بعد ذلك في نافذة المخرجات. الجدول الأول يُظهر تقسيم المستويات في جدول البيانات وعدد القيم في كل مستوى.

الجدول الثاني، (جدول (27.4))، هو الجدول الأساسي في مجموعة النتائج ويمثل جدول تحليل التباين في اتجاهين.

جدول 27.4: نتائج جدول تحليل التباين في اتجاهين لملف البيانات "أطوال_الأطفال".

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable:	طول_ال طفل				
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Model	206497.900 ^a	8	25812.238	2516.221	.000
نوع_الحليب	11.700	4	2.925	.285	.882
نوع_الفيتامين	2668.150	3	889.383	86.699	.000
Error	123.100	12	10.258		
Total	206621.000	20			

a. R Squared = .999 (Adjusted R Squared = .999)

وأهم ما نستنتج منه:

1. عدم وجود اختلاف بين أطوال الأطفال نتيجة لاختلاف أنواع الحليب، أي أن تأثير أنواع الحليب الخمسة متساوي على نمو الأطفال، بمعنى قبول الفرضية الصفرية:

$$H_0: \mu_{Milk1} = \mu_{Milk2} = \mu_{Milk3} = \mu_{Milk4} = \mu_{Milk5}$$

حيث أن القيمة الاحتمالية للاختبار .P-value = 0.882.

2. وجود اختلاف ذو معنوية بين أطوال الأطفال نتيجة لاختلاف أنواع الفيتامين المستخدم، أي أن تأثير أنواع الفيتامين الأربعة غير متساوي على نمو الأطفال، بمعنى رفض الفرضية الصفرية:

$$H_0: \mu_{Vit.D1} = \mu_{Vit.D2} = \mu_{Vit.D3} = \mu_{Vit.D4}$$

حيث أن القيمة الاحتمالية للاختبار .P-value = 0.

والنتيجة السابقة تدفعنا للتحقق من أنواع الفيتامين التي المختلفة فيما بينها وذلك عن طريق ملاحظة الجدول الخاص بالمقارنات المتعددة للمتغير "نوع_الفيتامين" في الجدول (28.4)؛

جدول 28.4: المقارنات المتعددة بين متغيرات أنواع الفيتامين في تحليل التباين في اتجاهين لملف البيانات "أطوال_الأطفال".

Multiple Comparisons						
Dependent Variable:	طول_ال طفل					
Bonferroni						
(I)	نوع_الفيتامين	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
Vit.D1	Vit.D2	-.20	2.026	1.000	-6.59	6.19
	Vit.D3	-23.20-*	2.026	.000	-29.59	-16.81
	Vit.D4	7.60*	2.026	.017	1.21	13.99
Vit.D2	Vit.D1	.20	2.026	1.000	-6.19	6.59
	Vit.D3	-23.00-*	2.026	.000	-29.39	-16.61
	Vit.D4	7.80*	2.026	.014	1.41	14.19
Vit.D3	Vit.D1	23.20*	2.026	.000	16.81	29.59
	Vit.D2	23.00*	2.026	.000	16.61	29.39
	Vit.D4	30.80*	2.026	.000	24.41	37.19
Vit.D4	Vit.D1	-7.60-*	2.026	.017	-13.99	-1.21
	Vit.D2	-7.80-*	2.026	.014	-14.19	-1.41
	Vit.D3	-30.80-*	2.026	.000	-37.19	-24.41

Based on observed means.
The error term is Mean Square (Error) = 10.258.
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

من هذا الجدول، نستطيع ملاحظة التالي:

1. وجود اختلاف معنوي بين نوع الفيتامين الأول (Vit.D1) وكل من نوعي الفيتامين الثالث والرابع

Vit.D4 و Vit.D3)، حيث أن القيمة الاحتمالية الخاصة باختبار تساوي المتosteats هي أقل من

.0.05

2. عدم وجود اختلاف معنوي بين نوع الفيتامين الأول (Vit.D1) ونوع الفيتامين الثاني (Vit.D2)، حيث

أن القيمة الاحتمالية الخاصة باختبار تساوي المتosteats هي أكبر من .0.05.

3. وجود اختلاف معنوي بين نوع الفيتامين الثاني (Vit.D2) وكل من نوعي الفيتامين الثالث والرابع

Vit.D4 و Vit.D3)، حيث أن القيمة الاحتمالية الخاصة باختبار تساوي المتosteats هي أقل من


.0.05

4. وجود اختلاف معنوي بين نوع الفيتامين الثالث (Vit.D3) وكل أنواع الفيتامين الأخرى، حيث أن القيمة

الاحتمالية الخاصة باختبار تساوي المتosteats هي أقل من .0.05.

وهذه النتائج يمكن ملاحظتها أيضا بصورة مرئية من خلال التمثيل البياني، شكل (35.4)، الخاص بالتغيير في

متosteats أنواع الحليب ومتosteats أنواع الفيتامين.



شكل 35.4: التمثيل البياني للأوساط في تحليل التباين في اتجاهين للمتغيرات في ملف البيانات "أطوال_الأطفال".

الفصل الخامس

تحليل الارتباط والانحدار الخطي (Linear Correlation and Regression Analysis)

إن من أهم المفاهيم التي يرتكز عليها علم الإحصاء هو دراسة العلاقات ضمن المتغيرات في البيانات، وتحليلها، وتكوين النماذج التي تفسر العلاقات السببية بينها. وفي هذا الفصل، سنستعرض كيفية تنفيذ تحليل الارتباط والانحدار الخطي باستخدام برنامج SPSS.

1.5 تحليل الارتباط الخطي (Linear Correlation Analysis)

يستخدم تحليل الارتباط لدراسة العلاقات بين المتغيرات، وذلك من خلال حساب معامل (مقاييس كمي) يسمى **معامل الارتباط** (Correlation Coefficient) والذي بدوره يعكس من خلال قيمته نوع وقوة العلاقة الموجودة بين المتغيرات. ويمكن تصنيف دراسة الارتباط من حيث طبيعة العلاقة بين المتغيرات إلى الارتباط الخطي وغير الخطي (Linear and Non Linear Correlation).

فالارتباط الخطي هو الذي يهتم بدراسة العلاقات الخطية بين متغيرات الدراسة والتي يمكن تمثيلها بمعادلات رياضية من الدرجة الأولى؛ (مثلا: $y = 3x - 1$)، وهذا النوع من الارتباط هو الذي سيتم تناوله في هذا الفصل من الكتاب. أما الارتباط غير الخطي فهو يدرس العلاقات التي تمثلها معادلات غير خطية؛ (مثلا: $y = 5e^x$ أو $y = 3x^2 - 1$).

وكذلك يمكن تصنيف دراسة الارتباط من حيث طبيعة معامل الارتباط وعدد المتغيرات إلى الارتباط البسيط،الجزئي، والمتعدد (Simple, Partial, and Multiple Correlation)، فالارتباط البسيط هو الذي يدرس العلاقة بين متغيرين فقط، والجزئي يدرس العلاقة بين متغيرين بوجود تأثير لمتغير أو أكثر على هذين المتغيرين، أما الارتباط المتعدد فهو يقيس العلاقة بين مجموعة من المتغيرات في آن واحد.

ويتم عادة مراقبة أو دراسة الارتباط بين المتغيرات بطريقتين؛ طريقة الرسم وهي تمثيل قيم المتغيرات بيانياً وهو ما يعرف بـ **شكل الانتشار** (Scatter Plot). والطريقة الثانية هي الطريقة الجبرية وذلك بحساب قيمة معامل الارتباط من خلال الصيغة الحسابية الخاصة بالمعامل.

1.1.5 دراسة الارتباط باستخدام شكل الانتشار (Analyzing Correlation by Scatterplot)

إن دراسة الارتباط عن طريق التمثيل البياني لمتغيرين باستخدام شكل الانتشار يتم عن طريق رسم النقاط على محوري الرسم السيني (X) والصادي (Y) في بُعدين (2D)، ويعد هذا انعكاساً لقيمة معامل الارتباط الخطي في الواقع. وللوضيح كيفية تفزيز ذلك في SPSS لنأخذ المثال التالي:

قم في برنامج SPSS بفتح ملف البيانات "بيانات الطلبة" ونذكر القارئ هنا بأن هذه البيانات تضم ثمانية متغيرات لعينة مكونة من 35 طالباً في إحدى الكليات، وهذه المتغيرات هي تقديرات الطلبة في ثلاثة مقررات دراسية؛ 1، 2، و 3، عمر الطالب بالسنوات، جنس الطالب، ترتيب الفصل الدراسي للطالب، عدد أفراد أسرة الطالب، وعدد الحجرات في منزل الطالب.


سنقوم أولاً بإضافة متغير جديد لهذه البيانات بهدف تعزيز مفهوم العلاقة بين المتغيرات. هذا المتغير، (جدول (1.5))، هو معدل عدد ساعات الدراسة اليومية للطالب خارج مواعيد المحاضرات، أي تقدير الطالب لعدد الساعات التي يستغرقها في الدراسة والمراجعة خلال أسبوع مقسوماً على سبعة أيام.

جدول 1.5: متغير معدل عدد ساعات الدراسة اليومية للطالب.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	1	2	2.5	0.5	3	3.5	5	4.5	3.5	1	2	2.5	3.5	4	1	0.5	1
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
4.5	3	3.5	4.5	2.5	4	1.5	3.5	5	2	2.5	2.5	2.5	1.5	5	2	5.5	

بعد إضافة هذا المتغير، والذي سيأخذ الاسم "ساعات_الدراسة"، لملف البيانات "بيانات الطلبة" سنقوم بحفظ الملف باسم "بيانات الطلبة2" في برنامج SPSS.

لتتنفيذ شكل الانتشار، قم من شريط الأوامر العلوي باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/Dot فتظهر




شكل 1.5: نافذة اختيار نوع شكل الانتشار.

النافذة التالية، (شكل (1.5))؛ في تلك النافذة، سنبني على الخيار الافتراضي، وهو شكل الانتشار البسيط (Simple Scatter)، على أن نطرق لخيارات الأخرى لشكل الانتشار لاحقاً.


نضغط بعد ذلك على تعريف (Define) فتظهر نافذة جديدة لاختيار المتغيرات في شكل الانتشار البسيط كما في الشكل (2.5).

في تلك النافذة، سنقوم باختيار المتغير "مقرر 1" ونقله لمربع المحور الصادى (Y-Axis) واختيار المتغير "ساعات_الدراسة" ونقله لمربع المحور السيني (X-Axis)، أي أننا نريد التعرف على شكل العلاقة بين درجات الطلبة في المقرر 1 ومعدل ساعات دراستهم اليومية.



شكل 2.5: نافذة اختيار متغيرات شكل الانتشار البسيط.

بعد اختيار المتغيرات والضغط على موافق سيظهر شكل الانتشار، (شكل (3.5))، في نافذة المخرجات.




شكل 3.5: شكل الانتشار البسيط للمتغيرين "مقرر 1" و"ساعات_الدراسة".

من شكل (3.5)، يمكننا بوضوح ملاحظة وجود علاقة خطية طردية قوية جداً بين المتغيرين، وهذا يكون منطقياً لأنَّه بزيادة ساعات الدراسة اليومية فإنَّ الدرجات ستزيد في المقرر.

ويمكِّننا أيضاً استخدام شكل الانتشار لمراقبة علاقَة متغير بأكثر من متغير على نفس الرسم، فمثلاً إذا ما أردنا التعرُّف على شكل علاقَة معدل ساعات الدراسة بدرجات الطالبة في المقررات الثلاثة، يمكننا عمل الآتي:

في شريط الأوامر العلوي باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/Dot وفي نافذة اختيار شكل الانتشار، (شكل (1.5))، قم باختيار شكل الانتشار الفوقي (Overlay Scatter) ثم اضغط تعريف فتظهر نافذة جديدة كما في الشكل (4.5)؛




شكل 4.5: نافذة اختيار المتغيرات في شكل الانتشار الفوقي.

في هذه النافذة، سيتم إدخال المتغيرات بصورة أزواج في مربع المحورين السيني والصادري (X-Y Pairs)؛ فيتتم إدراج المتغير "مقرر 1" أولاً ثم المتغير "ساعات_دراسة"، ثم المتغير "مقرر 2" ثم المتغير "ساعات_دراسة"، ثم المتغير "مقرر 3" ثم المتغير "ساعات_دراسة"، كما هو موضح في الشكل السابق، وبعد الانتهاء من الاختيار نضغط موافق.

سيظهر شكل الانتشار المطلوب في نافذة المخرجات، (مع اختلاف في أشكال وألوان نقاط الرسم بالنسبة للقارئ، حيث أنه تم تغييرها في الشكل للحصول على مزيد من الوضوح في الرؤيا). وننوه هنا إلى أنَّ الشكل (5.5) يمثل

"مجا" لثلاثة أشكال انتشار هي للمتغيرات "مقرر 1" مع "ساعات_الدراسة"، و"مقرر 2" مع "ساعات_الدراسة"، و"مقرر 3" مع "ساعات_الدراسة" في شكل واحد لتسهيل عملية المقارنة.




شكل 5.5: شكل الانتشار الفوقي للمتغيرات "مقرر 1" و"مقرر 2" و"مقرر 3" مع "ساعات_الدراسة".

من شكل الانتشار يمكننا ملاحظة وجود علاقة خطية طردية قوية بين معدل ساعات الدراسة ودرجات الطلبة في المقررين 1 و 2، أما المقرر 3 فعلاقته ضعيفة جداً مع ساعات الدراسة، أي أن الزيادة في عدد ساعات الدراسة للطلبة يزيد وبشكل كبير من درجات الطلبة في المقررين 1، و 2 ولكن لا تزيد درجاتهم في المقرر 3 وهذا قد يدفع الباحث للنظر في طبيعة الظروف المحيطة بهذا المقرر.

نوع آخر من التمثيل البياني لشكل الانتشار هو ما يُعرف بمصفوفة الانتشار (Scatterplot Matrix)، والتي تُستخدم لعرض أشكال الانتشار لعدة متغيرات (متغيرين فأكثراً) في شكل مصفوفة مربعة كما سنرى؛


في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/Dot وفي نافذة اختيار شكل الانتشار، (شكل (1.5))، قم باختيار شكل مصفوفة الانتشار (Matrix Scatter) ثم اضغط تعريف فتظهر نافذة جديدة كما في الشكل (6.5).

سنقوم، وعلى سبيل المثال، باختيار المتغيرات "العمر"، "الأسرة"، "المنزل"، و"ساعات_الدراسة" ونقلها إلى مربع متغيرات المصفوفة (Matrix Variables) كما يظهر في الشكل ثم نضغط موافق.



شكل 6.5: نافذة اختيار المتغيرات في مصفوفة الانتشار.

ستظهر مصفوفة شكل الانتشار المطلوبة بعدها في نافذة المخرجات، (شكل (7.5)).




شكل 7.5: مصفوفة الانتشار لمتغيرات "العمر"، "الأسرة"، "المنزل"، و"ساعات_الدراسة".

من الشكل (7.5) يمكننا ملاحظة ما يلي، (حيث أن كل شكل انتشار في المصفوفة هو خاص بالمتغيرين في الصف والعمود للشكل المحدد):

1. وجود علاقة خطية طردية قوية بين معدل ساعات الدراسة اليومية وعدد الحجرات في منزل الطالب، أي أنه بزيادة عدد الحجرات تزيد ساعات الدراسة، وهذا يُعد منطقياً حيث أن المزيد من الحجرات يعني توفر المساحة والمكان الكافي للدراسة.
2. وجود علاقة خطية عكسية قوية بين معدل ساعات الدراسة اليومية وعدد أفراد أسرة الطالب، معنى أنه كلما كبر حجم الأسرة كلما أدى ذلك لتناقص في معدل ساعات الدراسة، وربما كان التفسير وراء ذلك هو اكتظاظ منزل الطالب مما يؤثر على الجو العام للمذاكرة.
3. وجود علاقة ضعيفة جداً بين معدل ساعات الدراسة اليومية وعمر الطالب، مما يدل على أن الزيادة أو النقصان في ساعات الدراسة ليس مرتبطة بالعمر.
4. وجود علاقة خطية عكسية قوية بين عدد حجرات المنزل وعدد أفراد أسرة الطالب، وفي ذلك نوع من التناقض المنطقي.
5. وجود علاقة ضعيفة جداً بين عمر الطالب وكلام من عدد حجرات المنزل وعدد أفراد أسرة الطالب، مما يدل على أن الزيادة في عمر الطالب ليست مرتبطة بهاذين المتغيرين.

• شكل الانتشار لمتغير مفرد (الرسم النقطي) (Dot plot)


يعتبر الرسم النقطي من الرسوم البسيطة التي تُستخدم في وصف توزيع متغير واحد على خط الأعداد، ويمكن اعتباره في التفسير مشابهاً للدرج التكراري أو شكل الساق والورقة الذي تناولناه سابقاً في الفصل الثالث. ولتنفيذ الرسم النقطي، باستخدام ملف البيانات "بيانات الطلبة2"، قم في شريط الأوامر العلوي باختيار ولتتنفيذ الرسم النقطي، وفي نافذة اختيار شكل الانتشار، (شكل (1.5)), قم باختيار رسم النقاط البسيط (Simple Dot) ثم اضغط تعريف فتظهر نافذة جديدة كما في الشكل (8.5)؛



شكل 8.5: نافذة تعريف المتغير في الرسم النقطي لملف بيانات "بيانات الطلبة2".

ساختار المتغير "مقرر 1" ونقوم بنقله لمربع متغير المحور السيني (X-Axis Variable)، كما هو موضح في الشكل، ويمكن للمستخدم الاختيار من بين ثلاثة طرق عرض للرسم النقطي عند الضغط على زر خيارات (Options)، وهي الرسم النقطي غير المتماثل (Asymmetric) وهو الخيار الافتراضي، الرسم النقطي المتماثل (Symmetric)، والرسم النقطي المسطح (Flat). وفي مثالنا سنبني على الخيار الافتراضي وهو الرسم النقطي غير المتماثل ونضغط موافق في النافذة الأصلية.

سيظهر الرسم النقطي المطلوب في نافذة المخرجات، (شكل (9.5)). ومن الرسم يمكننا ملاحظة توزيع أو انتشار درجات الطلبة في المقرر 1، والذي يشبه إلى حد كبير المدرج التكراري، إلا أن المدرج التكراري يمثل التكرار المناظر للفترات (في محورين)، أما الرسم النقطي فالنقاط المتراكمة فيه هي تكرار نفس القيمة على محور واحد.



شكل 9.5: الرسم النقطي للمتغير "مقرر 1" في ملف بيانات "بيانات الطلبة 2".

2.1.5 دراسة الارتباط باستخدام معامل بيرسون

(Analyzing Correlation using Pearson's Coefficient)

إن من أشهر معاملات الارتباط الخطي البسيط التي تستخدم لحساب الارتباط، أي دراسة العلاقة المتبادل، بين متغيرين هو **معامل بيرسون لارتباط الخطي البسيط** (Pearson Correlation Coefficient)، والذي يعرف للمتغيرين $(Y = (y_1, y_2, \dots, y_n))$ و $(X = (x_1, x_2, \dots, x_n))$ بالصيغة التالية:

$$r_{XY} = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}S_{YY}}} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) Var(Y)}}$$

وحيث أن $Cov(X, Y) = \frac{S_{XY}}{n}$ و $Var(Y) = \frac{S_{YY}}{n}$ و $Var(X) = \frac{S_{XX}}{n}$. وهذا يعني أن معامل الارتباط الخطي البسيط ما هو إلا التغاير (Covariance) بين المتغيرين X و Y مقسوما على حاصل ضرب كلا من الانحراف المعياري للمتغيرين.

و يتم اختبار معامل الارتباط، (بين المتغيرين X و Y)، عن طريق اختبار الفرضية الصفرية؛

$$H_0: \rho_{XY} = 0$$

والتي تعني أن معامل الارتباط للمجتمع ليس له قيمة معنوية، وإحصاء الاختبار هي الإحصاء t بـ $(n - 2)$ درجات حرية، وتعرف بالصورة:

$$t_c = \frac{r_{XY}}{SE(r_{XY})}$$


حيث

$$SE(r_{XY}) = \sqrt{\frac{1 - r_{XY}^2}{n - 2}}$$

هو الخطأ المعياري لمعامل الارتباط (للعينة). ورفض الفرضية الصفرية عند قيمة احتمالية < 0.05 يدل على أهمية (معنوية) معامل الارتباط أي أهمية العلاقة الخطية بين المتغيرين.

ويمكنا في برنامج SPSS حساب معامل الارتباط البسيط لمتغيرين فقط أو لعدة أزواج من المتغيرات، وهو ما يُعرف بتكون مصفوفة الارتباطات البسيطة (Correlation Matrix)، والتي يرمز لها في معظم الكتب بالرمز R ، ففي ملف البيانات "بيانات الطلبة2" يمكننا حساب معاملات الارتباط الخطى البسيط بالطريقة التالية:

في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Correlate>Bivariate كما هو في الشكل (10.5) (Bivariate Correlations)



شكل 10.5: نافذة حساب الارتباطات البسيطة، (ملف بيانات "بيانات الطلبة2").

سنقوم على سبيل المثال بحساب معاملات الارتباط الخطي البسيط بين المتغيرات "مقرر 1"، "العمر"، "الأسرة"، "المنزل"، و"ساعات_الدراسة". وهكذا نقوم بنقل هذه المتغيرات إلى مربع المتغيرات (Variables) على اليمين. ونلاحظ في منتصف النافذة وجود ثلاثة خيارات أو ثلاثة أنواع من معاملات الارتباط البسيط وهي معامل بيرسون، معامل كندل تاو-B، ومعامل ارتباط الرتب لسبيerman (Spearman)، والمعاملين الآخرين يُستخدمان عادة لحساب الارتباط البسيط بين المتغيرات الوصفية، (كمارأينا سابقاً مع معامل كندل في جداول الاقتران في الفصل السابق).

وحيث أن كل المتغيرات المختارة هنا هي متغيرات كمية فسنختار حساب معامل بيرسون فقط، وهو الخيار الافتراضي للبرنامج. وسننقي أيضاً على خيار الاختبار من طرفين (Two-tailed) الافتراضي، وننقي أيضاً على خيار تمييز الارتباطات المعنوية (Flag significant correlations)، ثم نضغط موافق فنحصل على مصفوفة الارتباطات البسيطة بين المتغيرات المختارة كما يظهر في جدول (2.5).

جدول 2.5: مصفوفة الارتباطات بين المتغيرات "مقرر 1"، "العمر"، "الأسرة"، "المنزل"، و"ساعات_الدراسة" ، ("بيانات الطلبة2").

Correlations						
	درجة الطالب في المقرر 1	عمر الطالب بالسنوات	عدد أفراد أسرة الطالب	عدد الحجرات في منزل الطالب	معدل ساعات الدراسة اليومية	
درجة الطالب في المقرر 1	Pearson Correlation	1	-.416 [*]	-.904 ^{**}	.865 ^{**}	.897 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.013	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35
عمر الطالب بالسنوات	Pearson Correlation	-.416 [*]	1	.292	-.273	-.456 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.013		.089	.112	.006
	N	35	35	35	35	35
عدد أفراد أسرة الطالب	Pearson Correlation	-.904 ^{**}	.292	1	-.926 ^{**}	-.764 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.089		.000	.000
	N	35	35	35	35	35
عدد الحجرات في منزل الطالب	Pearson Correlation	.865 ^{**}	-.273	-.926 ^{**}	1	.756 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.112	.000		.000
	N	35	35	35	35	35
معدل ساعات الدراسة اليومية	Pearson Correlation	.897 ^{**}	-.456 ^{**}	-.764 ^{**}	.756 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

وفي هذه المصفوفة المربيعة المتماثلة، يكون لدينا ثلاثة قيم في كل "خلية" في الجدول وهي قيمة معامل بيرسون والقيمة الاحتمالية (Sig.) وحجم العينة (N). ونستطيع ملاحظة العلاقات التالية:

1. وجود علاقة خطية عكسية قوية بين درجة الطالب في المقرر 1 وكل من عمر الطالب ($P\text{-value} = 0.013$) وعدد أفراد الأسرة ($P\text{-value} = 0$)، أي أن درجة الطالب في المقرر 1 تتحفظ بقدم عمر الطالب وزيادة عدد أفراد أسرته، والعلاقة الأولى قد تكون مترافقاً مع الواقع العملي، إذ أن زيادة عمر الطالب من المفترض أن تصاحبها زيادة في المستوى الدراسي بسبب زيادة الخبرة الأكademie عند واقترابه من مرحلة التخرج.
2. وجود علاقة خطية طردية قوية بين درجة الطالب في المقرر 1 وكل من عدد حجرات منزل الطالب ومعدل ساعات الدراسة اليومية، بمعنى أن درجة الطالب في المقرر 1 تزيد بزيادة كل من عدد الحجرات في المنزل ومعدل ساعات الدراسة اليومية، وهذه العلاقات منطقية جداً.
3. توجد علاقة طردية ضعيفة (غير معنوية) بين عمر الطالب وعدد أفراد الأسرة، وعلاقة عكسية ضعيفة بين العمر وعدد حجرات المنزل، وهذا يُعد منطقياً بالنسبة لمتغير العمر. إلا أن علاقة العمر بمعدل ساعات الدراسة اليومية يُعد معنوياً لوجود علاقة عكسية قوية تعكس انخفاض ساعات الدراسة للطالب بزيادة عمره.
4. يرتبط زيادة عدد أفراد أسرة الطالب بانخفاض عدد حجرات المنزل، (علاقة عكسية قوية)، وهذه العلاقة ربما تكون نتيجة عدم تمكن الكثير من الأسر من الانتقال لمنزل أكبر عند زيادة عدد أفرادها. ويرتبط عدد أفراد أسرة الطالب أيضاً بانخفاض معدل ساعات الدراسة للطالب، وهذا يعبر منطقياً لأن العدد الكبير لأفراد الأسرة عادة ما يسبب اكتظاظ المنزل وعدم حصول الطالب على المساحة الكافية للمذاكرة.
5. وجود علاقة طردية قوية بين عدد حجرات منزل الطالب ومعدل ساعات الدراسة اليومية، وهذا طبيعي حيث أن توفر المساحة المناسبة للمذاكرة يشجع الطالب عادة على زيادة ساعات الدراسة اليومية.

3.1.5 معامل الارتباط الجزئي (Partial Correlation Coefficient)

في بعض الدراسات التي تتطلب فهم العلاقة المترادفة ضمن عدة متغيرات، قد تكون مهتمين بتحليل العلاقة بين ثلاثة أو أربعة متغيرات بحيث يتم حساب الارتباط بين متغيرين منهم مع "ثبتيت" أو "وجود" أثر متغير ثالث أو متغيرين، وهو ما يعرف بحساب معامل الارتباط الجزئي.

لنفرض أنه تم حساب معاملات الارتباط الخطى البسيط لأربعة متغيرات هي X_1, X_2, X_3 ، و X_4 ، وتم عرضها في مصفوفة الارتباط المتماثلة التالية:

$$R = \begin{bmatrix} & X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ X_1 & 1 & r_{12} & r_{13} & r_{14} \\ X_2 & & 1 & r_{23} & r_{24} \\ X_3 & & & 1 & r_{34} \\ X_4 & & & & 1 \end{bmatrix}$$

عندئذ يمكننا تعريف بعض معاملات الارتباط الجزئي مثل معامل الارتباط الجزئي للمتغيرين X_1 و X_2 مع وجود المتغير X_3 بالصيغة التالية:

$$r_{12.3} = \frac{r_{12} - r_{13}r_{23}}{\sqrt{(1 - r_{13}^2)(1 - r_{23}^2)}}$$

$$r_{13.2} = \frac{r_{13} - r_{12}r_{23}}{\sqrt{(1 - r_{12}^2)(1 - r_{23}^2)}} \quad . \quad \text{وبالمثل، يمكن حساب } r_{13.2} \text{ وبالصورة}$$


$$\cdot r_{23.1} = \frac{r_{23} - r_{12}r_{13}}{\sqrt{(1 - r_{12}^2)(1 - r_{13}^2)}}$$

أما صيغة معامل الارتباط الجزئي للمتغيرين X_1 و X_2 بثبيت المتغيرين X_3 و X_4 فهي تعطى بالصيغة:

$$r_{12.34} = \frac{r_{12.4} - r_{13.4}r_{23.4}}{\sqrt{(1 - r_{13.4}^2)(1 - r_{23.4}^2)}} = \frac{r_{12.3} - r_{14.3}r_{24.3}}{\sqrt{(1 - r_{14.3}^2)(1 - r_{24.3}^2)}}$$

وبالمثل يمكن حساب باقي معاملات الارتباط الجزئي الأخرى.


ونقوم الآن بحساب معامل الارتباط الجزئي لبعض المتغيرات في ملف البيانات "بيانات الطلبة2" في SPSS. سنقوم في شريط الأدوات العلوي باختيار Analyze>Correlate>Partial فتظهر النافذة التالية، (شكل ((11.5))؛



شكل 11.5: نافذة حساب الارتباط الجزئي لملف بيانات "بيانات الطلبة2".

سنقوم على سبيل المثال بحساب معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين "المقرر 1" و "ساعات_الدراسة" بوجود المتغير "العمر". فنقوم في تلك النافذة بنقل المتغيرين الأولين إلى مربع المتغيرات (Variables) ونقل المتغير الثالث إلى مربع متغير التحكم (Controlling for) كما يوضح الشكل (11.5).

ولمقارنة معامل الارتباط الجزئي بمعامل الارتباط البسيط لنفس المتغيرين، (حيث أن ذلك سيعطي معلومات حول مدى تأثير المتغير الثالث على العلاقة بين المتغيرين الأساسيين)، نضغط على زر الخيارات (Options) في نافذة الارتباط الجزئي فتظهر نافذة فرعية كما هو في الشكل (12.5).



شكل 12.5: نافذة الخيارات للارتباط الجزئي.

في هذه النافذة الفرعية، قم باختيار عرض الارتباطات البسيطة (Zero-order correlations) كما هو موضح ثم اضغط استمرار للعودة لنافذة الارتباط الجزئي. وفي تلك النافذة اضغط موافق للحصول على معامل الارتباط الجزئي المطلوب مصحوباً بمعاملات الارتباط البسيط بين كل متغيرين.

في نافذة المخرجات، سنحصل على معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين "المقرر 1" و"ساعات_الدراسة" بوجود المتغير "العمر"، (جدول (3.5))، والذي يُظهر وجود علاقة طردية قوية جداً ($r = 0.874$) (العمر). (ساعات_الدراسة)(المقرر 1) بين درجات الطلبة في مقرر 1 ومعدل ساعات دراستهم اليومية بوجود تأثير متغير العمر.

جدول 3.5: معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين "المقرر 1" و"ساعات_الدراسة" بوجود متغير "العمر" مع معاملات الارتباط البسيط للمتغيرات الثلاثة، (ملف بيانات "بيانات الطالب 2").

Correlations					
Control Variables		درجة الطالب في المقرر 1	معدل ساعات الدراسة اليومية	عمر الطالب بالسنوات	
-none-a	درجة الطالب في المقرر 1	Correlation Significance (2-tailed) df	1.000 .000 0	.897 .000 33	-.416 .013 33
	معدل ساعات الدراسة اليومية	Correlation Significance (2-tailed) df	.897 .000 33	1.000 0 0	-.456 .006 33
	عمر الطالب بالسنوات	Correlation Significance (2-tailed) df	-.416 .013 33	-.456 .006 33	1.000 0 0
عمر الطالب بالسنوات	درجة الطالب في المقرر 1	Correlation Significance (2-tailed) df	1.000 .000 0	.874 .000 32	
	معدل ساعات الدراسة اليومية	Correlation Significance (2-tailed) df	.874 .000 32	1.000 0 0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

ولكن إذا ما تم مقارنة قيمة معامل الارتباط الجزئي بقيمة معامل الارتباط البسيط بين درجات الطلبة في المقرر 1 ومعدل ساعات دراستهم اليومية، ($r = 0.897$)، حيث أن قيم المعاملين متقاربة جداً، فإننا

نستج أن المتغير "العمر" ليس له أهمية معنوية في علاقة المتغيرين "المقرر 1" و"ساعات_الدراسة" ببعضهما البعض.

من جديد لنقم بحساب معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين "المقرر 2" و"ساعات_الدراسة" بوجود المتغير "الأسرة"، وبتطبيق نفس الخطوات السابقة، نحصل على النتيجة في نافذة المخرجات، (جدول (4.5)).

جدول 4.5: معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين "المقرر 2" و"ساعات_الدراسة" بوجود متغير "الأسرة" مع معاملات الارتباط البسيط للمتغيرات الثلاثة، (ملف بيانات "بيانات الطلبة2")

Correlations					
Control Variables			معدل ساعات الدراسة اليومية	درجة الطالب في المقرر 2	عدد أفراد أسرة الطالب
-none ^a	معدل ساعات الدراسة اليومية	Correlation	1.000	.847	-.764
		Significance (2-tailed)		.000	.000
		df	0	33	33
درجة الطالب في المقرر 2	Correlation		.847	1.000	-.907
	Significance (2-tailed)		.000		.000
	df		33	0	33
عدد أفراد أسرة الطالب	Correlation		-.764	-.907	1.000
	Significance (2-tailed)		.000	.000	
	df		33	33	0
عدد أفراد أسرة الطالب	معدل ساعات الدراسة اليومية	Correlation	1.000	.566	
		Significance (2-tailed)		.000	
		df	0	32	
درجة الطالب في المقرر 2	Correlation		.566	1.000	
	Significance (2-tailed)		.000		
	df		32	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

وبمقارنة قيمة معامل الارتباط الجزئي بقيمة معامل الارتباط البسيط بين درجات الطلبة في المقرر 2 ومعدل ساعات دراستهم اليومية نرى بأن $r < r^2$ ، وهذا يدل على أن وجود متغير عدد أفراد الأسرة قد أدى إلى انخفاض حد في العلاقة الطردية بين المتغيرين الأساسيين ("المقرر 2" و"ساعات_الدراسة")، أي أن زيادة عدد أفراد يؤثر سلبا في العلاقة بين درجات الطلبة في المقرر 2 ومعدل ساعات الدراسة. وبنفس الطريقة يمكن دراسة العلاقة بين أي متغيرين بوجود متغير أو أكثر¹.

2.5 الارتباط بين المتغيرات الوصفية والكمية

(Correlation between Categorical and Quantitative Variables)

في الفصل السابق، تطرقنا لدراسة العلاقة بين متغيرين وصفيين يمثلان مستويات محددة في جدول الاقتران واختبار هذه العلاقة، وفي هذا البد سنتناول كيفية حساب معامل الارتباط بين متغيران وصفيان بصورة عامة، وكيفية تحليل العلاقات بين المتغيرات الكمية والوصفية.

¹ يمكن إضافة أكثر من متغير ثانوي في مربع متغير التحكم (Controlling for) كما هو موضح في الشكل (11.5).

باستخدام ملف البيانات "فيتامين دال"، سنقوم بحساب معاملات الارتباط بين متغيرات هذه البيانات بالصورة التالية؛ في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Correlate>Bivariate فتظهر نافذة الارتباط الثنائي (Bivariate Correlations) كما رأينا في الشكل (10.5). قم باختيار المتغيرات " النوع "، "الفئة_العمرية" ، و "مستويات_فيتامين_dal" ونقلها إلى مربع المتغيرات (Variables).

وفي منتصف النافذة، قم باختيار الأساليب الثلاثة لمعاملات الارتباط وهي معامل بيرسون، معامل كندل تاو-B، ومعامل ارتباط الرتب لسييرمان، وقد قمنا هنا باختيار معامل بيرسون¹، رغم أنه مخصص لحساب الارتباط بين المتغيرات الكمية، بهدف مقارنة نتائجه بنتائج معاملات الارتباط للمتغيرات الوصفية؛ معامل كندل تاو-B، ومعامل سبيرمان. بعد ذلك اضغط موافق فتظهر النتائج في نافذة المخرجات. النتيجة الأولى، الموضحة في جدول (5.5)، هي مصفوفة الارتباطات للمتغيرات الثلاثة التي تم تحديدها، وهي تُظهر علاقات ارتباط عكسية قوية ذات معنوية بين مستويات فيتامين دال وكل من النوع وفئات العمر، وأيضاً علاقة عكسية ضعيفة بين فئات العمر والنوع.

جدول 5.5: مصفوفة معاملات الارتباط لبيرسون بين المتغيرات " النوع "، "الفئة_العمرية" ، و "مستويات_فيتامين_dal".

Correlations				
		نوع	فئات العمر	مستويات فيتامين دال
نوع	Pearson Correlation	1	-.201 .123	-.499** .000
	Sig. (2-tailed)			
	N	60	60	60
فئات العمر	Pearson Correlation	-.201 .123	1	-.367** .004
	Sig. (2-tailed)			
	N	60	60	60
مستويات فيتامين dal	Pearson Correlation	-.499- **	-.367-** .004	1
	Sig. (2-tailed)			
	N	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

وأما النتيجة الثانية، (جدول (6.5))، فهي مصفوفة الارتباطات للمتغيرات الثلاثة، باستخدام معامل كندل أولاً ومعامل سبيرمان ثانياً، وكلا المعاملين يُظهر علاقات ارتباط قريبة جداً من تلك المحسوبة بمعامل بيرسون في الجدول (5.5). والاستنتاج سيكون كالتالي:

1. العلاقة العكسية القوية بين مستويات فيتامين دال وفئات العمر، تعني أنه كلما زادت الفئة العمرية للشخص كلما نقصت لديه معدلات فيتامين دال، وهذه النتيجة مطابقة لما سبق.

2. أما العلاقة العكسية القوية بين مستويات فيتامين دال والنوع فلا يتم التعليق عليها كالنتيجة السابقة حيث أن النوع هو متغير وصفي أسمى وليس رتبوي، ونلفت انتباه القارئ هنا إلى أنه لن يكون هنالك معنى أن نقول "كلما نقص النوع كلما زادت معدلات فيتامين دال". ويمكن في هذه الحالة دراسة الارتباط بين متغير "النوع" ومتغير كمي آخر باستخدام شكل الانتشار كما سنوضح تالياً، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة بين فئات العمر والنوع.


¹ لابد من التأكيد هنا على أن معامل بيرسون يستخدم، من الناحية النظرية، لحساب الارتباط بين المتغيرات الكمية التي تتبع التوزيع الطبيعي.

جدول 6.5: مصفوفة معاملات الارتباط ل Kendall وSpearman بين متغيرات "النوع"، "الفئة_العمرية"، و"مستويات_فيتامين_دال".

			Correlations		
			النوع	فئات العمر	مستويات فيتامين دال
Kendall's tau_b	النوع	Correlation Coefficient	1.000	-.190	-.466-**
		Sig. (2-tailed)		.122	.000
		N	60	60	60
	فئات العمر	Correlation Coefficient	-.190	1.000	-.347-**
		Sig. (2-tailed)	.122		.003
		N	60	60	60
	مستويات فيتامين دال	Correlation Coefficient	-.466-**	-.347-**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.003	
		N	60	60	60
Spearman's rho	النوع	Correlation Coefficient	1.000	-.201	-.490-**
		Sig. (2-tailed)		.123	.000
		N	60	60	60
	فئات العمر	Correlation Coefficient	-.201	1.000	-.372-**
		Sig. (2-tailed)	.123		.003
		N	60	60	60
	مستويات فيتامين دال	Correlation Coefficient	-.490-**	-.372-**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.003	
		N	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

لوضيح الملاحظة السابقة لنقم بالخطوات التالية؛ في شريط الأوامر العلوي اختر Graphs>Legacy



شكل 13.5: شكل الانتشار للمتغيرين "فيتامين_دال" و"النوع".

في نافذة المخرجات سيظهر شكل الانتشار التالي، (شكل 13.5)، ومنه يمكننا ملاحظة أن معدلات فيتامين دال دال عند النساء (حيث أن الرقم 2 في المحور الأفقي يشير للإناث) هي في العموم أقل من الرجال (رقم 1 في المحور الأفقي) في مختلف الأعمار.

¹ ننوه هنا إلى أننا قمنا ببعض التعديلات على الرسم فيما يخص القيم في المحور الأفقي وألوان النقاط في الرسم.

3.5 تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression Analysis)

في البندين السابقين، تناولنا مفهوم الارتباط بين المتغيرات الكمية/الكمية، والوصفي/الوصفي، والكمية/الوصفي، ووضحنا كيفية حساب هذه المعاملات جرياً من خلال قوانين الارتباط، وبصرياً من خلال انتشار نقاط البيانات، وناقشنا كيفية استنتاج مدى قوة ونوع العلاقة بين المتغيرات.

إلا أن دراسة الارتباط بمفرده قد لا يكون كافياً في كثير من الحالات لأنه لا يتعرض للعلاقة السببية (Causal Relationship) بين المتغيرات؛ ويقصد بالعلاقة السببية هنا كيفية وقوة تأثير متغير ما (أو أكثر) على متغير آخر (أو أكثر)، فمثلاً، يمكن استخدام معامل الارتباط لدراسة قوة ونوع العلاقة بين سعر سلعة ما (X) وعدد الوحدات المباعة منها (Y)، والتي تتوقع منطقياً أن تكون علاقة عكسية قوية، إلا أنها لا نستطيع معرفة مدى تأثير سعر السلعة على عدد الوحدات المباعة باستخدام معامل الارتباط فقط، لذلك نحن بحاجة لمقياس أو أسلوب إضافي لدراسة ذلك التأثير، وهنا يأتي دور تحليل الانحدار لتقدير بهذه المهمة، وبالتالي يمكننا القول أنه لدراسة العلاقات بين المتغيرات بصورة أكثر تعمقاً لا بد لنا من استخدام كلاً من الأسلوبين؛ تحليل الانحدار والارتباط.

إضافة إلى ذلك، يتم استخدام أسلوب تحليل الانحدار لغرض التنبؤ (Prediction)، والذي يعد من أهم أهداف الأسلوب، فمثلاً، إذا وجد أن هنالك تأثير معنوي لسعر السلعة على عدد الوحدات المباعة، بمعنى أن عدد الوحدات المباعة يعتمد على سعر السلعة، فيمكن عندها التنبؤ بعدد الوحدات المباعة (كتقدير مستقبلي أو كدراسة جدوى عند ارتفاع أو انخفاض سعر السلعة، أي عند أي قيمة افتراضية لسعر).

وعملياً يمكن في الدراسات الاستكشافية استخدام تحليل الارتباط أولاً لتبيان قوة العلاقة بين المتغيرات، فإن كان هنالك علاقة معنوية بينها فيمكن عندئذ المضي قدماً باستخدام تحليل الانحدار لدراسة العلاقة السببية. وكما هو الحال مع تحليل الارتباط، فإن أسلوب تحليل الانحدار يتعامل مع المتغيرات التي توجد بينها علاقات خطية وغير خطية، إلا أنها سنركز على الانحدار الخطي فقط كما ذكرنا سابقاً.

1.3.5 تعريف نموذج الانحدار الخطي البسيط (Definition of Simple Linear Regression Model)

إذا كان X و Y متغيران كميان فإن نموذج الانحدار الخطي لهما يعرف بالصورة:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \quad , i = 1, 2, \dots, n$$

حيث:

Y : يُعرف بالمتغير التابع أو متغير الاستجابة (Dependent or Response Variable) ، X : يُعرف بالمتغير التوضيحي أو المستقل أو متغير التنبؤ (Explanatory or Independent Variable or Predictor) ،

β_1 و β_0 تعرف بمعامل النموذج، (ويسمى β_1 بمعامل الانحدار)، n يعرف بـ **الخطأ العشوائي للنموذج**، n هو عدد المشاهدات أو حجم عينة الدراسة.

وـ **الخطأ العشوائي** تم إضافته لنموذج الانحدار لعدة أسباب أهمها أن أي عملية تقدير إحصائي لابد لها من هامش خطأ للتقدير لأن القيمة المقدرة للمعلمة، (بصورة عامة)، لن تساوي القيمة الحقيقة للمعلمة كما تتضمن قواعد التقدير. إلا أننا نطمح دائمًا لتقديرات تكون قريبة أكثر مما يمكن للقيمة الفعلية.

ويتم تقدير معالم النموذج بالصيغ:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{Cov(X, Y)}{Var(X)}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

حيث $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ و $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. ومن الصيغة السابقة، يمكننا ملاحظة أن العلاقة بين معامل الارتباط الخطي ومعامل الانحدار الخطي تكون بالصورة؛

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sqrt{S_{YY}}}{\sqrt{S_{XX}}} r_{XY} = \frac{\sqrt{Var(Y)}}{\sqrt{Var(X)}} r_{XY}$$

2.3.5 فرضيات طريقة المربيعات الصغرى الاعتيادية (Assumptions of OLS Method)

إن استخدام طريقة المربيعات الصغرى الاعتيادية (Ordinary Least Squares, OLS) في التقدير يكون من الناحية النظرية مقيداً بتحقق مجموعة من الشروط أو الفرضيات، هذه الفرضيات تسمى أيضًا فرضيات نموذج الانحدار الخطي. ومن الناحية العملية، فإنه عندما يقوم الباحث بتقدير معالم نموذج الانحدار فإنه لا يقوم عادة بالتحقق من صحة هذه الفرضيات للنموذج الموفق، وهذا يُعد "نقصاً" في نتائج تحليل الانحدار لأن ثبات أو تحقق هذه الفرضيات يدل على ثبات أو جودة النتائج التي سيتم الوصول إليها عن طريق النموذج المقدر.

وفيمما يلي سنقوم بتلخيص أهم هذه الفرضيات، مع التذكير بأن هذه الفرضيات تسرى على كل من النماذج الخطية البسيطة، (التي تضم متغير توضيحي واحد)، والمترددة، (التي تضم أكثر من متغير توضيحي)؛

لتفريق نموذج الانحدار الخطي: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$ باستخدام طريقة المربيعات الصغرى الاعتيادية لابد من توفر الفرضيات التالية:

1. **خطية النموذج**، والتي تعني أن المتغير التابع هو تركيبة خطية من المتغير التوضيحي (أو المتغيرات التوضيحية) ومعالم النموذج.
2. **المتغير التوضيحي** (أو المتغيرات التوضيحية) تأخذ قيمًا غير عشوائية (Non-Random)، بمعنى أنها قيمًا لا تتبع توزيعاً احتمالياً.

3. المتغيرات التوضيحية (في نماذج الانحدار المتعدد) لابد أن تكون جميعها مستقلة خطياً عن بعضها البعض، ويقصد بذلك ألا يوجد بين أي متغيرين علاقة خطية (أي أن يكون معامل الارتباط الخطي بينهما مساو للصفر).

.4

- أ- أن تكون قيم حد الخطأ العشوائي مستقلة عن بعضها البعض، (معنى أن الارتباط أو التغير

$$\text{بينها مساو للصفر؛ } \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, \forall i \neq j = 1, 2, \dots, n.$$

ب- حد الخطأ يتبع توزيعاً طبيعياً بمتوسط يساوي 0 وتبالن يساوي σ^2_{ε} ، أي أن $E(\varepsilon_i) = 0$

$$\text{و } .i = 1, 2, \dots, n, \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2_{\varepsilon}$$

ج- تجانس تباين قيم حد الخطأ، بمعنى أن يكون للأخطاء نفس قيمة التباين مهما تغيرت قيم

$$\text{المتغير التابع، } .(Var(\varepsilon_i) = \sigma^2_{\varepsilon}, \forall i = 1, 2, \dots, n)$$

ويمكن تلخيص الفرضيات (أ، ب، و ج) بالصورة؛

$$\varepsilon_i \sim NID(0, \sigma^2_{\varepsilon}), \forall i = 1, 2, \dots, n$$

3.3.5 التمثيل البياني لنموذج الانحدار الخطي البسيط

(Graphical Representation for the Linear Regression Model)

بعد تقدير معالم نموذج الانحدار الخطي β_0 و β_1 ، وهو ما يعرف بـ**توقف النموذج** (Model Fitting)،


يمكن تمثيل هذا النموذج أو رسم خط الانحدار بيانياً مباشرةً على شكل الانتشار للمتغيرين وذلك من خلال تحديد قيم الجزء المقطوع من المحور الصادي $\hat{\beta}_0$ و الميل $\hat{\beta}_1$ على الرسم أو من خلال التعويض عن أي قيمتين للمتغير X في نموذج الانحدار وتمrir خط مستقيم عبرهما.

والشكل التالي (شكل (14.5))، يوضح شكل الانتشار لبيانات افتراضية وخط الانحدار الذي يمر عبرها وأيضاً

يُظهر تقديرات قيم حد الخطأ $\hat{\varepsilon}$ التي تسمى بالبواقي (Residuals)، وتمثل الفرق بين قيم المتغير التابع الفعلية وقيمته المقدرة، أي أنها تحسب بالصيغة؛

$$\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{y}_i, i = 1, 2, \dots, n$$

ما يعني أنه كلما قلت قيمة البواقي كلما دل ذلك على "جودة" توقف النموذج وملائمةه لبيانات العينة، ومن خواص هذه البواقي أن بعض قيمها ستكون سالبة والأخرى موجبة، وأن مجموع تلك القيم لابد أن يساوي الصفر، أي أن $\sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i = 0$. ولاحظ أيضاً من الشكل أن قيم متوسطات المتغيرين X و Y لابد أن تشكل إحدى نقاط خط الانحدار دائماً، والتي كلما اقتربت من منتصف كتلة البيانات كلما دل ذلك على قلة القيم المتطرفة.



شكل 14.5: شكل الانشار وتوفيق خط الانحدار لبيانات افتراضية.

ولنقم الآن بتوفيق نموذج انحدار خطي بسيط باستخدام بيانات المثال "بيانات الطلبة2". سنقوم في شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Regression>Linear فتظهر نافذة تحليل الانحدار الخطي كما يظهر في الشكل (15.5). وعند اختيار المتغير التابع والمتغير أو المتغيرات التوضيحية، يجب أن يراعي الباحث العلاقة المنطقية السببية بين المتغيرات، أي أنه يجب أن يختار المتغير التابع الذي "يعتقد" أنه يعتمد أو يتأثر بتغيير المتغير التوضيحي.




شكل 15.5: نافذة تحليل الانحدار الخطي لملف البيانات "بيانات الطلبة2".

فعلى سبيل المثال، واعتمادا على منطق السببية، يمكننا اختيار درجات الطلبة في المقرر 1 كمتغير استجابة يتأثر بتغيير معدل ساعات الدراسة اليومية للطلبة، لذلك سنقوم باختيار المتغير "المقرر 1" ونقله إلى مربع المتغير التابع

(Dependent)، و اختيار المتغير "ساعات_الدراسة" و نقله لمربع المتغيرات التوضيحية أو المستقلة (Independent)، كما يوضح الشكل (15.5).

في الخطوة التالية، سنقوم بتوثيق نموذج انحدار المتغير التابع "المقرر 1" على المتغير التوضيحي "ساعات_الدراسة"



شكل 16.5: نافذة خيارات عرض الإحصاءات في تحليل الانحدار.

مستخدمين الحد الأدنى للنتائج، بمعنى أننا سنقوم باختيار عرض أقل عدد من النتائج بهدف التدرج مع القارئ في شرح كيفية تفسير النتائج خطوة بخطوة.

في نافذة الانحدار الخطي، (الشكل (15.5))، اضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) فتظهر النافذة الفرعية التالية، (شكل (16.5))، في تلك النافذة قم باختيار عرض التقديرات (Estimates) فقط ثم اضغط استمرار للعودة للنافذة الأصلية. اضغط بعد ذلك موافق فتظهر النتائج في نافذة المخرجات.

الجدول الأول في النتائج يوضح الطريقة المتبعة في إدخال المتغيرات في النموذج، حيث أنه توجد عدة طرق "بناء" نماذج الانحدار سنتطرق لها لاحقا في هذا الفصل، أما الجدول التالي، (جدول (7.5))، فيتم فيه عرض نتائج توثيق نموذج الانحدار الخطي المطلوب، ومن هذا الجدول نستطيع كتابة نموذج الانحدار الموفق كالتالي:

$$\hat{y}_i = 43.513 + 9.929 x_i, \quad i = 1, 2, \dots, 35$$

ويمكن "مبنيا" تفسير قيمة معامل الانحدار $\hat{\beta}_1 = 9.929$ بأنه يمثل تأثير معدل ساعات المذاكرة X (المتغير التوضيحي) على درجة الطالب في المقرر 1، Y (المتغير التابع)، بحيث أن كل زيادة بمقدار الوحدة في ساعات المذاكرة، (زيادة ساعة واحدة)، ستؤدي إلى زيادة (نظرا للإشارة الموجبة للمعامل) في درجة الطالب بمقدار 10 درجات تقريبا ($9.929 \cong 10$)، (وذلك بإهمال قيمة الجزء المقطوع $\hat{\beta}_0$). بمعنى أن نمط الزيادة في درجة الطالب في المقرر 1 يتغير بمعامل مقداره 9.929 درجة بحسب نموذج الانحدار الموفق. وبالنسبة للقيم الأخرى في جدول النتائج فإننا سنقدم لها شرحا مفصلا لاحقا.


جدول 7.5: نتائج تقدير معالم نموذج الانحدار الخطي للمتغير "المقرر 1" على المتغير "ساعات_الدراسة".

Model	Coefficients ^a				
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	43.513	2.660		16.359	.000
معدل ساعات الدراسة اليومية	9.929	.851	.897	11.669	.000

a. Dependent Variable: درجة الطالب في المقرر 1

لنقم الآن برسم شكل الانتشار للمتغيرين "المقرر 1" و "ساعات_الدراسة" ورسم خط الانحدار الموفق على نفس الرسم¹. لعمل ذلك، قم في شريط الأوامر العلوي باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/Dot ثم اختر الانشار البسيط (Simple Scatter) من نافذة الرسم، (شكل (1.5))، ثم اضغط تعریف. وفي نافذة تعریف المتغيرات، (شكل (2.5))، اختر المتغير "المقرر 1" وقم بنقله لمربع المحور الصادي (Y-Axis) واختر متغير "ساعات_الدراسة" وانقله لمربع المحور السيني (X-Axis) ثم اضغط موافق.


بعد ظهور الرسم في نافذة المخرجات، قم بالنقر المزدوج عليه لتظهر نافذة تحرير الرسم (Chart Editor) كما يظهر في الشكل (17.5)، وفي شريط الأوامر العلوي لتلك النافذة اختر Elements>Fit Line at Total وستلاحظ بعدها ظهور خط الانحدار الموفق في نافذة تحرير الرسم إضافة لظهور نافذة فرعية جديدة بعنوان خصائص (Properties)، والتي تتضمن إمكانية إجراء بعض التعديلات الإضافية، قم بالضغط على إغلاق (Close) في تلك النافذة للعودة لنافذة تحرير الرسم، والتي ستقوم بإغلاقها باستخدام رمز إغلاق النوافذ ذو اللون الأحمر وعلامة ×.



شكل 17.5: نافذة محرر الرسم لشكل الانتشار.

¹ في SPSS خيار الرسم في نافذة تحليل الانحدار يتضمن رسم شكل الانتشار وتوفيق خط الانحدار لقيم المتغير التوضيحي المعيارية (Standardized) وليس القيم الفعلية له، لذلك نجأً لتمثيل خط الانحدار بهذه الطريقة.

الآن وفي نافذة المخرجات ستلاحظ ظهور خط الانحدار الموفق ومعادلة الانحدار الخطي الموقعة على شكل الانتشار، (شكل 18.5)). ويُلاحظ من الشكل اقتراب الكثير من نقاط البيانات من خط الانحدار مما يدل على انخفاض قيم الباقي وبالتالي وبصورة مبدئية يمكن الحكم على أهمية تأثير المتغير التوضيحي على المتغير التابع في نموذج الانحدار.



شكل 18.5: خط الانحدار الموفق للمتغير "المقرر 1" على "ساعات_الدراسة" مع شكل الانتشار لهما.

4.5 تقييم نموذج الانحدار الخطي (Assessment of Linear Regression Model)

بعد تقدير معامل نموذج الانحدار الخطي، تكون بحاجة لتقييم هذا النموذج الموفق بمعنى التأكيد من مدى ملائمة وجودته للاستخدام في تفسير العلاقة السببية بين المتغيرات وللتبيؤ ببيانات جديدة. وهذا في العموم هو شأن أي أسلوب إحصائي يعتمد على التقدير. ومن الناحية التطبيقية، فإن هذا التقييم هو في الواقع تقييم لشيئين أساسيين؛

1. طبيعة ومدى تأثير متغير أو أكثر على المتغير التابع.
2. مدى ملائمة مشاهدات المتغيرين (العينة) للتغير الخطي في العلاقة بينهما.

ولاختبار جودة النموذج سنستعرض الطرق التالية؛

1.4.5 معامل الارتباط المتعدد (Multiple R)

رغم أننا لم نتطرق لتحليل الانحدار المتعدد بعد، (وجود أكثر من متغير توضيحي في النموذج)، إلا أنه يمكننا استخدام معامل الارتباط المتعدد، والذي يعتبر معامل الارتباط البسيط حالة خاصة منه عند التعامل مع

متغيرين فقط. والنظرة إلى معامل الارتباط المتعدد بصورة عامة تكون بأنه مقياس للارتباط بين المتغير التابع و"باقي" المتغيرات التوضيحية. وفي حالة نموذج الانحدار البسيط، تكون قيمة معامل الارتباط المتعدد هي نفسها قيمة معامل الارتباط الخطي البسيط (معامل بيرسون) أي أن، $r_{XY} = R$. وبالطبع، فإنه كلما زادت قيمة معامل الارتباط المتعدد دل ذلك على قوة العلاقة بين المتغير التابع والمتغير التوضيحي (أو المتغيرات التوضيحية) والذي بدوره يدل على جودة النموذج الموفق. أما بالنسبة للإشارة الجبرية لمعامل الارتباط المتعدد، فإنه يأخذ نفس إشارة معامل الانحدار في نماذج الانحدار البسيط، وتبقى إشارته موجبة في النماذج المتعددة. واحرص، كما ذكرنا سابقاً، على ضرورة اختبار معامل الارتباط للتأكد من معنويته.

2.4.5 معامل التحديد R^2 (Coefficient of Determination or R-Squared)

معامل التحديد هو مقياس إحصائي يستخدم لقياس جودة توفيق النموذج وهو يمثل نسبة الاختلاف في قيم المتغير التابع التي يفسرها نموذج الانحدار الموفق، أو بمعنى رياضي، هو النسبة بين مجموع المربعات للاختلاف المفسر ($\bar{Y}_i - \hat{y}_i$) ومجموع المربعات للاختلاف الكلي ($\bar{Y} - y_i$)، وبالتالي فإنه يأخذ الصيغة التالية:

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(y_i - \bar{Y})^2}$$

ورياضياً أيضاً فإن معامل التحديد ما هو إلا مربع معامل الارتباط المتعدد، لذلك يمكن كتابة:

$$R^2 = (R)^2 = \left(\frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}S_{YY}}} \right)^2 = \frac{S_{XY}^2}{S_{XX}S_{YY}} = \frac{(Cov(X, Y))^2}{Var(X)Var(Y)}$$

والقيمة التي يأخذها معامل التحديد هي نسبة ما يفسره نموذج الانحدار الموفق من العلاقة السببية بين المتغير التابع والمتغير التوضيحي. وكما هو الحال مع معامل الارتباط المتعدد، فإن ارتفاع قيمة معامل التحديد هو مؤشر على صحة أو جودة النموذج.

- ملاحظات حول معامل التحديد:

1. ستتراوح قيمة R^2 ما بين 0% و100%，(بعد ضرب قيمته العشرية في 100)، حيث تدل القيمة 0 على أن النموذج لم يفسر أي شيء من الاختلاف في قيم المتغير التابع من خلال نموذج الانحدار، والقيمة 100 تعني أن النموذج الموفق هو "كامل" في توصيف العلاقة السببية، وعادة لا يتم الوصول لهاتين القيمتين من خلال البيانات في الحياة العملية.
2. يمكن مراقبة ما "يعكسه" معامل التحديد بيانياً من خلال رسم شكل الانتشار لقيم المتغير التابع الحقيقة Y ضد قيمه المقدرة \hat{Y} .

3. لا يمكن الاعتماد بصورة مطلقة على قيمة معامل التحديد بمفرده للحكم على جودة النموذج لأن القيم المرتفعة لمعامل لا تعني "دائماً" أن النموذج جيد، (كما وأن القيم المنخفضة له قد تظهر أحياناً في نماذج ذات معنوية)، لأن قيمته تتعلق بشكل كبير بحجم وطبيعة البيانات وعدد المتغيرات التوضيحية في النموذج، ولذلك يجب أن يتم مراقبة كل نتائج تحليل الانحدار، (ومن ضمنها نتائج تحليل الباقي الذي سنتناوله لاحقاً)، قبل تقديم الحكم على النموذج الموفق.

4. يمكن إجراء تعديل على صيغة معامل التحديد لنحصل على معامل التحديد المعدل (Adjusted R^2)

(square)، والذي يُعد أفضل لدى بعض الإحصائيين. وتعطى صيغته بالصورة؛

$$R_{adj}^2 = R^2 - \frac{p}{n-p-1}$$

حيث n هو حجم العينة، و p هو عدد المتغيرات التوضيحية في النموذج.

3.4.5 اختبار معنوية نموذج الانحدار (Testing the Significance of the Regression Model)

هذا الاختبار في الواقع هو اختبار تحليل التباين المعروف باستخدام الإحصاء فيشر F ، وتهدف لاختبار معنوية نموذج الانحدار الموفق ككل، لذلك فإن هذا الاختبار يُعد الأهم ضمن الأساليب المختلفة لتقدير النموذج، حيث يتم اختبار الفرضية الصفرية، (نموذج الانحدار غير معنوي) : H_0 .

وإذا تم رفض الفرضية السابقة عند مستوى معنوية $0.05 = \alpha$ ودرجات حرية $(p, (n-p-1))$ فهذا يعني أن نموذج الانحدار الموفق جيد (فهو معنوي) ويعبر عن العلاقة السببية بين المتغيرات. وتعزز قيمة إحصاء الاختبار بالصيغة:

$$F_c = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{Y})^2 / p}{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2 / (n-p-1)}$$

حيث n هي حجم العينة (عدد المشاهدات)، و p هو عدد المتغيرات التوضيحية. أي أن قيمة الإحصاء F الحسابية هي عبارة عن النسبة بين مجموع المربعات للاختلاف المفسر $(\bar{Y} - \hat{y}_i)$ ومجموع المربعات للاختلاف غير المفسر $(y_i - \bar{Y})$ كل مقسوم على درجات الحرية الخاصة به. ويتم عملياً حساب قيمة F من جدول تحليل التباين (ANOVA).

وننوه هنا إلى أن متوسط مجموع مربعات الخطأ هو تقدير تباين حد الخطأ في النموذج؛ $MSE = \hat{\sigma}_{\epsilon}^2$. ولحساب قيم مجاميع المربعات الثلاثة الأساسية في جدول تحليل التباين نستخدم الصيغ التالية، والتي تسمى بمجاميع المربعات المصححة (Corrected) والتي تم "ضمن" صيغتها طرح ما يُعرف بمعامل التصحيح (Correction)

$$CT = \frac{(\Sigma Y)^2}{n}; CT = \text{Term (CT)}$$

$$\left. \begin{array}{l} SSR = \frac{n (\text{Cov}(X, Y))^2}{\text{Var}(X)} \\ TSS = n \text{Var}(Y) \\ SSE = TSS - SSR \end{array} \right\}$$

4.4.5 اختبار معنوية المتغيرات التوضيحية (Testing the Significance of Predictors)

هذا الاختبار يتعلق بمراقبة أهمية تأثير المتغير التوضيحي على المتغير التابع في نموذج الانحدار، (وفي حالة وجود أكثر من متغير توضيحي في النموذج، فإنه يتم تنفيذ هذا الاختبار بعدد هذه المتغيرات)، ويتم اختبار الفرضية الصفرية:

$$H_0: \beta_j = 0$$

حيث $j = 1, 2, \dots, p$ ، ورفض هذه الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ ودرجات حرية $(n - p - 1)$ يدل على أهمية تأثير المتغير التوضيحي ذو الترتيب j في نموذج الانحدار. وتعرف إحصاء الاختبار، وهي الإحصاءة استيودنت t ، بالصيغة التالية:

$$t_c = \frac{|\hat{\beta}_j|}{SE(\hat{\beta}_j)}, \quad j = 1, 2, \dots, p$$

حيث أن؛

$$SE(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\frac{MSE}{(n - 1)\text{Var}(X)}}$$

وكذلك يمكن إيجاد (تقدير) $100\% (1 - \alpha)$ فترة ثقة لمعامل النموذج β_j باستخدام الصيغة؛

$$\beta_j : \hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2} (n - p - 1) SE(\hat{\beta}_j), \quad j = 1, 2, \dots, p$$

ومن فوائد فترة الثقة لمعامل النموذج أنها تزودنا بتقدير للحدود القصوى لقيم التي يمكن أن تأخذها هذه المعامل مما يساعد على تقييم النموذج.

ولنقم الآن بتوفيق نموذج انحدار جديد واستخدام طرق التقييم والاختبار السابقة بصورة عملية في برنامج SPSS، لنفس ملف البيانات "بيانات الطلبة2"، قم في نافذة تحليل الانحدار الخطي، (شكل (15.5))، باختيار المتغير "المقرر 1" كمتغير تابع، والمتغير "الأسرة" كمتغير توضيحي، ثم اضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) وفي النافذة الفرعية الخاصة به، (شكل (16.5))، قم باختيار عرض التقديرات (Estimates) وفترات الثقة

(Descriptives) و توفيق النموذج (Model Fit) والإحصاءات الوصفية (Confidence Intervals)، ثم اضغط استمرار للعودة للنافذة الأصلية. اضغط بعد ذلك موافق فتظهر النتائج في نافذة المخرجات.

الجدول الأول في تلك النتائج يتضمن الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وعدد المشاهدات لمتغيري النموذج، والجدول الثاني هو مصفوفة الارتباط، والتي تتضمن معامل ارتباط واحد فقط لأن النموذج يضم متغيرين اثنين فقط، ومن هذا الجدول يمكننا ملاحظة وجود علاقة عكسية قوية ($r = -0.904$) ذات معنوية عالية ($P-value = 0$). والجدول الثالث يوضح الطريقة المتتبعة في إدخال المتغيرات في النموذج.

ومن الجدول الأخير في نافذة المخرجات، (جدول 8.5)، نستطيع كتابة نموذج الانحدار الموفق كالتالي:

$$\hat{y}_i = 98.994 - 4.613 x_i \quad , i = 1, 2, \dots, 35$$

وهذا يعني أن كل زيادة بمقدار الوحدة في عدد أفراد أسرة الطالب، (زيادة فرد واحد)، ستؤدي إلى انخفاض (نظرا للإشارة السالبة للمعامل) في درجة الطالب بمقدار 5 درجات تقريبا ($4.613 \cong 5$)، وذلك بإهمال قيمة الجزء المقطوع $\hat{\beta}_0$ ، أي أن الزيادة في عدد أفراد الأسرة يكون له تأثير سلبي على مستوى الطالب الدراسي، وهذا قد يكون بسبب أن اكتظاظ المنزل يؤدي عادة لعدم توفر الجو المناسب للمذاكرة، كما وضمنا سابقا في الجزء الخاص بدراسة الارتباط.

جدول 8.5: نتائج تقدير معالم نموذج الانحدار الخطي للمتغير "المقرر 1" على المتغير "الأسرة".

Model	Coefficients ^a					
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B
						Lower Bound
1 (Constant)	98.994	2.549		38.841	.000	93.808
عدد أفراد أسرة الطالب	-4.613	.380	-.904	-12.154	.000	-5.385
درجة الطالب في المقرر 1						

a. Dependent Variable: درجة الطالب في المقرر 1

نأتي الآن لتقييم جودة نموذج الانحدار البسيط الموفق، فمن نفس الجدول، (جدول 8.5)، نستطيع ملاحظة أن قيمة إحصاء الاختبار الخاص بمعلمة الانحدار هو $t_c = 38.841$ ، والقيمة الاحتمالية هي ($P-value = 0$)، وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم أهمية تأثير المتغير التوضيحي على المتغير التابع، ($H_0: \beta = 0$)، بمعنى أن عدد أفراد الأسرة له تأثير سلبي هام على مستوى الطالب الدراسي (في المقرر 1).

ومن القيم التي تساعد الباحث في دراسة وتقييم النموذج أيضا هي قيمة الخطأ المعياري لمعامل الانحدار ($SE(\hat{\beta}_1) = 0.380$)، والتي كلما كانت منخفضة كلما دل ذلك من دقة التقدير.¹ وأما القيمة ($Beta = -0.904$) فهي قيمة معامل الانحدار المعيارية.

ومن العامودين الآخرين في الجدول، نستطيع كتابة: $-3.841 < \beta_1 < 5.385$ – أي أننا يعني أننا واثقون بنسبة 95% بأن تقدير تأثير عدد أفراد الأسرة على مستوى الطالب الدراسي سيتراوح في العموم بين انخفاض من 4 إلى 5 درجات تقريبا في المقرر 1.

ومن الجدول الرابع في نافذة المخرجات، (جدول 9.5))، والذي يمثل قيم معامل الارتباط المتعدد ومعامل التحديد ومعامل التحديد المعدل، يمكننا أولا ملاحظة أن قيمة معامل الارتباط المتعدد، والتي تدل على وجود علاقة قوية جدا بين المتغيرين، هي نفسها قيمة معامل بيرسون لارتباط الثنائي، ($R = 0.904$)، ولكن بدون الإشارة السالبة.

جدول 9.5: قيم معامل التحديد لنموذج انحدار "المقرر 1" على "الأسرة".

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.904 ^a	.817	.812	6.769	عدد أفراد أسرة الطالب

a. Predictors: (Constant), عدد أفراد أسرة الطالب

وبالنظر لقيمة معامل التحديد (R Square)، يمكننا القول بأن نموذج الانحدار الموفق يفسر 82% تقريبا من الاختلاف في درجات الطالب في المقرر 1 (المتغير التابع) اعتمادا على عدد أفراد الأسرة (المتغير التوضيحي)، وهذه النسبة في التفسير تعد جيدة جدا، وكذلك الأمر مع قيمة معامل التحديد المعدل الذي يكون له نفس التعليق.

ونأتي الآن لاختبار الأكثر أهمية في تقييم نموذج الانحدار الموفق، أي اختبار النموذج ككل، وهو اختبار تحليل التباين.

جدول 10.5: جدول تحليل التباين لنموذج انحدار "المقرر 1" على "الأسرة".

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6767.575	1	6767.575	147.708	.000 ^b
Residual	1511.967	33	45.817		
Total	8279.543	34			

a. Dependent Variable: درجة الطالب في المقرر 1
b. Predictors: (Constant), عدد أفراد أسرة الطالب

وفي الجدول الخامس في نافذة المخرجات، (جدول 10.5)), يمكننا استنتاج أن نموذج انحدار "المقرر 1" على "الأسرة" هو نموذج معنوي، حيث أن $P\text{-value} = 0$ بقيمة احتمالية $F_c = 147.708$ مما يدفعنا لرفض الفرضية الصفرية (نموذج الانحدار غير معنوي): H_0 .


¹ عادة ما تستخدم قيم الخطأ المعياري في المقارنة بين عدة نماذج انحدار لنفس المتغيرات ولكن باستخدام عينات مختلفة أو نماذج يتم فيها تغيير المتغيرات التوضيحية مع "تثبيت" المتغير التابع.

وهكذا، وكمحصلة لنتائج تقييم نموذج الانحدار السابقة، يمكننا استنتاج أن نموذج انحدار درجات الطلبة في المقرر 1 على عدد أفراد الأسرة هو نموذج جيد التوفيق ويمكن استخدامه لدراسة العلاقة بين هذين المتغيرين للتبيؤ.

فمثلاً، يمكننا التبيؤ بدرجات طالب ما في المقرر 1 بناء على قيمة افتراضية أو أكثر لعدد أفراد الأسرة، ولنأخذ القيمة $x_0 = 14$ لعدد أفراد أسرة، فعندما يكون: $y_0 = 98.994 - 4.613(14) = 34.412$ ، يعني أنه إذا أصبح عدد أفراد أسرة أحد الطلبة 14 فرداً فإن درجته في المقرر 1 ستختفي إلى 34 درجة تقريباً.

وختاماً لهذا المثال، لنقم برسم خط الانحدار الموفق كما وضمنا أعلاه. قم في شريط الأوامر العلوي باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/Dot المتغيرات اختر المتغير "المقرر 1" وقم بنقله لمربع المحور الصادي واختر متغير "الأسرة" وانقله لمربع المحور السيني ثم اضغط موافق.

بعد ظهور الرسم في نافذة المخرجات، قم بالنقر المزدوج عليه لظهور نافذة تحرير الرسم (Chart Editor)، وفي شريط الأوامر العلوي لتلك النافذة اختر Elements>Fit Line at Total ثم قم بالضغط على إغلاق في تلك النافذة للعودة لنافذة تحرير الرسم، ثمأغلق نافذة التحرير، وسيكون شكل الانتشار للمتغيرين مع خط الانحدار الموفق كما هو في الشكل (19.5)، ويلاحظ من انتشار النقاط طبيعة العلاقة العكسية بين درجات الطلبة في المقرر 1 وعدد أفراد الأسرة.



شكل 19.5: خط الانحدار الموفق للمتغير "المقرر 1" على متغير "الأسرة" مع شكل الانتشار لهما.

ونشير هنا إلى أنه من المفيد أحياناً النظر لقيمة (تقدير) الجزء المقطوع من المحور الصادي، $\hat{\beta}_0$ ، حيث أن القيم المرتفعة لهذا المعامل قد تعني في بعد الأحيان ما يُعرف بنقص توصيف النموذج أي نقص في عدد المتغيرات

التضویحیة الازمة لتكوين نموذج الانحدار الأفضل. لذلك، وفي كثیر من الدراسات عادة ما تتجه لتكوين نماذج انحدار خطی متعددة بهدف مراقبة تأثير عدّة متغيرات توضیحیة على المتغير التابع، وهذا أقرب للواقع العلمي مهما كان مصدر متغيرات النموذج. وهكذا سنتناول التعامل مع نماذج الانحدار الخطی المتعدد في الجزء التالي.

5.5 تحليل الانحدار الخطی المتعدد (Multiple Linear Regression Analysis)

في الكثیر من الدراسات التي تتطلب تطبيق أسلوب تحليل الانحدار، نجد أن توصیف العلاقة السبیبة بين متغيرات الدراسة بمتغيرین فقط عادة ما يكون فيه نقص في هذا التوصیف، بمعنى أن التغيير في قيم المتغير التابع سيعتمد في الغالب على أكثر من متغير توضیحی واحد، وهنا تبرز الحاجة لإدراج عدّة متغيرات توضیحیة في النموذج لتوصیف العلاقة السبیبة بشكل أوسع. وهكذا يمكن تعريف نموذج الانحدار المتعدد للمتغير التابع على p متغير توضیحی بالصورة التالية؛

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i$$

أو

$$y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i$$

حيث $j = 1, 2, \dots, p$ ، و $i = 1, 2, \dots, n$

ولنقم باستخدام متغيرات ملف البيانات "بيانات الطلبة2" لتوثيق نموذج انحدار متعدد وتقسیر النتائج. ومن الناحیة العملية في الدراسات المتضمنة لاستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد، يمكننا قبل البدء بتوفيق نموذج الانحدار الخطی المتعدد أن "تستكشف" طبیعة العلاقة بين المتغير التابع وكل متغير من المتغيرات التوضیحیة، وذلك عن طريق حساب معامل الارتباط الخطی البسيط لكل زوج منها.

ولنفرض أننا نريد توثيق نموذج انحدار خطی لدراسة تأثير المتغيرات التوضیحیة: درجة الطالب في المقرر 3 ("مقرر3")، وعمر الطالب ("العمر")، عدد أفراد أسرة الطالب ("الأسرة")، ومعدل ساعات دراسة الطالب اليومیة ("ساعات_الدراسة") على متغير الاستجابة وهو درجة الطالب في المقرر 2 ("مقرر2").

سنقوم أولاً بحساب مصفوفة الارتباط للعلاقات الثنائيّة بين المتغير التابع وكل متغير توضیحی لمراقبة وجود (أو عدم وجود) علاقة خطیة بينهما. في شریط الأوامر العلوي قم باختیار Analyze>Correlate>Bivariate وفي نافذة الارتباط البسيط، (الشكل (10.5)), سنقوم باختیار المتغيرات "مقرر2", "مقرر3", "العمر", "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة" ونقلها إلى مربع المتغيرات (Variables) على اليمین، ثم نضغط موافق.

ستظهر مصفوفة الارتباط المطلوبة في نافذة المخرجات، (جدول 11.5)، وسنقوم باستخدام تلك المصفوفة بتحليل أربعة علاقات فقط، (وهي علاقة المتغير التابع بكل متغير توضيحي)، كما يلي:


جدول 11.5: مصفوفة معاملات الارتباط بين المتغيرات "مقرر 2"، "مقرر 3"، "العمر"، "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة".

Correlations					
		درجة الطالب في المقرر 2	درجة الطالب في المقرر 3	عمر الطالب بالسنوات	معدل ساعات الدراسة اليومية
درجة الطالب في المقرر 2	Pearson Correlation	1	.055	-.454-**	-.907-**
	Sig. (2-tailed)		.752	.006	.000
	N	35	35	35	35
درجة الطالب في المقرر 3	Pearson Correlation	.055	1	-.082	-.102
	Sig. (2-tailed)	.752		.639	.561
	N	35	35	35	35
عمر الطالب بالسنوات	Pearson Correlation	-.454-**	-.082	1	.292
	Sig. (2-tailed)	.006	.639		.089
	N	35	35	35	35
عدد أفراد أسرة الطالب	Pearson Correlation	-.907-**	-.102	.292	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.561	.089	
	N	35	35	35	35
معدل ساعات الدراسة اليومية	Pearson Correlation	.847**	-.089	-.456-**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.610	.006	
	N	35	35	35	35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- نلاحظ وجود علاقة خطية ضعيفة جداً بين درجة الطالب في المقرر 2 ودرجته في المقرر 3، ($r = 0.055$ و $\text{Sig.} = 0.752$).
- توجد علاقة خطية عكسية معنوية بين درجة الطالب في المقرر 2 وعمره، ($\text{Sig.} = 0.006$ و $r = -0.454$).
- وتوجد علاقة خطية عكسية قوية جداً بين درجة الطالب في المقرر 2 وعدد أفراد أسرته، حيث ($r = -0.907$ و $\text{Sig.} = 0$).
- كذلك توجد علاقة خطية طردية قوية جداً بين درجة الطالب في المقرر 2 ومعدل ساعات دراسته اليومية، حيث ($r = 0.847$ و $\text{Sig.} = 0$).

ويمكننا إضافة لما سبق، استخدام مصفوفة شكل الانتشار لمراقبة العلاقات السابقة بصورة مرئية كما يظهر في شكل (20.5)، حيث أن العلاقات الأربع موجودة في الصف الأول من الرسم، ويُلاحظ على الأخص انتشار النقاط بشكل عشوائي غير محدد لدرجة الطالب في المقرر 2 ودرجته في المقرر 3، ووجود علاقة عكسية "لا بأس بها" بين درجة الطالب في المقرر 2 وعمره.



شكل 20.5: مصفوفة شكل الانتشار للمتغيرات "مقرر 2"، "مقرر 3"، "العمر"، "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة".

وبالتالي يمكننا مبدئيا القول بأن المتغيرات الثلاثة؛ عمر الطالب وعدد أفراد أسرته ومعدل ساعات دراسته ستكون متغيرات "مؤهلة" لتكوين نموذج انحدار خطى جيد مع متغير درجة الطالب في المقرر 2. أما متغير درجة الطالب في المقرر 3 فالرأي الأولي يشير بأنه لن يكون ذو أهمية في التأثير على المتغير التابع، إلا أننا، وبداعف تقديم شرح متكامل لتقسيير نتائج الانحدار المتعدد، سنكمل توفيق نموذج الانحدار بكل متغيرات الدراسة المقترحة منذ البداية.

لتوفيق نموذج الانحدار المتعدد المطلوب نقوم في نافذة تحليل الانحدار الخطي، (شكل (15.5)), باختيار المتغير "المقرر 2" كمتغير تابع، والمتغيرات "مقرر 3"، "العمر"، "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة" كمتغيرات توضيحية، ثم نضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) وفي النافذة الفرعية الخاصة به، نختار عرض التقديرات (Estimates) وفترات الثقة (Confidence Intervals) وتوفيق النموذج (Model Fit)، ثم نضغط استمراراً للعودة للنافذة الأصلية، ونضغط بعد ذلك موافق فظهور النتائج في نافذة المخرجات، وسنعرض هنا الجداول الثلاثة المهمة في تلك النافذة تباعاً بحسب ترتيب تقسيير النتائج المنطقي؛ من جدول (12.5)، نستطيع كتابة نموذج الانحدار المتعدد الموفق كالتالي:

$$\hat{y}_i = 109.369 + 0.007x_{i1} - 1.203x_{i2} - 3.189x_{i3} + 3.220x_{i4}, \quad i = 1, 2, \dots, 35$$

أو بطريقة أخرى؛

$$\hat{y}_i = 109.369 + 0.007(\text{المقرر } 3)_i - 1.203(\text{العمر})_i - 3.189(\text{الأسرة})_i + 3.220(\text{ساعات_الدراسة})_i$$

ويمكن تفسير قيم معاملات الانحدار بالصورة التالية:

- زيادة درجة واحدة في المقرر 3 لن يؤدي لزيادة تذكر في درجات الطالب في المقرر 2، ($\hat{\beta}_1 = 0.007$) .
- زيادة سنة واحدة في عمر الطالب يؤدي لانخفاض قدره درجة واحدة تقريباً في درجات الطالب في المقرر 2، ($\hat{\beta}_2 = -1.203$) .
- زيادة فرد واحد في أسرة الطالب يؤدي لانخفاض قدره 3 درجات تقريباً في درجات الطالب في المقرر 2، ($\hat{\beta}_3 = -3.189$) .
- زيادة ساعة واحدة في معدل ساعات المذاكرة اليومية للطالب يؤدي لارتفاع قدره 3 درجات تقريباً في درجات الطالب في المقرر 2، ($\hat{\beta}_4 = 3.220$) . وذلك بإهمال قيمة الجزء المقطوع $\hat{\beta}_0$ في النموذج.

جدول 12.5: نتائج تقدير معالم نموذج الانحدار الخطي المتعدد للمتغير "المقرر 2" على المتغيرات "مقرر 3"، "العمر"، "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة".

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	109.369	17.876		6.118	.000	72.862	145.877
درجة الطالب في المقرر 3	.007	.067	.006	.098	.923	-.130	.143
عمر الطالب بالسنوات	-1.203	.630	-.130	-1.909	.066	-2.490	.084
عدد أفراد أسرة الطالب	-3.189	.481	-.641	-6.633	.000	-4.171	-2.207
معدل ساعات الدراسة اليومية	3.220	1.128	.298	2.854	.008	.916	5.525

a. Dependent Variable: درجة الطالب في المقرر 2

ولتقييم جودة نموذج الانحدار الموفق، ومن نفس الجدول، (جدول 12.5)، نتجه لقبول الفرضية الصفرية التي تنص على عدم أهمية تأثير المتغيرات "مقرر 3" و"العمر" على درجة الطالب في المقرر 2، ورفض نفس الفرضية الصفرية بالنسبة للمتغيرين "الأسرة" و"ساعات_الدراسة".

وقبل الوثوب للاستنتاجات النهائية، نكمل تحليل المخرجات، فمن فترات الثقة لمعامل النموذج نستطيع كتابة:

- لمتغير "الأسرة" لدينا: $-4.171 < \beta_3 < -2.207$ أي أننا يعني أننا واثقون بنسبة 95% بأن تقدير تأثير عدد أفراد الأسرة على درجات الطالب في المقرر 2 سيتراوح في العموم بين انخفاض من 2 إلى 4 درجات تقريباً.
- لمتغير "ساعات_الدراسة" يكون: $0.916 < \beta_4 < 5.525$ بمعنى أننا يعني أننا واثقون بنسبة 95% بأن تقدير تأثير معدل ساعات الدراسة اليومية على درجات الطالب في المقرر 2 سيتراوح في العموم بين ارتفاع من درجة واحدة إلى 6 درجات تقريباً.

أما بالنسبة للمتغيرين التوضيحيين الآخرين فلن يتم التعليق على فترات الثقة الخاصة بمعاملات الانحدار لهما نظراً لعدم أهميتهما في النموذج.

من جدول قيم معامل الارتباط المتعدد ومعامل التحديد ومعامل التحديد المعدل، (جدول 13.5)، يمكن مشاهدة أن قيمة معامل الارتباط المتعدد تدل على وجود علاقة قوية جداً بين المتغير التابع وبقي المتغيرات التوضيحية كل.

وبالنظر لقيمة معامل التحديد، يمكننا القول بأن نموذج الانحدار الموفق يفسر 89% تقريباً من الاختلاف في درجات الطالب في المقرر 2 (المتغير التابع) اعتماداً على المتغيرات التوضيحية في النموذج، وهي نسبة ممتازة للنموذج، وكذلك الأمر مع قيمة معامل التحديد المعدل.

جدول 13.5: قيم معامل التحديد لنموذج انحدار "المقرر 1" على المتغيرات "مقرر 3"، "العمر"، "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة".

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.945 ^a	.894	.879	5.284

a. Predictors: (Constant), درجة الطالب في المقرر 3، عمر الطالب بالسنوات، عدد أفراد أسرة الطالب

وأما من نتيجة تحليل التباين لنموذج الانحدار الموفق، (جدول 14.5)، فنخلص إلى أن نموذج انحدار "المقرر 2" على باقي المتغيرات التوضيحية هو نموذج معنوي، حيث أن $F_c = 63.015$ بقيمة احتمالية $P-value = 0$ مما يدفعنا لرفض الفرضية الصفرية (نموذج الانحدار غير معنوي) H_0 .

جدول 14.5: جدول تحليل التباين لنموذج انحدار "المقرر 1" على المتغيرات "مقرر 3"، "العمر"، "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة".

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7037.382	4	1759.346	63.015
	Residual	837.589	30	27.920	
	Total	7874.971	34		

a. Dependent Variable: درجة الطالب في المقرر 2
b. Predictors: (Constant), عمر الطالب بالسنوات، درجة الطالب في المقرر 3، عدد أفراد أسرة الطالب

وهكذا، فإنه يمكن القول بأن نموذج انحدار درجات الطلبة في المقرر 2 على المتغيرات "مقرر 3"، "العمر"، "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة" هو نموذج جيد التوفيق في العموم، ولكن يجب أن لا يشتمل على المتغيرين "مقرر 3" و"العمر" نظراً لأن خفاض تأثيرهما وافتقارهما لعلاقة سلبية قوية مع درجات الطلبة في المقرر 2. وهذا يعني أن المتغيرات الأكثر أهمية في التأثير على درجة الطالب في المقرر 2 هما عدد أفراد الأسرة ومعدل ساعات الدراسة اليومية، ولاحظ أن المتغير التوضيحي "العمر" لم يجتاز اختبار المعنوية رغم ارتباطه بالمتغير التابع بشكل معنوي عند حساب معامل الارتباط.

ولاستخدام نموذج الانحدار في التنبؤ، يمكنك التعويض بأي قيم تتبؤه (للمتغيرات التوضيحية) في النموذج الموفق للحصول على قيمة تقديرية لدرجات الطلبة في المقرر²، ألا أنه من المنطقي إعادة توفيق النموذج أولاً باستخدام المتغيرات التي أظهرت تأثيراً معنواً في النتائج السابقة بدلاً من استخدام النموذج السابق في التنبؤ. في هذه المرحلة، نقترح على القارئ إعادة توفيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد:

1. باستخدام المتغير "مقرر2" كمتغير تابع والمتغيرين "الأسرة"، و"ساعات_الدراسة" كمتغيرات توضيحية وملاحظة التغير في نتائج التحليل.
2. باستخدام متغيرات أخرى من ملف البيانات "بيانات الطلبة2" كمتغيرات تابعة تارة وتوضيحية تارة أخرى ومحاولة الوصول لنماذج جيدة¹.

6.5 تقييم فرضيات النموذج الخطي وتحليل الباقي

(Assessing Model Assumptions and Residual Analysis)

في البند (2.3.5)، تم عرض الفرضيات التي ترتكز عليها طريقة المربيات الصغرى الاعتيادية أو كما يُطلق عليها فرضيات نموذج الانحدار الخطي، وفي هذا البند، سنعرض بعض النقاط الهامة حول كيفية تقييم بعض فرضيات النموذج الخطي والتي ستعلق كثير منها بتحليل الباقي، التي تمثل ابتعاد قيم المتغير التابع المقدرة عن قيمه الفعلية.

1.6.5 فرضية خطية النموذج (Linearity of the Model Assumption)

حيث أنه لا يمكن رسم شكل الانتشار أو خط الانحدار للنموذج الموفق عند وجود أكثر من متغيرين توضيحيين في النموذج، (يعنى أننا لن نستطيع تخطي الأبعاد الثلاثة (3D) في تمثيل البياني)، فإننا نلجأ لرسم شكل الانتشار للمتغير التابع مع كل متغير توضيحي على حدة ومراقبة سلوك نقاط الانتشار، فإذا كان نمط انتشار النقاط في "معظم" الأشكال يأخذ السلوك الخطي، (إضافة لوجود معاملات ارتباط خطي معنوية)، فإننا نستطيع القول إن نموذج الانحدار يحقق فرضية الخطية.

¹ في مفهوم تحليل الانحدار الخطي المتعدد توجد عدة طرق لبناء النماذج، ومنها ما يُعرف باختيار النموذج الأفضل (Best Model selection) باستخدام مجموعة من المتغيرات، إلا أن المجال لا يسمح هنا بعرضها.

سنستخدم البيانات في جدول (15.5) كتطبيق عملي على تقييم فرضيات النموذج الخطي وتحليل الباقي، وهذه البيانات تضم خمسة متغيرات تمثل نتائج اختبارات تقييم

جدول 15.5: نتائج تقييم نفسي لعينة من 25 شخص.

	التشخيص	تقييم 1	تقييم 2	تقييم 3	تقييم 4
	السلوكي				
1	36	60	50	37	38
2	12	47	49	50	30
3	60	57	53	53	46
4	51	67	43	45	26
5	50	51	45	38	30
6	28	35	45	34	23
7	70	27	30	24	8
8	55	72	66	52	66
9	62	69	56	55	54
10	70	39	55	47	49
11	37	31	40	38	14
12	83	70	63	58	76
13	90	71	46	39	44
14	34	63	48	28	21
15	56	52	59	59	61
16	59	79	52	58	59
17	54	33	50	52	50
18	100	68	57	60	77
19	48	75	58	45	49
20	70	44	45	40	32
21	24	71	41	35	17
22	46	64	64	53	59
23	54	23	43	30	28
24	44	71	65	54	65
25	41	79	47	33	33

نفسي وسلوكى لعينة مكونة من 25 شخصاً في مركز متخصص للتقييم السلوكي والإدراكي، حيث يخضع الشخص لأربعة اختبارات مختلفة، (تقييم 1، ..., تقييم 4)، ثم يتم منحه التشخيص النفسي النهائي بناءً على نتائج التقييمات الأربع من خلال مؤشرات خاصة، وهذه التقييمات بما فيها التشخيص السلوكي النهائي يتم حسابها على مقياس من 1 إلى 100 درجة.

وارتفاع درجة التشخيص السلوكي تدل على اقتراب الشخص من الوضع السلوكي والنفسي الطبيعي، وانخفاض هذه الدرجة يُعد مؤشراً على وجود اضطرابات سلوكية عند هذا الشخص.

سنقوم أولاً بإدخال البيانات من الجدول (15.5) في ملف بيانات جديد في برنامج SPSS باسم "التشخيص السلوكي"، وسيكون الهدف الأساسي من استخدام تحليل الانحدار الخطي لهذه البيانات هو دراسة كيفية تأثير التقييمات الأربع

على التشخيص السلوكي النهائي للأشخاص، بمعنى أن متغير "التشخيص_السلوكي" سيمثل المتغير التابع في النموذج، والمتغيرات "تقييم 1"، "تقييم 2"، "تقييم 3"، و "تقييم 4" ستكون المتغيرات التوضيحية.

وحيث أننا مهتمون في هذا الجزء بتقييم فرضية خطية نموذج الانحدار، سنقوم أولاً بإيجاد مصفوفة معاملات الارتباط الخطي البسيط لمراقبة طبيعة ونوع العلاقة بين المتغير التابع وبقية المتغيرات التوضيحية. في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Correlate>Bivariate. فتظهر نافذة الارتباط البسيط، (الشكل (10.5)). وسنقوم بحساب معاملات الارتباط الخطي البسيط بين كل المتغيرات، فنقوم بنقلها إلى مربع المتغيرات (Variables) على اليمين. وحيث أن كل المتغيرات المختارة هنا هي متغيرات كمية فسنختار حساب معامل بيرسون فقط ثم نضغط موافق فنحصل على مصفوفة الارتباطات البسيطة بين المتغيرات المختارة كما يظهر في جدول (16.5). وفي هذا الجدول، ستكون مراقبتنا للصف الأخير فقط، أي لمعاملات الارتباط بين المتغير "التشخيص_السلوكي" والمتغيرات التوضيحية الأربع.

جدول 16.5: مصفوفة الارتباطات البسيطة للمتغيرات "تقييم 1"، "تقييم 2"، "تقييم 3"، "تقييم 4"، و"التشخيص_السلوكي".

Correlations


		تقييم 1	تقييم 2	تقييم 3	تقييم 4	التشخيص_السلوكي
تقييم 1	Pearson Correlation	1	.102	.181	.327	.514**
	Sig. (2-tailed)		.627	.387	.111	.009
	N	25	25	25	25	25
تقييم 2	Pearson Correlation	.102	1	.519**	.397*	.497*
	Sig. (2-tailed)	.627		.008	.050	.011
	N	25	25	25	25	25
تقييم 3	Pearson Correlation	.181	.519**	1	.782**	.897**
	Sig. (2-tailed)	.387	.008		.000	.000
	N	25	25	25	25	25
تقييم 4	Pearson Correlation	.327	.397*	.782**	1	.869**
	Sig. (2-tailed)	.111	.050	.000		.000
	N	25	25	25	25	25
التشخيص_السلوكي	Pearson Correlation	.514**	.497*	.897**	.869**	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.011	.000	.000	
	N	25	25	25	25	25

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ويُلاحظ من اختبارات الفروض الخاصة بتلك المعاملات أن العلاقة بين المتغير التابع وكل المتغيرات التوضيحية هي علاقة خطية ذات معنوية، ($P-value < 0.05$). وإن كانت علاقة "التشخيص_السلوكي" بالمتغيرين "تقييم 3" و"تقييم 4" تُعد أقوى بكثير من المتغيرين الآخرين. ولرؤية الصورة بشكل أوضح، سنقوم باستخدام التمثيل البياني لتلك المعاملات، أي أننا سنستخدم مصفوفة شكل الانتشار.

في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/Dot وفي نافذة اختيار شكل الانتشار، قم باختيار شكل مصفوفة الانتشار ثم اضغط تعريف وفي النافذة الفرعية قم باختيار كل المتغيرات ونقلها إلى مربع متغيرات المصفوفة (Matrix Variables) ثم اضغط موافق.

في نافذة المخرجات، سنلاحظ من الصف الأخير في مصفوفة شكل الانتشار، (شكل (21.5))، مدى قوة العلاقة الطردية بين متغير "التشخيص_السلوكي" والمتغيرين "التقييم 3" و"التقييم 4". إلا أنه في العموم، يمكننا القول أن المتغير التابع في هذا النموذج يرتبط بعلاقات خطية مع المتغيرات التوضيحية، وبالتالي لا توجد مخالفة لفرضية خطية نموذج الانحدار.



شكل 21.5: مصفوفة شكل الانتشار للمتغيرات "تقييم 1"، "تقييم 2"، "تقييم 3"، "تقييم 4"، و "التشخيص_السلوكي".


2.6.5 فرضية عدم عشوائية المتغيرات التوضيحية (Non-Random Explanatory Variables)

من ضمن الطرق العملية المستخدمة لتقدير هذه الفرضية هو رسم شكل الانتشار لقيم الباقي ضد قيم كل متغير توضيحي، فإذا أظهر الشكل سلوكا منتظما أو نمطا محددا للنقاط، خطيا كان أو غير خطيا، فهذا يدل على ارتباط هذا المتغير التوضيحي بالخطأ العشوائي مما يدل على عشوائية هذا المتغير وبالتالي مخالفة هذه الفرضية.

ولرسم شكل الانتشار المطلوب، (بين الباقي والمتغيرات التوضيحية)، يجب أولا الحصول على قيم الباقي المقدرة من نموذج الانحدار، ثم، وهذه القيم يمكن حسابها في SPSS بالطريقة التالية:

في ملف البيانات "التشخيص_السلوكي"، قم بتفعيل نموذج انحدار المتغير "التشخيص_السلوكي" على المتغيرات "التقييم 1"، "التقييم 2"، "التقييم 3"، و "التقييم 4"، من خلال اختيار Analyze>Regression>Linear، وفي نافذة تحليل الانحدار الخطي قم بتعيين المتغير التشخيص_السلوكي كمتغير تابع والمتغيرات "التقييم 1"، "التقييم 2"، "التقييم 3"، و "التقييم 4" كمتغيرات توضيحية.

اضغط خيار الحفظ (Save) في هذه النافذة فتظهر نافذة فرعية جديدة كما يظهر في الشكل (22.5)، وهذه النافذة هي مخصصة في معظمها لحفظ القيم المقدرة، وحساب بعض المقاييس من نموذج الانحدار الخطي في ملف البيانات كمتغيرات جديدة.



شكل 22.5: نافذة حفظ القيم المقدرة في نموذج الانحدار الخطي.

قم باختيار حفظ قيم المتغير التابع المقدرة¹ غير المعيارية (Unstandardized) في مربع القيم المقدرة (Predicted Values) واختيار حفظ القيم المقدرة غير المعيارية للبواقي (Unstandardized) في مربع البواقي (Residuals)، كما يظهر في الشكل (22.5)، ثم اضغط استمرار. وفي النافذة الأصلية لتحليل الانحدار اضغط موافق للتنفيذ.

ستظهر بعد ذلك النتائج في نافذة المخرجات، إلا أننا الآن لن تكون مهتمين بها حالياً نظراً لتركيزنا على استخدام قيم البواقي فقط والتي سنجد أنها قد تم إضافتها كمتغير جديد لملف البيانات "التشخيص_السلوكي" باسم "RES_1"، إلى جانب قيم المتغير التابع المقدرة، (باسم "PRE_1")، كما يلاحظ في الشكل (23.5).

سنقوم الآن برسم شكل الانتشار للبواقي (المتغير "RES_1") مع كل متغير توضحي، أي أننا سنقوم بتنفيذ أربع أشكال انتشار كل على حده.


¹ تم اختيار قيم المتغير التابع المقدرة لتوضيح كيفية الحصول عليها في برنامج SPSS، ولن يتم استخدامها في التمثيل البياني هنا.

	تقسيم 1	تقسيم 2	تقسيم 3	تقسيم 4	التشخيص_السلوكي	PRE_1	RES_1
1	36	60	50	37	38	32.18757	5.81243
2	12	47	49	50	30	29.91406	.08594
3	60	57	53	53	46	51.37526	-5.37526
4	51	67	43	45	26	31.97794	-5.97794
5	50	51	45	38	30	29.88290	.11710
6	28	35	45	34	23	20.52506	2.47494
7	70	27	30	24	8	7.77087	.22913
8	55	72	66	52	66	67.07927	-1.07927
9	62	69	56	55	54	57.50383	-3.50383
10	70	39	55	47	49	52.95644	-3.95644
11	37	31	40	38	14	18.54266	-4.54266
12	83	70	63	58	76	74.46389	1.53611

شكل 23.5: ملف البيانات "التشخيص_السلوكي" بعد إضافة قيم الباقي وقيم المتغير التابع المقدرة من نموذج الانحدار.

لتنفيذ شكل الانتشار، سنقوم من شريط الأوامر العلوي باختيار Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/Dot . وفي نافذة الخيارات، سنبقى على الخيار الافتراضي، وهو شكل الانتشار البسيط، ونضغط على تعريف فتظهر نافذة جديدة لاختيار المتغيرات في شكل الانتشار البسيط، كما في الشكل (2.5)).

في تلك النافذة، سنقوم باختيار متغير الباقي "RES_1" ونقله لمربع المحور الصادي (Y-Axis) واختيار المتغير "تقسيم 1" ونقله لمربع المحور السيني (X-Axis)، ثم نضغط موافق فنحصل على شكل الانتشار بين المتغيرين. وسنقوم بتكرار هذه الخطوة مع المتغيرات الثلاثة الأخرى؛ "تقسيم 2"، "تقسيم 3"، و"تقسيم 4" فنحصل على الرسومات الأربع كما يوضح الشكل (24.5).



شكل 24.5: شكل الانتشار للباقي مع المتغيرات التوضيحية "تقسيم 1"، "تقسيم 2"، "تقسيم 3"، و"تقسيم 4".

ونلاحظ من شكل انتشار النقاط في الرسومات الأربعية أنها تنتشر بصورة عشوائية ولا تأخذ نمط أو اتجاه معين، وهذا يدل على عدم وجود علاقة، خطية أو غير خطية، بين الباقي وأي متغير توضيحي وبالتالي يدل ذلك على تحقق فرضية عدم عشوائية المتغيرات التوضيحية في نموذج الانحدار الموفق.

3.6.5 فرضية استقلالية المتغيرات التوضيحية (Independence of Errors Assumption)

توجد عدة طرق للتحقق من هذه الفرضية، ولعل أبرزها هي توفيق نماذج انحدار خطى يكون فيها أحد المتغيرات التوضيحية هو المتغير التابع وباقى المتغيرات، (باستثناء المتغير التابع الأصلي)، هي المتغيرات التوضيحية في كل مرة. وبمراقبة نتائج توفيق هذه النماذج الجديدة، يتم تحديد المتغيرات التوضيحية التي تُظهر نتائج "معنوية" كمتغيرات تابعة بأنها متغيرات مرتبطة خطياً بباقي المتغيرات التوضيحية، وهو ما يُعرف بمشكلة التعدد الخطى (Multicollinearity) في مفهوم تحليل الانحدار.

للبيانات "التشخيص السلوكي"، سنقوم بالتحقق من استقلالية المتغيرات التوضيحية الأربعية عن بعضها البعض عن طريق توفيق أربعة نماذج انحدار خطى جديدة يأخذ فيها كل متغير توضيحي دور المتغير التابع في كل مرة، ولتنفيذ ذلك في برنامج SPSS، سنقوم في نافذة تحليل الانحدار، التي سنحصل عليها من أمر Analyze>Regression>Linear و "تقيم4" في مربع المتغير التابع، ووضع باقى المتغيرات، (باستثناء المتغير "التشخيص_السلوكي")، في مربع المتغيرات التوضيحية.

ثم نقوم باختيار الحصول على (Model Fit) فقط من خيارات الإحصاءات (Statistics) في نافذة تحليل الانحدار الخطى لكل نموذج من النماذج الأربعية، وقد قمنا بتلخيص نتائج تقييم النماذج الأربعية، (وهي نتائج تحليل التباين ومعاملات التحديد والارتباط المتعدد)، في جدول واحد هو الجدول (17.5).

من هذا الجدول، نستطيع استنتاج ما يلى:

- المتغيران التوضيحيان "تقيم1" و "تقيم2"، كانت نتائج توفيقهما على باقى المتغيرات التوضيحية غير معنوية؛ ($P\text{-value} > 0.05$)، مصحوبة بمعاملات تحديد متدنية، (0.121 و 0.270 على الترتيب)، وبالتالي نستطيع القول بأنهما لا يرتبطان بعلاقات خطية مع باقى المتغيرات التوضيحية، أي أنهما مستقلان خطياً عنها.
- أما المتغيران التوضيحيان الآخرين "تقيم3" و "تقيم4"، فقد أظهرا نتائج معنوية في اعتمادهما خطياً على المتغيرات التوضيحية الأخرى، ($P\text{-value} = 0$)، بمعاملات تحديد مرتفعة، (0.668 و 0.647)، وهذا فإنهما يشكلان مخالفة لفرضية الاستقلال الخطى بين المتغيرات التوضيحية في نموذج الانحدار الأصلي.

جدول 17.5: نتائج تقييم النماذج الأربع التي تكون فيها المتغيرات التوضيحية "تقسيم 1"، "تقسيم 2"، "تقسيم 3"، و "تقسيم 4" متغيرات تابعة في كل نموذج.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.348 ^a	.121	-.004	20.340

a. Predictors: (Constant), تقسيم 3, تقسيم 2, تقسيم 4

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3	399.789	.966	.427^b
	Residual	21	413.733		
	Total	24			

a. Dependent Variable: تقسيم 1

b. Predictors: (Constant), تقسيم 3, تقسيم 2, تقسيم 4

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.519 ^a	.270	.166	15.797

a. Predictors: (Constant), تقسيم 3, تقسيم 1, تقسيم 4

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3	645.486	2.587	.080^b
	Residual	21	249.552		
	Total	24			

a. Dependent Variable: تقسيم 2

b. Predictors: (Constant), تقسيم 3, تقسيم 1, تقسيم 4

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.668	.621	5.451

a. Predictors: (Constant), تقسيم 2, تقسيم 1, تقسيم 4

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3	419.369	14.116	.000^b
	Residual	21	29.709		
	Total	24			

a. Dependent Variable: تقسيم 3

b. Predictors: (Constant), تقسيم 4, تقسيم 1, تقسيم 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.647	.597	6.779

a. Predictors: (Constant), تقسيم 2, تقسيم 1, تقسيم 3

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3	590.161	12.843	.000^b
	Residual	21	45.950		
	Total	24			

a. Dependent Variable: تقسيم 4

b. Predictors: (Constant), تقسيم 2, تقسيم 3

وننوه هنا إلى إمكانية إجراء اختبار استقلالية المتغيرات التوضيحية خطياً عن بعضها البعض من نافذة تحليل الانحدار، وذلك عند توفيق النموذج المطلوب، باستخدام معامل تصخم التباين (Variance Inflation Factor)، باسم تشخيص الارتباط الخطي (VIF) المتوفّر في خيار الإحصاءات في نافذة تحليل الانحدار، (شكل (16.5))، باسم تشخيص الارتباط الخطي

(Collinearity Diagnostics)، والذي يوفر أيضاً مؤشراً جيداً لمراقبة وجود مشكلة التعدد الخطى بين المتغيرات التوضيحية.

4.6.5 فرضية توزع الخطأ بتوزيع طبيعي (Normality of Error Terms)

توجد عدة طرق للتحقق من هذه الفرضية من ضمنها اختبار كولموجروف-سميرنوف وختبار شابيرو-ويلك، وللذان تم التطرق لهما سابقاً في الفصل الثالث، إضافة لإمكانية استخدام التمثيل البياني QQ للتحقق من توزع الخطأ طبيعياً.

لدينا في ملف البيانات "التشخيص السلوكي" قيم الباقي لنموذج الانحدار الخطى الموفق، وهكذا سنقوم ببساطة باختيار أمر Analyze>Descriptive Statistics>Explore واختيار خيار خيار الرسم الطبيعي مع الاختبارات ضمن خيار الرسم (Plots) ضمن خيار الرسم (Normality plot with tests)


ومن الجدول الخاص باختبارات الطبيعية، (جدول 18.5)، يمكن الاستنتاج من كلا الاختبارين أن الباقي تتبع التوزيع الطبيعي، ($P\text{-value} > 0.05$).

جدول 18.5: اختبارات كولموجروف وشابيرو للباقي في نموذج انحدار التشخيص_السلوكي.

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
الباقي	.120	25	.200*	.943	25	.174

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

إضافة لاختبارات الطبيعية، يمكن استخدام رسم QQ كما يظهر في شكل (25.5)، والذي يؤكّد طبيعية توزع الباقي، حيث أن النقاط تقترب من الخط المستقيم بشكل كبير.



شكل 25.5: رسم QQ لباقي نموذج انحدار "التشخيص_السلوكي".


ويمكن الحصول على رسم QQ للبواقي إما باستخدامه من شريط الأدوات العلمي Analyze>Descriptive، و اختيار البواقي "RES_1" في مربع المتغيرات، أو استخدام خيار رسم التوزيع الطبيعي Statistics>Q-Q Plots في خيار الرسم (Plots) في نافذة تحليل الانحدار الخطي والذي سيوفر رسم QQ للبواقي المعيارية (Standardized Residuals).

5.6.5 فرضية تجانس قيم حد الخطأ (Homoscedasticity Assumption)

للتحقق من مدى ثبات هذه الفرضية في نموذج الانحدار الخطي، سنستخدم طريقة بسيطة هي طريقة اختبار ارتباط الرتب لسييرمان، والتي سوف تعتمد على اختبار ارتباط الرتب بين قيم البواقي المطلقة، (أي بأخذ القيمة المطلقة لها)، وقيم المتغيرات التوضيحية في نموذج الانحدار، فإذا وجدت علاقة ذات معنوية بينها دل ذلك على وجود مخالفة لفرضية، أي وجود ما يعرف بمشكلة عدم التجانس في التباين (Heteroscedasticity).

في بيانات "التشخيص السلوكي"، سنقوم أولاً بتعريف متغير جديد سيكون عبارة عن القيمة المطلقة لقيم البواقي، وسيتم تعريف هذا المتغير كالتالي:

في شريط الأوامر العلمي، سنقوم باختيار Transform>Compute Variable وفي نافذة حساب المتغير سنختار من مجموعة الدوال (Function group) الدوال الرياضية (Arithmetic) ومن تلك الدوال، (في المربع الأسفل منها)، سنختار دالة القيمة المطلقة (Abs)، ونقوم بالنقل المزدوج على الدالة، (أو سحبها بالفأرة إلى مربع الحساب الرقمي (Numeric Expression)، ثم ندخل متغير البواقي "RES_1" في نطاق الدالة كما هو موضح في الشكل (26.5)، وسنقوم بإعطائه الاسم "ABS_RES" في المتغير المستهدف (Target Variable).



شكل 26.5: نافذة حساب متغير جديد، وهي القيمة المطلقة للبواقي "RES_1" في بيانات "التشخيص السلوكي".

بعد ذلك نضغط موافق فيتم إدراج المتغير الجديد المطلوب في جدول بيانات "التشخيص السلوكي". الآن سنقوم بتنفيذ اختبار معامل سبيرمان بين قيم الباقي المطلقة وكل متغير توضيحي في النموذج؛

في شريط الأوامر العلوي نختار Analyze>Correlate>Bivariate وفي نافذة الارتباط البسيط نقوم بنقل المتغيرات "تقييم1"، "تقييم2"، "تقييم3"، "تقييم4" و"ABS_RES" إلى مربع المتغيرات، ونختار حساب معامل سبيرمان فقط من بين المعاملات الثلاثة في (Correlation Coefficients)، ثم نضغط موافق فتظهر مصفوفة الارتباط البسيط كما هو في جدول (19.5).

جدول 19.5: مصفوفة الارتباط البسيط بين المتغيرات "تقييم1"، "تقييم2"، "تقييم3"، "تقييم4"، و "ABS_RES".

Correlations					
	تقييم1	تقييم2	تقييم3	تقييم4	ABS_RES
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.030	.230	.441*
	Sig. (2-tailed)		.888	.268	.027
	N	25	25	25	25
تقييم2	Correlation Coefficient	.030	1.000	.474*	.336
	Sig. (2-tailed)	.888		.017	.101
	N	25	25	25	25
تقييم3	Correlation Coefficient	.230	.474*	1.000	.765**
	Sig. (2-tailed)	.268	.017		.000
	N	25	25	25	25
تقييم4	Correlation Coefficient	.441*	.336	.765**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.027	.101	.000	
	N	25	25	25	25
ABS_RES	Correlation Coefficient	.062	-.104	-.127	.006
	Sig. (2-tailed)	.769	.622	.545	.977
	N	25	25	25	25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ومن الصف الأخير في مصفوفة الارتباط يتضح أن كل العلاقات الثانية بين الباقي المطلقة والمتغيرات التوضيحية هي ليست ذات معنوية، ($P\text{-value} > 0.05$)، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية ($H_0: \rho_{\hat{e}X} = 0$) لكل المتغيرات التوضيحية، مما يدل على تحقق فرضية تجانس تباين حد الخطأ.

الفصل السادس

الاختبارات اللامعلمية وتحليل الموثوقية

(Nonparametric Tests and Reliability Analysis)

في الفصل الرابع، قمنا بالعديد من الاستدلالات الإحصائية حول معالم مثل الوسط الحسابي والتباين، وتم تنفيذ اختبارات لفرضيات تتناول عينة واحدة وعينتين وحتى أكثر، وكذلك تقدير فترات الثقة لتلك المعالم، وهذا يندرج كله تحت ما يُعرف بالتقدير المعلمي (Parametric Estimation) وختبارات الفروض ضمن مفهوم الإحصاء الاستدلالي. والشروط التي يعتمد عليها استخدام هذا التقدير تتمثل في الغالب على كون البيانات (أي العينة أو العينات) المراد اختبارها هي مسحوبة من مجتمعات تتبع توزيعاً طبيعياً، إلا أن هذا الشرط أو الافتراض قد لا يتحقق في كثير من الحالات، لذلك نلجم عند ذلك استخدام اختبارات أخرى لا تعتمد على التوزيع الاحتمالي للعينة، وهذه الاختبارات تسمى بالاختبارات اللامعلمية (Nonparametric)، وتسمى أحياناً بالاختبارات الحرة من الافتراضات (Assumption-free tests).

ومن ضمن الأنماط التي قد "تخرج" البيانات من التوزيع الطبيعي كثرة تكرارات القيم المنخفضة أو المرتفعة والذي يسبب التواء التوزيع يميناً أو يساراً، أو كثرة القيم المتطرفة، أو صغر حجم العينة.

ومعظم الاختبارات اللامعلمية ترتكز على مبدأ حساب الرتبة (Ranking) للبيانات، بمعنى إعطاء رتب أو قيم للمشاهدات من الأقل إلى الأكثرب، وهكذا فإن القيمة الأصغر في البيانات ستأخذ الرتبة الأقل، والقيمة الأكبر في ستأخذ الرتبة الأكبر، ويتم بعد ذلك إجراء الاختبار المطلوب باستخدام الرتب المعطاة بدلاً من القيم الفعلية للبيانات. ويمكن تصنيف الاختبارات اللامعلمية إلى ثلاثة أقسام رئيسية، بحسب طبيعة تنظيمها؛

- اختبارات لعينة واحدة.
- اختبارات للعينات المستقلة، (عينتين أو أكثر).
- اختبارات للعينات المرتبطة، (عينتين أو أكثر).

وفي هذا الفصل، سنستعرض بعض أهم الاختبارات اللامعلمية وكيفية تنفيذها في برنامج SPSS، وكذلك قراءة وتقسيم النتائج المتعلقة بها.

1.6 الاختبارات اللامعلمية لعينة واحدة (One Sample Nonparametric Tests)

1.1.6 اختبار مربع كاي لجودة التوفيق (Chi-Square Goodness of Fit Test)

عند التعامل مع متغير وصفي، (اسمي كان أو ربلي)، يحتوي على تصنیفات أو تقسیمات معینة (Categories)، قد يكون من المفید التعرف على النمط الذي تتبعه تکارات كل تقسیم في هذا المتغير، وما إذا كانت هذه التکارات متوزعة على التقسیمات بشكل متساوی أو غير متساوی، أو قد تكون مهتمین بالتعرف على التوزیع الاحتمالي الذي قد يتبعه هذا المتغير. في هذه الحالات يمكننا استخدام اختبار جودة التوفيق لمربع كای لتنفيذ المطلوب.

وتعزز إحصاء اختبار مربع كای لجودة التوفيق بين التکارات المشاهدة (observed) في المتغير والمتواعدة (expected) له بالصيغة:

$$\chi_c^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

حيث، o_i هي قيم التکارات المشاهدة للتقسیم i ، e_i هي قيم التکارات المتوقعة للتقسیم i ، و k هو عدد تقسیمات المتغير. وتكون درجات الحریة مساویة لعدد تقسیمات المتغير ناقصاً واحداً.

ولتنفيذ اختبار جودة التوفيق في برنامج SPSS لأخذ المثال التالي؛ في ملف بيانات "فيتامين دال"، لنفرض أننا مهتمون بالتحقق ما إذا كان الأشخاص في العينة:

1. متوزعون على مستويات فيتامين دال الثلاثة؛ (أقل من 30، من 30 إلى 70، وأكثر من 70)، بشكل متقارب (متساوی)، أي اختبار الفرضية الصفرية:

احتمالات توزع الأشخاص في مستويات فيتامين دال متساویة: H_0 أو

$$H_0: P_{(70)} = P_{(30)} = P_{(30 \text{ إلى } 70)}$$


2. متوزعون على الفئات العمرية الثلاثة؛ (أقل من 30، من 30 إلى 50، و 51 فأكثراً)، بشكل متقارب، أي اختبار الفرضية الصفرية:

احتمالات توزع الأشخاص في الفئات العمرية متساویة: H_0 أو

$$H_0: P_{(50)} = P_{(30 \text{ إلى } 50)} = P_{(30 \text{ إلى } 51)}$$

نقوم في شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>Chi-Square، فتظهر نافذة اختبار مربع كای كما هو في الشكل (1.6). قم في تلك النافذة باختيار المتغيرين

"مستويات_فيتامين_دال" و "الفئة_العمرية" ونقلهما إلى مربع قائمة متغيرات الاختبار (Test Variable List) (All)، حيث أنها ستحتاج توزيع الأشخاص في التصنيفات، بنبغي على خيار تساوي التوزيع في التصنيفات (Expected values) كما هو، ونضغط موافق للتنفيذ.



شكل 1.6: نافذة اختبار مربع كاي لجودة التوفيق، (اختبار احتمالات متساوية).

في نافذة المخرجات ستلاحظ ظهور النتائج في ثلاثة جداول، (جدول (1.6))، الجدولين الأولين يمثلان توزيع التكرارات المشاهدة والمتوخقة، والفرق بينهما (Residual) للمتغيرين "مستويات_فيتامين_دال" و "الفئة_العمرية" على الترتيب. وأما الجدول الثالث فيضم نتيجة الاختبار. ومن هذا الجدول يمكن رؤية أن:

1. توزيع الأشخاص على مستويات

جدول 1.6: نتائج اختبار مربع كاي لجودة التوفيق للمتغيرين "مستويات_فيتامين_دال" و "الفئة_العمرية"، (اختبار احتمالات متساوية).
مستويات_فيتامين_دال

	Observed N	Expected N	Residual
أقل من 30	32	20.0	12.0
من 30 إلى 75	14	20.0	-6.0
أكثر من 75	14	20.0	-6.0
Total	60		

فئات العمر

فيتامين دال الثلاثة غير متساوي،

حيث أن القيمة الاحتمالية P -value = 0.005، وبالتالي نرفض H_0 .

2. توزيع الأشخاص على الفئات العمرية

الثلاثة متساوي، حيث أن P -

value = 0.449، وبالتالي نقبل

	Observed N	Expected N	Residual
أقل من 30	16	20.0	-4.0
من 30 إلى 50	20	20.0	0.0
فاكثير 51	24	20.0	4.0
Total	60		

Test Statistics

	مستويات_فيتامين_دال	فئات_العمر
Chi-Square	10.800 ^a	1.600 ^a
df	2	2
Asymp. Sig.	.005	.449

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 20.0.

ولاحظ أيضاً، من الجدول السابق، ارتفاع قيم الفروقات بين القيم المشاهدة والمتوخقة


للمتغير "مستويات_فيتامين_ DAL" والذي يشكل مؤشراً أولياً على أن احتمالات توزع الأشخاص على مستويات الفيتامين الثلاثة لن تكون متساوية.

من جديد، يمكننا استخدام اختبار جودة التوفيق لاختبار ما إذا كانت التكرارات متوزعة على النسقين بشكل غير متساوي أي متوزعة باحتمالات غير متساوية، ولنفرض أننا نريد اختبار ما إذا الأشخاص في المثال السابق متوزعون على مستويات فيتامين DAL باحتمالات افتراضية معينة، ولتكن الفرضية المراد اختبارها هي:

$$H_0: P_{(70)} = 0.25, P_{(30)} = 0.25, P_{(30 \text{ إلى } 70)} = 0.50$$

أي أننا نريد اختبار فرضية أن الأشخاص متوزعون على المستويات الثلاثة لفيتامين DAL باحتمالات أو نسب هي 50%， 25%， و 25% على الترتيب.

لتنفيذ هذا الاختبار، نقوم في شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>Chi-Square ، وفي نافذة اختبار مربع كاي نقوم باختيار المتغير "مستويات_فيتامين_DAL" ونقله إلى مرعب قائمة متغيرات الاختبار، وسنقوم باختيار قيمة الاحتمالات (Values) في مربع القيم المتوقعة (Expected) بحيث نكتب قيمة الاحتمال 0.50 أولاً ثم نضغط إضافة (Add) وبعدها نكتب قيمة الاحتمال 0.25 ونضغط إضافة وأخيراً نكتب قيمة الاحتمال 0.25 ونضغط إضافة، فتكون لدينا قيم الاحتمالات كما هو مبين في الشكل (2.6)، ونضغط موافق للتنفيذ.



شكل 2.6: نافذة اختبار مربع كاي لجودة التوفيق، (اختبار احتمالات غير متساوية).

وفي نافذة المخرجات، ستظهر نتائج اختبار مربع كاي، (جدول 2.6)، ويمكن بوضوح ملاحظة أن قيم الفروقات بين القيم المشاهدة والمتوقعة هي ضئيلة، مما ينبئنا بأن توزع الأشخاص على مستويات الفيتامين ستكون على الأغلب كما هو في الفرضية الصفرية، ويدعم ذلك أن القيمة الاحتمالية للاختبار هي ($P\text{-value} = 0.875$)، مما يدفعنا لقبول الفرضية الصفرية القائلة بتوزع الاحتمالات بصورة غير متساوية وهي؛ 0.50، 0.25، و 0.25 بحسب ترتيب مستويات فيتامين دال.

جدول 2.6: نتائج اختبار مربع كاي لجودة التوفيق

للمتغير "مستويات_فيتامين_dal" ، (اختبار احتمالات متساوية).

مستويات فيتامين دال			
	Observed N	Expected N	Residual
أقل من 30	32	30.0	2.0
من 30 إلى 75	14	15.0	-1.0
أكثر من 75	14	15.0	-1.0
Total	60		


Test Statistics	
	مستويات فيتامين دال
Chi-Square	.267 ^a
df	2
Asymp. Sig.	.875

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.0.

2.1.6 اختبار ذي الحدين (Binomial Test)

من الاختبارات الامثلية المتوفرة في برنامج SPSS هو اختبار ذي الحدين والذي يتم فيه اختبار ما إذا كان متغير وصفي ثانوي، (أي له تقسيمين أو مستويين فقط)، يتبع توزيع ذي الحدين باحتمال معين.

لنفس البيانات؛ "فيتامين دال" ، سنقوم باختبار ما إذا كان متغير "النوع" يتبع توزيع ذي الحدين باحتمال 0.30



شكل 3.6: نافذة اختبار ذي الحدين لمتغير "النوع" باحتمال نجاح 0.30.

للذكور، (احتمال النجاح)،
واحتمال 0.70 للإناث، (احتمال الفشل). عندما نقوم في شريط الأوامر العلوي باختيار الاختبار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>Binomial نافذة الاختبار كما هو موضح في الشكل (3.6).

قم باختيار متغير "النوع" ونقله إلى مربع قائمة متغيرات الاختبار (Test Variable List) ، ثم قم بتغيير احتمال النجاح الافتراضي (Test

(Proportion) من 0.50 إلى 0.30 كما هو مبين في الشكل. ثم نضغط موافق للتنفيذ. وستحصل على نتيجة الاختبار في نافذة المخرجات كما يظهر في جدول (3.6). ومن هذا الجدول يمكن ملاحظة أن ($P-value = 0$) وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن متغير "النوع" يتبع توزيع ذي الحدين باحتمال نجاح يساوي 0.30، أو ($H_0: P = 0.30$).

جدول 3.6: نتيجة اختبار ذي الحدين لمتغير "النوع" باحتمال نجاح 0.30، (لبيانات "فيتامين دال").

Binomial Test					
	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Exact Sig. (1-tailed)
Group 1	ذكر	31	.5	.3	.000
Group 2	أنثى	29	.5		
Total		60	1.0		

وبالطبع هذا لا يعني أن متغير النوع لا يتبع توزيع ذي الحدين، ولكن هذه النتيجة تعني أن احتمال النجاح الافتراضي (0.30) لهذا المتغير هو غير متوافق مع المشاهدات.


ملاحظة:

قم بإعادة تنفيذ اختبار ذي الحدين السابق مستخدما احتمال نجاح يساوي 0.50 وستجد أن نتيجة الاختبار ستتغير إلى قبول الفرضية ($H_0: P = 0.50$)، لأن القيمة الاحتمالية للاختبار ستكون $P-value = 0.897$.

في كثير من الأحيان قد نتعامل مع متغيرات وصفية غير ثنائية، أي أن المشاهدات فيها تأخذ أكثر من مستويين، أو أنتا قد نتعامل مع متغير كمي ونرغب في اختبار ما إذا كان يتبع توزيع ذي الحدين إذا ما تم تقسيم قيم المشاهدات إلى قسمين بناء على قيمة محددة، عندئذ يمكننا استخدام اختبار ذي الحدين بالصورة التالية:

1. في بيانات "فيتامين دال"، سنقوم باختبار توزع المتغير الوصفي الرتبوي "مستويات_فيتامين_dal"، والذي يأخذ ثلاثة مستويات، بتوزيع ذي الحدين عن طريق اعتبار أن الأشخاص الذين مستويات الفيتامين لديهم أقل من 30 يتبعون التقسيم الأول الجديد، والذين لديهم مستويات فيتامين 30 فأكثر، (وتشمل المستويين الأصليين من 30 إلى 75، وأكثر من 75)، يتبعون التقسيم الثاني الجديد.

وبالتالي سنقوم في نافذة اختبار ذي الحدين باختيار المتغير "مستويات_فيتامين_dal" ونقله إلى مربع قائمة متغيرات الاختبار وإعادة تقسيم المتغير ذو الثلاثة مستويات إلى المستويين المذكورين أعلاه، سنقوم باختيار نقطة الفصل (Cut point) في مربع تعريف المستويين الثنائيين (Define Dichotomy)، ثم ندخل القيمة 1 (والتي ترمز للأشخاص الذين لديهم مستويات فيتامين أقل من 30) كقيمة للفصل بين المستويات. وسنبقى قيمة الاحتمال الاختبارية (Test Proportion) عند القيمة 0.50، كما هو موضح في الشكل (4.6)، ثم نضغط موافق.



شكل 4.6: نافذة اختبار ذي الحدين لمتغير "مستويات_فيتامين_دال" باحتمال نجاح 0.50.

وفي نافذة المخرجات، ستظهر نتيجة اختبار ذي الحدين، (جدول (4.6))، ونلاحظ أن ($P\text{-value} = 0.699$)، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأن متغير "مستويات_فيتامين_دال" يتبع توزيع ذي الحدين باحتمال نجاح يساوي 0.50، أو ($H_0: P = 0.50$). وهكذا يمكن القول بأن احتمال أن يكون مستوى فيتامين دال لأي شخص هو 30 فأقل يساوي 0.50.

جدول 4.6: نتيجة اختبار ذي الحدين لمتغير "مستويات_فيتامين_دال" باحتمال نجاح 0.50، (لبيانات "فيتامين دال").

Binomial Test					
	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Exact Sig. (2-tailed)
مستويات فيتامين دال	Group 1	<= 1	.53	.50	.699
	Group 2	> 1	.47		
	Total	60	1.00		

2. من جديد في بيانات "فيتامين دال"، سنقوم باختبار توزع المتغير الكمي "العمر"، بتوزيع ذي الحدين عن طريق اعتبار أن الأشخاص الذين أعمارهم هي 45 سنة فأقل يتبعون التقسيم الأول الجديد، والذين أعمارهم أكبر من 45 سنة يتبعون التقسيم الثاني الجديد.

سنقوم الآن في نافذة اختبار ذي الحدين باختيار المتغير "العمر" ونقله إلى مربع قائمة متغيرات الاختبار ولتقسيم المتغير الكمي إلى مستويين سنقوم باختيار نقطة الفصل (Cut point) في مربع تعريف المستويين الشائين (Define Dichotomy)، ثم ندخل القيمة 45 كقيمة للفصل بين الأعمار. وسننادي قيمة الاحتمال الاختبارية (Test Proportion) عند القيمة 0.50، ثم نضغط موافق.

في نافذة المخرجات، تُظهر نتيجة اختبار ذي الحدين، (جدول (5.6))، أن ($P\text{-value} = 0.897$) وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأن متغير العمر يتبع توزيع ذي الحدين باحتمال نجاح يساوي 0.50. وهكذا يمكن القول بأن احتمال أن يكون عمر أي شخص هو 45 فأقل يساوي 0.50.

جدول 5.6: نتيجة اختبار ذي الحدين لمتغير "العمر" باحتمال نجاح 0.50، (البيانات "فيتامين دال").

Binomial Test					
	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Exact Sig. (2-tailed)
Group 1	<= 45	29	.48	.50	.897
Group 2	> 45	31	.52		
Total		60	1.00		

ملاحظة:

قم بإعادة تنفيذ اختبار ذي الحدين السابق لمتغير العمر مستخدماً القيمة 60 سنة كقيمة للفصل بين المستويين، وستجد أن نتيجة الاختبار ستتغير إلى رفض الفرضية الصفرية ($H_0: P = 0.50$)، لأن القيمة الاحتمالية للاختبار ستكون $P\text{-value} = 0.006$.


3.1.6 اختبار الدورات (Runs Test)

اختبار الدورات أو اختبار والد-ولفويتز للدورات (Wald-Wolfowitz runs test) هو اختبار لا معملي يهدف للتحقق من مدى عشوائية أو استقلالية المشاهدات المتتالية ضمن متغير ما. بمعنى آخر، اختبار الدورات قد يساعد الباحث في التتحقق من عشوائية المعاينة التي تمت من المجتمع. وتكون الفرضية الصفرية التي يتم اختبارها هي: كل مشاهدة في متتالية العينة قد تم سحبها بصورة مستقلة من نفس المجتمع.

ويعتمد تطبيق اختبار الدورات من الناحية النظرية على إعطاء إشارة موجبة (+) لقيم المشاهدات الأكبر من قيمة معينة، (والتي يمكن أن تكون قيمة الوسط الحسابي أو الوسيط أو المنوال أو أي قيمة أخرى يحددها المستخدم)، وإعطاء الإشارة السالبة (-) للقيم الأقل من تلك القيمة المحددة. ثم يتم حساب عدد الدورات عن طريق حساب عدد التغيرات في الإشارات الموجبة والسالبة، ويتم بعد ذلك مقارنة عدد الدورات المحسوبة من المشاهدات بعد الدورات المتوقع والذي يتبع، تحت الفرضية الصفرية، توزيعاً طبيعياً تقريباً.

ولتتطبيق اختبار الدورات في برنامج SPSS، نقوم بفتح ملف البيانات "فيتامين دال" ثم نختار من شريط الأوامر العلوي Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>Runs في تلك النافذة باختيار المتغيرين "العمر" و"مستويات_فيتامين_دال" على سبيل المثال وانقلها إلى مربع قائمة متغيرات الاختبار، ثم اختر الوسط الحسابي (Mean) فقط¹ من مربع قيمة القطع (Cut Point) كما يظهر في الشكل (5.6)، ثم ضغط موافق.

¹ يوفر برنامج SPSS ثلاثة خيارات أساسية لقيم القطع هي الوسط الحسابي، الوسيط، والمنوال، إضافة لقيمة التي يحددها المستخدم (Custom)، وننوه هنا إلى أن استخدام قيم الوسيط وأو المنوال قد لا يكون ملائماً في بعض الحالات، خاصة في المتغيرات التي تأخذ قيم ثانية.



شكل 5.6: نافذة اختبار الدورات للمتغيرين "العمر" و"مستويات فيتامين دال".

ستظهر بعد ذلك النتائج للمتغيرين في نافذة المخرجات، (جدول (6.6)), ونتجه منها لرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن المشاهدات المتتالية في متغير العمر قد تم سحبها بصورة مستقلة من المجتمع، بمعنى أن نتيجة اختبار الدورات يفترض أن أعمار الأشخاص المتتالية في العينة لم يتم جمعها بصورة عشوائية.

جدول 6.6: نتائج اختبار الدورات للمتغيرين "العمر" و"مستويات فيتامين دال".

	العمر	مستويات فيتامين دال
Test Value ^a	47.57	1.70
Cases < Test Value	32	32
Cases \geq Test Value	28	28
Total Cases	60	60
Number of Runs	23	32
Z	-2.058	.296
Asymp. Sig. (2-tailed)	.040	.767
a. Mean		

وعلى النقيض، نميل لقبول الفرضية القائلة بأن المشاهدات (التقسيمات) المتتالية في متغير مستويات فيتامين دال هي مستقلة، (عشوائية في تسلسلها في العينة).

ملاحظة:

قم بإعادة تنفيذ اختبار الدورات السابق لمتغيرات أخرى سواء في نفس ملف البيانات أو ملف آخر مستخدما قيم قطع متنوعة؛ قيمة الوسيط، المنوال، وقيم أخرى، ولاحظ الفروقات بين النتائج.

4.1.6 اختبار كولمجروف-سميرنوف لعينة واحدة (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

تناولنا فيما سبق استخدام اختبار كولمجروف-سميرنوف لاختبار توزع المتغير (أو العينة) بتوزيع طبيعي، والأمر هنا مشابه حيث أننا سنقوم باستخدام هذا الاختبار للتحقق من تبعية المتغير الكمي للتوزيع الطبيعي أو التوزيع المنتظم (Uniform)، أو توزيع بواسون (Poisson)، أو التوزيع الأسوي (Exponential)، وهي التوزيعات التي يوفرها اختبار كولمجروف-سميرنوف لعينة واحدة في برنامج SPSS.

ويعتمد اختبار كولمجروف-سميرنوف على مقارنة التوزيع الاحتمالي (التراكمي) الفعلي للمتغير بالتوزيع الاحتمالي المطلوب (المتوقع)، وكلما انخفضت قيمة احصاء الاختبار (اقرابة من الصفر) كلما دل ذلك على اقتراب التوزيع الاحتمالي الفعلي للمتغير من التوزيع الاحتمالي المطلوب مقارنته به. وتكون الفرضية الصفرية لاختبار أن المتغير يتبع التوزيع الاحتمالي المفترض، (ال الطبيعي، المنتظم، ...).

سنستخدم ملف البيانات "بيانات الطلبة" للتحقق من التوزيع الاحتمالي لبعض المتغيرات، وبالتالي قم في شريط الأدوات العلوي باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>1-Sample K-S، فتظهر نافذة الاختبار، كما يوضح الشكل (6.6). قم في تلك النافذة باختيار المتغيرات؛ "المقرر 1"، "المقرر 3"، و"الفصل" على سبيل المثال، ثم انقلها إلى مربع قائمة متغيرات الاختبار. ولنفرض أننا نريد اختبار ما إذا كان كل متغير من هذه المتغيرات يتبع التوزيع الطبيعي أو التوزيع المنتظم، لذلك سنقوم باختبار طبيعي (Normal) ومنتظم (Uniform) من مربع التوزيع الاحتمالي للاختبار (Test Distribution) كما يوضح الشكل، ثم نضغط موافق (OK) للتنفيذ.



شكل 6.6: نافذة اختبار كولمجروف-سميرنوف لعينة واحدة، (البيانات "معدلات الطلبة").

في نافذة المخرجات، ستكون النتائج موضحة في جدولين؛ الأول خاص بنتائج المقارنة بالتوزيع الطبيعي، (لكل متغير من المتغيرات الثلاثة المختارة)، والثاني خاص بنتائج المقارنة بالتوزيع المنتظم. ونلاحظ من الجدولين، (اللذين قد تم عرضهما في جدول واحد هو جدول (7.6))، ما يلي:

1. المتغير درجات الطلبة في المقرر 1 يتوزع بتوزيع طبيعي تقريبا، ($P\text{-value} = 0.200$) في اختبار التوزيع الطبيعي، ولا يتوزع بالتوزيع المنتظم، ($P\text{-value} = 0.029$) في اختبار التوزيع المنتظم.

2. المتغير درجات الطلبة في المقرر 3 لا يتوزع بتوزيع طبيعي، ($P\text{-value} = 0$) في اختبار التوزيع الطبيعي، ولا يتوزع بالتوزيع المنتظم، ($P\text{-value} = 0$) في اختبار التوزيع المنتظم.

3. المتغير ترتيب الفصل الدراسي للطالب يتوزع بتوزيع طبيعي تقريبا وإن كانت القيمة الاحتمالية للاختبار قريبة جداً من القيمة 0.05، ($P\text{-value} = 0.060$) في اختبار التوزيع الطبيعي، ويتواء بالتوزيع المنتظم، ($P\text{-value} = 0.751$) في اختبار التوزيع المنتظم، لذلك نتجه لاعتباره أقرب للتوزيع المنتظم.

جدول 7.6 : نتائج اختبار كولموجروف-سميرنوف لعينة واحدة للمقارنة بالتوزيع الطبيعي والتوزيع المنتظم، للمتغيرات "المقرر 1"، "المقرر 3"، و"الفصل"، (لبيانات "معدلات الطلبة").

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		درجة الطالب في المقرر 1	درجة الطالب في المقرر 3	ترتيب الفصل الدراسي للطالب
N		35	35	35
Normal	Mean	71.31	55.34	5.06
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	15.605	14.289	1.846
Most	Absolute	.114	.235	.145
Extreme	Positive	.075	.235	.145
Differences	Negative	-.114	-.129	-.124
Test Statistic		.114	.235	.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.000 ^c	.060 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2

		درجة الطالب في المقرر 1	درجة الطالب في المقرر 3	ترتيب الفصل الدراسي للطالب
N		35	35	35
Uniform	Minimum	35	27	2
Parameters ^{a,b}	Maximum	94	95	8
Most	Absolute	.246	.400	.114
Extreme	Positive	.029	.400	.095
Differences	Negative	-.246	-.150	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.455	2.364	.676
Asymp. Sig. (2-tailed)		.029	.000	.751

a. Test distribution is Uniform.
b. Calculated from data.

2.6 الاختبارات الالامعلمية لعينتين مستقلتين

(Nonparametric Tests for Two Independent Samples)

يوفّر برنامج SPSS الاختبارات التالية في منطقة الاختبارات الامثلية لعينتين مستقلتين:


1. اختبارات مان-ويتي U ووilkoxon لمجموع الرتب W (Mann-Whitney U and Wilcoxon) .(rank sum W Tests)
 2. اختبار كولمجروف-سميرنوف Z (Kolmogorov-Smirnov Z Test) .
 3. اختبار والد-ولفويتز للدورات (Wald-Wolfowitz Runs Test) .
 4. اختبار موسز للردود المتطرفة (Moses Extreme Reactions Test) .

يُعد اختبار مان-ويتي "النسخة" اللامعلمية من اختبار t لتساوي متوسطي المجتمع، إذا يقوم باختبار الفرضية القائلة بتساوي توزيعي عينتين مستقلتين، أو بمعنى آخر، يقوم الاختبار بالتحقق من أن العينتين مسحوبتين من مجتمعين متماثلين. ويعتبر اختبار ويلكوكسون لمجموع الرتب مكافئ لاختبار مان-ويتي لاختبار عينتين. أي أن كل من الاختبارين يقوم باختبار الفرضية الصفرية: العينتين لهما نفس التوزيع: H_0 .

وأما اختباري كولمجروف-سميرنوف ووالد-لوفيتز للدورات فقد تم التطرق لهما سابقاً، ويقُومُوا باختبار نفس الفرضية الصفرية أعلاه عن طريق التعامل مع كل عينة أو مجموعة على حده ثم مقارنة النتائج.

بالنسبة لاختبار موزر للردد المتطرفة، فيقوم باعتبار أن العينة أو المجموعة الأولى من المشاهدات هي مجموعة التحكم (Control group) واعتبار العينة الثانية هي مجموعة التجربة (Experimental group)، ثم يقوم بدمج العينتين واعطاء رتب لكل المشاهدات فيهما وتتنفيذ الاختبار.

ولتطبيق هذه الاختبارات، قم بفتح ملف البيانات "المقابلات الشخصية"، والذي سيكون المثال التطبيقي لنا في برنامج SPSS. ثم قم في شريط الأوامر العلوي باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>2 Independent Samples بنقل المتغير "نتائج_المقابلات" إلى مربع قائمة متغيرات الاختبار، ونقل متغير "الشركة" إلى مربع متغير التصنيف .(Grouping Variable)



شكل 7.6: نافذة اختبار عينتين مستقلتين في الاختبارات الالامعلمية، لملف البيانات "المقابلات الشخصية".

بعد ذلك اضغط على خيار تعريف المجموعات (Define Groups) وأدخل القيم 1 و 2 في النافذة الفرعية التي ستظهر في مربع المجموعة الأولى (Group 1) والمجموعة الثانية (Group 2) على التوالي، ثم اضغط استمرار.

ما قمنا به حتى الآن هو تعريف مشاهدات المتغير "نتائج المقابلات" كمتغير يضم مجموعتين أو عينتين مستقلتين، العينة الأولى هي نتائج مقابلات الشركة 1، والعينة الثانية هي نتائج مقابلات الشركة 2، والهدف سيكون اختبار ما إذا كانت كل من العينتين لهما نفس التوزيع أو اختبار ($H_0: \mu_1 = \mu_2$) باستخدام الاختبارات الالامعلمية لعينتين مستقلتين. في نافذة الاختبار، (شكل (7.6))، قم باختيار اختبار كولموجروف-سميرنوف Z إضافة لاختبار مان- ويتي U الافتراضي ثم اضغط موافق.

وفي نافذة المخرجات، سنحصل على نتائج الاختبارين، بالنسبة لاختبار مان- ويتي والذي سيظهر معه نتيجة اختبار ولوكسون، (جدول (8.6))، ومن هذه النتائج، ($P\text{-value} > 0.05$)، تتجه لقبول الفرضية الصفرية القائلة بتساوي توزيع العينتين، بمعنى أن نتائج المقابلات في الشركتين متوافقة (متكافئة).

جدول 8.6: نتائج اختبار مان- ويتي ولوكسون لعينتين مستقلتين، لبيانات "المقابلات الشخصية".

Test Statistics ^a		نتائج المقابلات
Mann-Whitney U		195.500
Wilcoxon W		405.500
Z		-.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.903
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]		.904 ^b

a. Grouping Variable: الشركة
b. Not corrected for ties.

ونلاحظ أن نفس النتيجة قد تم الوصول إليها من اختبار كولمجروف-سميرنوف، (جدول 9.6)، حيث أن القيمة الاحتمالية ($P\text{-value} > 0.05$).

جدول 6.9: نتائج اختبار كولمجروف-سميرنوف لعينتين مستقلتين، للبيانات "المقابلات الشخصية".

Test Statistics ^a		نتائج الم مقابلات
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		.316
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000
a. Grouping Variable: الشركة		

3.6 الاختبارات اللامعلميمية لعدة عينات مستقلة

(Nonparametric Tests for Several Independent Samples)


هذه الاختبارات تعادل في أهدافها اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد، أي أنها تختبر تساوي عدة متوسطات، أو تكافؤ توزيع عدة متغيرات. ومن أهم الاختبارات اللامعلميمية لعدة عينات مستقلة اختبار كروسكال-والس واختبار الوسيط.

1.3.6 اختبار كروسكال-والس H (Median test) واختبار الوسيط (Kruskal-Wallis H test)

يُعتبر اختبار كروسكال-والس امتداداً لاختبار مان-وتي U حيث أنه يختبر تساوي عدة متوسطات، أو يختبر ما إذا كانت العينات المستقلة هي مسحوبة من مجتمعات متطابقة التوزيع. وكذلك اختبار الوسيط الذي يتحقق من الاختلافات بين توزيعات المتغيرات محل الاختبار.

لتنفيذ هذه الاختبارات، قم بفتح ملف البيانات "فيتامين دال" في برنامج SPSS، حيث أننا سنقوم باختبار الفرضية الصفرية القائلة بأن معدلات مستويات فيتامين دال لدى الأشخاص هي متساوية في الفئات العمرية الثلاثة؛ (أقل من 30)، (من 30 إلى 50)، و(51 فأكثر)، أي أننا سنقوم باختبار الفرضية الصفرية $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ بصورة لامعلميمية.

في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>k Independent Samples، فتظهر نافذة الاختبار المطلوبة، (شكل 8.6).



شكل 8.6: نافذة اختبار عدة عينات مستقلة في الاختبارات الامثلية، (البيانات "فيتامين دال").

في تلك النافذة، سنقوم باختيار المتغير الكمي "فيتامين دال" ونقله لمربع قائمة متغيرات الاختبار، واختيار المتغير الوصفي "الفئة_العمرية" ونقله لمربع متغير التقسيم. بعد ذلك نضغط على أمر تعريف المدى (Define Range) والذي يتطلب إدخال القيمة الصغرى (Minimum) والقيمة الكبرى (Maximum) لتقسيمات المتغير الوصفي "الفئة_العمرية"، وهما القيمتان 1 و 3. ثم نضغط استمرار.

وبعد الضغط على موافق في نافذة الاختبار الرئيسية ستظهر النتائج في نافذة المخرجات. والنتيجة الأولى، (التي تظهر في جدول (10.6))، هي نتيجة اختبار كروسكال-والس ويظهر في الجدول الفرعية الأول عدد المشاهدات في كل تقسيم أو مجموعة، ومتوسط الرتب لكل مجموعة. وأما الجدول الفرعية الثانية فيشمل نتيجة الاختبار، بحيث أن القيمة الاحتمالية ($P\text{-value} = 0.138$) نستطيع الحكم بقبول الفرضية الصفرية $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ ، بمعنى أننا نعتقد بأن مستويات فيتامين دال متكافئة في الفئات العمرية الثلاثة للأشخاص.

جدول 10.6: نتائج اختبار كروسكال-والس لثلاثة عينات مستقلة، للبيانات "فيتامين دال".

Ranks			
فئات العمر		N	Mean Rank
فيتامين دال	أقل من 30	16	32.16
	من 30 إلى 50	20	35.48
	فأكثر	24	25.25
	Total	60	

Test Statistics ^{a,b}	
	فيتامين دال
Chi-Square	3.954
df	2
Asymp. Sig.	.138

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: فئات العمر

وأما نتائج اختبار الوسيط، (جدول 11.6)، فالنتيجة هي العكس، حيث أن القيمة الاحتمالية ($P-value = 0.003$)، مما يعني رفض الفرضية الصفرية، أي أنه بحسب اختبار الوسيط يوجد على الأقل متوسطان غير متساويان.

جدول 11.6: نتائج اختبار الوسيط لثلاثة عينات مستقلة، للبيانات "فيتامين دال".

		Frequencies		
		فئات العمر		
		أقل من 30	من 30 إلى 50	51 فأكثر
فيتامين_ DAL	> Median	9	14	5
	<= Median	7	6	19

Test Statistics ^a	
	فيتامين_ DAL
N	60
Median	29.00
Chi-Square	11.401 ^b
df	2
Asymp. Sig.	.003

a. Grouping Variable: فئات العمر
b. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.5.

وهذا الاختلاف في نتيجة الاختبارين يعود لاختلاف طبيعة حساب قيمة إحصاء الاختبار لكل منهما، ويعود الحكم النهائي للباحث الذي قد يقوم بتنفيذ اختبارات مقارنة متعددة لكل متغيرين على حدة للحصول على فهم أعمق لتفوز المشاهدات في كل متغير.

4.6 الاختبارات اللامعلمية لعينتين مرتبتين (Nonparametric Tests for Two Paired Samples)

كما هو الحال مع الاختبارات اللامعلمية المتعلقة بالعينات المستقلة، فإن اختبارات العينات المرتبطة لعينتين تختبر ما إذا كانت العينتين أو المتغيرين يتبعان نفس التوزيع. ويوفر برنامج SPSS أربعة اختبارات غير معلمية بالنسبة للعينات المرتبطة لاختبار الفرضية الصفرية $H_0: \mu_1 = \mu_2$. ويتم استخدام هذه الاختبارات بحسب طبيعة المتغيرات المراد اختبارها، وسنقوم باستعراضها فيما يلي:

1.4.6 اختبار الإشارة وختبار ولوكسون للرتب ذات الإشارات

(Sign and Wilcoxon Signed-Rank Tests)


يتم استخدام هذين الاختبارين عند التعامل مع عينات مرتبطة كمية، حيث يقوم اختبار الإشارة بحساب الفروقات بين المتغيرين ثم تصنيفها إلى فروقات موجبة، سالبة، ومتعادلة (أي لا توجد فروقات). وإذا كان المتغيران لهما نفس التوزيع، فإن عدد الفروقات الموجبة والسلبية سيكون متقارب.

وأما اختبار ولوكسون للرتب ذات الإشارات، فيعد أفضل من اختبار الإشارة نظراً لأنه يأخذ في الاعتبار مقدار الفروقات بين المتغيرين إلى جانب إشارات الرتب، وبالتالي فإن إحصاء الاختبار ستشمل على معلومات أكثر عن المتغيرين.

ولنقم الآن بتطبيق هذين الاختبارين في برنامج ملف البيانات "عينات ضغط الدم"، حيث أثنا سنتester ما إذا كانت قياسات ضغط الدم للمرضى قبل تناول الدواء الموسع للأوردة مقاربة لقياسات بعد تناول الدواء. ونذكر القارئ هنا إلى أنه قد تم استخدام اختبار t في الفصل الرابع لاختبار نفس الفرضية الصفرية السابقة للمتغيرين بصورة معلمية؛ $H_0: \mu_D = 0$.

في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>2 Related Samples، وفي نافذة الاختبار، الموضحة في شكل (9.6)، قم باختيار المتغير "عينة 1" ونقله إلى مربع أزواج المتغيرات في الاختبار (Test Pairs) ثم اختيار المتغير "عينة 2" ونقله إلى نفس المربع لتكوين زوج الاختبار.

بعد ذلك، وفي مربع نوع الاختبار (Test Type)، قم باختيار كل من اختبار ولوكسون للرتب ذات الإشارات (Wilcoxon) واختبار الإشارة (Sign)، ثم اضغط موافق.



شكل 9.6: نافذة اختبار عينتين مرتبطتين في الاختبارات الامثلية، للمتغيرين "عينة 1" و"عينة 2" (للبيانات "عينات ضغط الدم").

في نافذة المخرجات ستظهر نتيجة الاختبارين، ومن النتيجة الأولى، (الموضحة في جدول (12.6))، يمكن في الجدول الفرعي الأول ملاحظة متواسطات الرتب، (الموجبة، السالبة، والمتعادلة)، ومجموع هذه الرتب. وأما نتيجة الاختبار، ($P\text{-value} = 0.474$)، فتظهر في الجدول الفرعي الثاني، والتي تقترح قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فرق معنوي بين العينتين، بمعنى عدم وجود فرق في قياسات ضغط الدم قبل تناول الدواء وبعد تناوله.

جدول 12.6: نتائج اختبار ولوكسون للرتب ذات الإشارات، للمتغيرين "عينة 1" و"عينة 2"، (البيانات "عينات ضغط الدم").

		Ranks	N	Mean Rank	Sum of Ranks
ضغط الدم قبل استخدام الدواء - ضغط الدم قبل استخدام الدواء	Negative Ranks	5 ^a		9.50	47.50
	Positive Ranks	10 ^b		7.25	72.50
	Ties	0 ^c			
	Total	15			

a. ضغط الدم قبل استخدام الدواء < ضغط الدم بعد استخدام الدواء -

b. ضغط الدم قبل استخدام الدواء > ضغط الدم بعد استخدام الدواء

c. ضغط الدم بعد استخدام الدواء = ضغط الدم قبل استخدام الدواء

Test Statistics ^a	
Z	-.716 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.474

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

وهذه النتيجة هي مطابقة لما تم التوصل إليه لنفس المتغيرين باستخدام اختبار t في الفصل الرابع.

ومن النتيجة الثانية، (في جدول 13.6))، والخاصة بنتيجة اختبار الإشارة، نجد أن القيمة الاحتمالية تساوي (-P-value = 0.302)، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية، وبالتالي نرى بأن نتائج اختبار الإشارة متواقة مع نتائج اختبار ولوكسون للرتب ذات الإشارات.

جدول 13.6: نتائج اختبار الإشارة للمتغيرين "عينة 1" و"عينة 2"، (البيانات "عينات ضغط الدم").

Frequencies		N
ضغط الدم بعد استخدام الدواء - ضغط الدم قبل استخدام الدواء	Negative Differences ^a	5
	Positive Differences ^b	10
	Ties ^c	0
	Total	15

a. ضغط الدم قبل استخدام الدواء < ضغط الدم بعد استخدام الدواء -

b. ضغط الدم قبل استخدام الدواء > ضغط الدم بعد استخدام الدواء

c. ضغط الدم بعد استخدام الدواء = ضغط الدم قبل استخدام الدواء .

Test Statistics ^a	
	ضغط الدم بعد استخدام الدواء - ضغط الدم قبل استخدام الدواء
Exact Sig. (2-tailed)	.302 ^b

a. Sign Test
b. Binomial distribution used.


2.4.6 اختبار ماك نيمير (McNemar Test)

يُستخدم اختبار ماك نيمير مع المتغيرات الوصفية ثنائية القيم، حيث يقوم بتحديد ما إذا كان معدل الاستجابة الأولية (في المتغير الأول، أي قبل حدوث التغيير) هو مساوي لمعدل الاستجابة النهائية (في المتغير الثاني، أي بعد حدوث التغيير)، فإذا كانت نتائج الاختبار تتضمن المساواة، فهذا يدل على عدم حدوث تغيير في

الاستجابة من المتغير الأول إلى المتغير الثاني، أو بمعنى أبسط هذا يدل على عدم وجود فرق معنوي بين وسطي المجتمعين محل الدراسة.

لتطبيق هذا الاختبار، سنقوم أولاً بتعريف متغيرين وصفيين ثانيين جديدين في ملف البيانات السابق "عينات ضغط الدم"، هما تحويل من المتغيرين الكميين الأصليين "عينة1" و "عينة2" بحيث يأخذ كل من المتغير الأول الجديد، (وليكن اسمه "عينة1_ثنائي")، والمتغير الثاني الجديد، (ولي肯 اسمه "عينة2_ثنائي")، القيمة 1 للقيم 120 فأقل، والقيمة 2 للقيم الأكتر من 120. ويتم تعريف المتغيرين الجديدين باستخدام أمر إعادة ترميز في متغير جديد (Recode in Different Variables) في أمر تحويل (Transform) في شريط الأوامر العلوي كما وضمنا في الفصول السابقة.

الآن وفي شريط الأوامر العلوي بعد اختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>2 Related Samples، نقوم باختيار المتغيرين "عينة1_ثنائي" و "عينة2_ثنائي" ونقلهما إلى مربع أزواج المتغيرات في الاختبار (Test Pairs)، ثم اختيار اختبار ماك نيمير فقط في مربع نوع الاختبار (Test Type)، كما يوضح الشكل (10.6)، ثم نضغط موافق.



شكل 10.6: نافذة اختبار ماك نيمير في الاختبارات اللامعلمية، للمتغيرين "عينة1_ثنائي" و "عينة2_ثنائي".

في نافذة المخرجات، (جدول (14.6))، سيحتوي الجدول الفرعي الأول على مصفوفة تصنيف القيم الثانية في المتغيرين، ونلاحظ وجود حالة واحدة فقط مختلفة في التصنيف بين المتغيرين. أما نتيجة الاختبار في الجدول الفرعي الثاني فهي تبين عدم وجود تغيير يُذكر قبل استخدام الدواء وبعده، ($P\text{-values} = 1$).

جدول 14.6: نتائج اختبار ماك نير للمتغيرين "عينة1_ثنائي" و"عينة2_ثنائي".

عينة1_ثنائي & عينة2_ثنائي

عينة1_ثنائي	عينة2_ثنائي	
	120 فأقل	أكثر من 120
120 فأقل	3	0
أكثر من 120	1	11

Test Statistics^a

	عينة1_ثنائي & عينة2_ثنائي
N	15
Exact Sig. (2-tailed)	1.000^b

a. McNemar Test


b. Binomial distribution used.

3.4.6 اختبار التجانس الهامشي (Marginal Homogeneity Test)

يمكن اعتبار اختبار التجانس الهامشي للمتغيرات ذات القيم المتعددة، والذي يعتمد على توزيع مربع كاي، امتداداً لاختبار ماك نير للمتغيرات الثنائية، حيث أنه أيضاً يبحث عن حدوث تغير في الاستجابة من المتغير الأول (قبل) إلى المتغير الثاني (بعد).

وكما قمنا في البند السابق بتعريف متغيرين ثالثين جديدين، سنقوم هنا بتعريف متغيرين ثالثي (متعدد) القيمة، في ملف البيانات السابق "عينات ضغط الدم"، وسيكونوا تحويل من المتغيرين الكميين الأصليين "عينة1" و"عينة2" بحيث يأخذ المتغير الأول المتعدد، (وليكن اسمه "عينة1_ثلاثي")، والمتغير الثاني المتعدد، (ولي肯 اسمه "عينة2_ثلاثي")، القيمة 1 للقيمة 120 فأقل، والقيمة 2 للقيمة من 121 إلى 140، والقيمة 3 للقيمة الأكثر من 140. ويتم تعريف المتغيرين الجديدين باستخدام نفس أمر إعادة ترميز في متغير جديد في أمر تحويل (Transform) في شريط الأوامر العلوي.

الآن في شريط الأوامر العلوي بعد اختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>2 Related Samples، قم باختيار المتغيرين "عينة1_ثلاثي" و"عينة2_ثلاثي" ونقلهما إلى مربع أزواج المتغيرات في الاختبار (Test Pairs)، ثم اختيار اختبار التجانس الهامشي فقط في مربع نوع الاختبار (Test Type)، كما يوضح الشكل (11.6)، ثم نضغط موافق.



شكل 11.6: نافذة اختبار التجانس الهامشي في الاختبارات اللامعلميمية، للمتغيرين "عينة1_ثلاثي" و"عينة2_ثلاثي".

من الجدول (15.6)، الذي يحتوي على نتائج الاختبار في نافذة المخرجات، يتبيّن لنا من القيمة الاحتمالية للاختبار، ($P\text{-values} = 0.317$)، اتجاهها لقبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم حدوث تغيير معنوي في قياسات ضغط الدم للمرضى قبل استخدام الدواء وبعد استخدامه.

جدول 15.6: نتائج اختبار التجانس الهامشي للمتغيرين "عينة1_ثلاثي" و"عينة2_ثلاثي".

Marginal Homogeneity Test	
	عينة1_ثلاثي & عينة2_ثلاثي
Distinct Values	3
Off-Diagonal Cases	1
Observed MH Statistic	2.000
Mean MH Statistic	1.500
Std. Deviation of MH Statistic	.500
Std. MH Statistic	1.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	.317

وخلاصة القول هنا، أن الاختبارات الأربع اللامعلميمية؛ اختبار الإشارة، اختبار لوکوسون للرتب ذات الإشارات، اختبار ماك نمير، واختبار التجانس الهامشي كلها أظهرت نفس النتيجة، فيما يتعلق بمتاننا المستخدم، باختلاف طبيعة المتغيرات المستخدمة في الاختبار؛ كمية، ثنائية، ومتعددة.

5.6 الاختبارات اللامعلميمية لعدة عينات مرتبطة (Nonparametric Tests for Several Paired Samples)

كما هو الحال مع الاختبارات السابقة، فإن هذه الاختبارات اللامعلميمية تقوم بمقارنة توزيع عينتين مرتبطتين أو أكثر، ويتوفر في برنامج SPSS ثلاثة اختبارات غير معلميمية بالنسبة لـ k عينة مرتبطة تقوم باختبار الفرضية الصفرية $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$. وسنقوم باستعراض هذه الاختبارات فيما يلي:

1.5.6 اختبار فريدمان (Friedman test)

يمكن اعتبار اختبار فريدمان، أو اختبار فريدمان ANOVA كما يُطلق عليه أحياناً، اختباراً مكافئاً لتحليل التباين في اتجاهين، حيث يقوم بإعطاء رتب من 1 إلى k للمتغيرات، (والتي عددها k)، وذلك بالنسبة لكل مشاهدة في العينة. فإذا كانت المتغيرات موجودة في الأعمدة، فهذا يعني أن الرتب ستوزع على المشاهدات في كل صف، ثم يتم حساب قيمة إحصاء الاختبار، والتي تعتمد على توزيع مربع كاي، من هذه الرتب.

ولتطبيق اختبار فريدمان لنأخذ المثال التالي في جدول (16.6)، والذي يمثل أوزان 10 أشخاص (بالكيلوجرام) قاموا بتطبيق النظام الغذائي المعروف باسم الكيتو (Keto Diet)، هو نظام غذائي يعتمد على خفض نسبة الكربوهيدرات مقابل الاعتماد على عنصر الدهون، وذلك لمدة أربعة أشهر متواصلة.


جدول 16.6: أوزان 10 أشخاص في أربعة أشهر أثناء تطبيق نظام الكيتو الغذائي.

الشهر 1	الشهر 2	الشهر 3	الشهر 4
75	90	84	86
75	83	80	81
74	89	95	98
69	80	75	77
65	73	70	75
68	77	80	75
70	79	86	80
71	79	80	82
64	81	83	81
73	91	88	90

وبالتالي يمكن اعتبار أن أوزان هؤلاء الأشخاص في الأشهر الأربعة هي عينات أو متغيرات مرتبطة وليس مستقلة، لأن وزن الشخص في كل شهر يتعلق بالشهر السابق والشهر اللاحق خلال فترة تطبيق الحمية. وسيكون الهدف هنا هو استخدام اختبار فريدمان للعينات المرتبطة للتحقق من وجود تغيير في أوزان هؤلاء الأشخاص خلال الأشهر الأربعة.

سنبدأ بإدخال المتغيرات في جدول (16.6) في ملف بيانات جديد في برنامج SPSS باسم "نظام الكيتو"، بحيث يمثل كل شهر متغير، (بنفس الاسم).

الآن وفي شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>k Related Samples، وبعد ظهور نافذة الاختبار قم باختيار المتغيرات الأربعة ونقلها إلى مربع متغيرات الاختبار (Test Variables)، وستجد أن الخيار الافتراضي في النافذة هو اختبار فريدمان، كما يظهر في الشكل (12.6). قم بعدها بالضغط على موافق لتنفيذ الاختبار.



شكل 12.6: نافذة اختبار عدة عينات مرتبطة في الاختبارات الامثلية، لمتغيرات ملف البيانات "نظام الكيتو".

الجدول (17.6) يمثل النتائج التي ستظهر في نافذة المخرجات، ونلاحظ وجود قيم متوسطات الرتب لكل متغير في الجدول الفرعى الأول، أما الجدول الفرعى الثانى فظهر فيه نتائج الاختبار ومنه نتجه لرفض الفرضية الصفرية $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ ، وبالتالي يمكننا القول بأن اتباع نظام الكيتو الغذائي سيغير من الوزن بصورة معنوية (ملحوظة) خلال الأشهر المتتالية، (لكن هذا لا يعني بالضرورة التغير بنقصان الوزن).

جدول 17.6: نتائج اختبار فريدمان لمتغيرات

ملف البيانات "نظام الكيتو".

Ranks	
الشهر 1	Mean Rank
الشهر 2	1.00
الشهر 3	3.05
الشهر 4	2.80
	3.15

Test Statistics ^a	
N	10
Chi-Square	18.576
df	3
Asymp. Sig.	.000
a. Friedman Test	

2.5.6 اختبار كيندل W test (Kendall's W test)

يمكن اعتبار إحصاء اختبار كيندل W بمثابة معامل للتوافق (Coefficient of Concordance)، حيث أنه يستخدم تحديداً للتحقق من مدى اتفاق آراء المصوتيين على موضوعات معينة. فمثلاً، إذا تم سؤال مجموعة من الأشخاص (المشاهدات) عن أداء أربعة حكومات متعاقبة (والتي ستمثل المتغيرات) لأحدى الدول، عندها يكون اختبار كيندل W هو الاختبار الأنسب للتحقق من مدى توافق آرائهم.

وكما هو الحال مع الاختبارات اللامعلميمية، فإن هذا الاختبار يعتمد على الرتب التي يتم تعينها للقيم، حيث يقوم الاختبار بأخذ مجموع الرتب لكل متغير، وستتراوح قيمة إحصاء كيندل W ما بين القيمة 0، (والتي تعني عدم وجود أي توافق في الآراء)، والقيمة 1، (والتي تعني التوافق التام في الآراء).

ولنأخذ المثال التالي في جدول (18.6)، والذي يمثل تقييمات 12 سيدة تم سؤالهن عن آراءهن حول مستحضرات لتفريح البشرة من ثلاثة شركات شهيرة هي Nivea، Johnson، La Roche، فقمن بتقييم كل مستحضر على مقياس من 1 إلى 10، (أي من التقييم الأسوأ إلى التقييم الأفضل على الترتيب).


جدول 18.6: آراء 12 سيدة حول ثلاثة مستحضرات لتفريح البشرة، (من 1 إلى 10).

Nivea	La Roche	Johnson
3	9	4
5	8	3
2	9	2
4	10	3
1	7	1
6	8	1
7	9	3
1	10	5
2	10	6
5	8	8
5	7	10
6	8	9

وسيكون الهدف هنا هو التتحقق من مدى توافق آراء هذه العينة من السيدات حول الشركات الثلاثة. وسنقوم بإدخال المتغيرات في جدول (18.6) في ملف بيانات جديد في برنامج SPSS باسم "شركات التجميل"، بحيث تمثل كل شركة متغير وبنفس الاسم.

في شريط الأوامر العلوي قم باختيار Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>k Related Samples نافذة الاختبار قم باختيار المتغيرات الثلاثة ونقلها إلى مربع متغيرات الاختبار (Test Variables)، كما يظهر في الشكل (13.6). قم باختيار اختبار كيندل W، (ويمكنا إبقاء خيار اختيار اختبار

فریدمان موجوداً لمقارنة النتائج)، ونقوم بعدها بالضغط على موافق.



شكل 13.6: نافذة اختبار عدة عينات مرتبطة في الاختبارات اللامعلميمية، لمتغيرات ملف البيانات "شركات التجميل".

وفي نافذة المخرجات، سنبدأ بالتعليق على نتيجة اختبار كيندل W أولاً، والتي تُعرض في جدول (19.6)، ونلاحظ من نتيجة الاختبار في الجدول الفرعى الثاني أن معامل أو إحصاء كندل للتتوافق تساوى 0.539 مما يدل على

وجود اختلاف في آراء السيدات في العينة حول مستحضرات تجميل البشرة في الشركات الثلاثة، ويؤكد هذا الاستنتاج القيمة الاحتمالية للاختبار ($P-value = 0.002$). وأما الجدول الأول الفرعى في جدول (19.6) فيمثل متوسطات الرتب في المتغيرات (الشركات) الثلاثة.

جدول 19.6: نتائج اختبار كيندل W لمتغيرات

ملف البيانات "شركات التجميل".

Ranks	
	Mean Rank
Nivea	1.42
La_Roche	2.79
Johnson	1.79

Test Statistics	
N	12
Kendall's W ^a	.539
Chi-Square	12.933
df	2
Asymp. Sig.	.002

a. Kendall's Coefficient of Concordance

ومن الجدول الفرعى الثانى، في جدول (20.6)، نرى بأننا نتجه لرفض الفرضية الصفرية القائلة بتساوي أو توافق آراء السيدات، $H_0: \mu_{Nivea} = \mu_{La_Roche} = \mu_{Johnson}$ ، وبالتالي يمكن رؤية توافق الاستنتاجات لكلا الاختبارين.

جدول 20.6: نتائج اختبار فريدمان لمتغيرات

ملف البيانات "شركات التجميل".

Ranks	
	Mean Rank
Nivea	1.42
La_Roche	2.79
Johnson	1.79

Test Statistics ^a	
N	12
Chi-Square	12.933
df	2
Asymp. Sig.	.002

a. Friedman Test

3.5.6 اختبار كوكران Q (Cochran's Q test)


يُعد اختبار كوكران Q مطابقاً لاختبار فريدمان، إلا أنه يتعامل مع قيم المتغيرات ثنائية، ويمكن أيضاً النظر إلى هذا الاختبار على أنه امتداد لاختبار ماك نمير عند التعامل مع k عينة. ولتطبيق هذا الاختبار، لنفرض أن آراء السيدات في المثال السابق، (في جدول (18.6)), قد تم تسجيلها بإجابات جيد أو سيئ على مستحضرات الشركات الثلاثة، أي أنها أصبحت إجابات ثنائية، كما يظهر في الجدول (21.6).

عندما سنقوم بإدراج المتغيرات الثلاثة في نفس ملف البيانات السابق "شركات التجميل" بالأسماء الجديدة التي

تظهر في الجدول، بحيث يتم تعين القيمة 1 للإجابة "سيء"، والقيمة 2 للإجابة "جيد"، مع مراعاة تعريف المشاهدات في عمود القيم (Values) في نافذة عرض المتغيرات (Variable View) في ملف البيانات.

Nivea_bi	La_Roche_bi	Johnson_bi
سيئ	جيد	سيئ
جيد	جيد	سيئ
جيد	جيد	سيئ
سيئ	جيد	سيئ
سيئ	جيد	جيد
سيئ	جيد	جيد
جيد	جيد	جيد

في شريط الأوامر العلوي سنقوم باختيار Analyze > Nonparametric Tests > Legacy Dialogs > k Related Samples، وفي نافذة الاختبار نقوم باختيار المتغيرات الثلاثة؛ Nivea_bi، La_Roche_bi، Johnson_bi ونقلها إلى مربع متغيرات الاختبار (Test Variables)، كما يظهر في الشكل (14.6). ثم نقوم باختيار اختبار كوكران Cochran's Q، ثم نضغط على موافق.



شكل 14.6: نافذة اختبار عدة عينات مرتبطة في الاختبارات اللامعلمية، للمتغيرات الثانية.

وفي نافذة المخرجات، سنحصل على النتائج المطلوبة، والتي يمثلها جدول (22.6)، ويوضح الجدول الفرعي الأول تكرار الإجابات بسيئ (1) وجيد (2) للشركات الثلاثة، لاحظ منها أن الشركة (La_Roche) لم تحصل على أي رأي "سيئ" في عينة السيدات.

جدول 22.6: نتائج اختبار فريدمان لمتغيرات ملف البيانات "شركات التجميل".

		Frequencies	
		Value	
		1	2
Nivea.bi		9	3
La_Roche.bi		0	12
Johnson.bi		8	4

Test Statistics	
N	12
Cochran's Q	13.273 ^a
df	2
Asymp. Sig.	.001

a. 1 is treated as a success.

وُظهرت نتيجة اختبار كوكران Q في الجدول الفرعى الثاني وجود اختلاف في آراء السيدات حول مستحضرات التجميل في الشركات الثلاثة، حيث أن القيمة الاحتمالية للاختبار ($P\text{-value} = 0.001$)، تؤيدنا لرفض الفرضية

$$H_0: \mu_{Nivea_bi} = \mu_{La_Roche_bi} = \mu_{Johnson_bi}$$

6.6 تحليل الموثوقية (Reliability Analysis)

في كثير من الدراسات قد يصعب على الباحث التأكيد من أن بيانات الدراسة المستخدمة في التحليل الإحصائي هي بيانات تمثل الواقع الحقيقي، وخاصة تلك البيانات التي تعتمد على إجابات الأشخاص عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأرائهم وأشهرها أسئلة الاستبيانات (Questionnaires)، والتي يرتكز معظمها على أسئلة ليكارت (Likert) المتعددة؛ الثنائية، الثلاثية، الخامسة، والسباعية.

إذ أن المجيب أو المستهدف من الاستبيان قد يعطي إجابات (بيانات) غير صحيحة وذلك لعدة أسباب منها عدم معرفته بإجابة السؤال أو الفقرة فيجيب بالتخمين، أو قد لا يركز في الأسئلة جيداً أو قد لا يفهم التعليمات فيما صحيحاً، أو قد يخشى قول الصدق، أو قد يشعر أن السؤال أو الفقرة شخصي جدًا في طبيعته، وغيرها من الأسباب، لذلك لابد في كثير من الدراسات التأكيد من مدى مصداقية الإجابات على الاستبيان وتقدير أخطاء الاستجابة.

وتوجد عدة طرق لقياس مدى صدق وثبات الاستبيان، وستطرق لأهم ثلاثة منها؛

1.6.6 معامل ثبات كرونباخ الفا (Cronbach's Alpha Coefficient)

يعد معامل ثبات كرونباخ الفا من أشهر مقاييس الثبات الداخلي (Internal Consistency) للاستبيان، ويعتمد على حساب الاختلافات (البيانات) الداخلية بين إجابات الأسئلة في الاستبيان من خلال استخدام الصيغة التالية:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S^2} \right)$$

حيث

k = عدد أسئلة الاستبيان، S_i^2 = التباين لإجابات السؤال i ، S^2 = التباين لإجابات جميع الأسئلة. وارتفاع قيمة المعامل يُعتبر مؤشراً على ارتفاع درجة ثبات أو موثوقية إجابات المستهدفين على الاستبيان.

2.6.6 معامل ثبات التجزئة النصفية (Split-Half Reliability Coefficient)

يعتمد حساب هذا المعامل على تجزئة أسئلة الاستبيان (المتغيرات) إلى جزأين متساوين، ثم حساب الارتباط بين مجاميع المتغيرات في كل جزء، (ول يكن r)، ثم حساب معامل الثبات أو الموثوقية ويُعرف أيضاً بمعامل سبيرمان-براون (Spearman-Brown) كالتالي:

$$\text{Spearman - Brown Coefficient} = \frac{2r}{1+r}$$

وكلما كانت قيمة معامل الثبات أكبر كلما دل ذلك على ثبات وصدق إجابات المستهدفين.

3.6.6 معامل ثبات جوتمان (Guttman Coefficient)

يعتمد هذا المعامل أيضاً على تجزئة أسئلة الاستبيان إلى نصفين متساوين ثم حساب تباين الإجابات في كل نصف على حدة، S_1^2 و S_2^2 ، ثم يتم حساب التباين الكلي لجميع إجابات الاستبيان S^2 ، وتكون صيغة حساب معامل جوتمان للثبات معرفة بالصورة التالية:

$$\text{Guttman Coefficient} = 2 \left(1 - \frac{S_1^2 + S_2^2}{S^2} \right)$$

ويمكن اعتبار معامل جوتمان حالة خاصة من معامل كرونباخ ألفا، والقيمة المرتفعة للمعامل تدل على ثبات أفضل للإجابات على الاستبيان.

لأخذ الآن المثال التالي لاستبيان افتراضي يتضمن 10 أسئلة تم توزيعه على عينة مكونة 100 شخص، حيث تمثل استجابة هؤلاء الأشخاص للأسئلة التالية المتعلقة بجودة المنتجات الغذائية العربية والأجنبية في العموم:

- س1:** المنتجات الغذائية العربية كلها متشابهة.
-
- س2:** يفضل دائماً شراء المنتجات الغذائية الأجنبية.
-
- س3:** المنتجات الغذائية العربية لا تتوفر فيها الجودة القياسية.
-
- س4:** المنتجات الغذائية الأجنبية دائماً ممتازة في جودتها.
-
- س5:** المنتجات الغذائية العربية سعرها مبالغ فيه.
-
- س6:** المنتجات الغذائية العربية تحتوي دائماً على مواد حافظة ضارة.
-
- س7:** مصانع المنتجات الغذائية العربية لا تهتم بأراء المستهلكين.
-
- س8:** المنتجات الغذائية الأجنبية ليست دائماً الأجد.
-
- س9:** المنتجات الغذائية الأجنبية تفتقد لنوع المستهلك العربي.
-
- س10:** يجب تقليص استيراد المنتجات الغذائية الأجنبية.
-

وإجابة كل سؤال كانت على مقياس من 1 إلى 9، بحيث أن القيمة 1 تعني غير موافق على الإطلاق ترداً في رأي الشخص إلى القيمة 9 والتي تعني موافق بشدة. إجابات المستهدفين من هذا الاستبيان هي مبنية في الجدول التالي، جدول (23.6)، والتي سنقوم بإدراجها في ملف بيانات جديد في برنامج SPSS باسم "استبيان المنتجات الغذائية". وسيكون الهدف هو استخدام بعض مؤشرات تحليل الموثوقية للتحقق من مدى موثوقية أو ثبات إجابات العينة المستهدفة من الاستبيان. وسنقوم بكتابة أسئلة الاستبيان في العمود الخاص بتعريف المتغيرات (Label) في ملف البيانات لمزيد من التوضيح أثناء تفسير النتائج التي سنحصل عليها لاحقاً من تحليل الموثوقية.


جدول 23.6: إجابات عينة من 100 شخص على 10 أسئلة في استبيان حول جودة المنتجات الغذائية العربية والأجنبية.

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
5	6	5	7	5	8	5	7	7	4	7	7	5	7	4	3	8	9	9	7
4	3	4	5	5	4	4	4	2	4	3	4	6	3	4	4	4	4	4	4
4	4	3	5	7	5	3	5	5	3	5	5	5	4	5	4	5	6	6	7
4	3	6	5	4	2	5	3	6	4	3	6	4	4	5	5	7	6	7	5
4	6	7	5	5	3	4	5	5	2	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5
5	6	6	8	4	5	6	7	7	7	7	7	7	5	7	2	5	5	5	5
5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	6	3	4	5	6
4	3	2	5	5	5	3	2	4	3	4	3	4	2	3	4	4	3	3	4
4	4	5	3	7	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	6	7	7	7
4	3	5	3	1	3	4	5	6	4	4	3	4	3	2	3	3	3	3	4
6	6	7	6	5	5	7	7	4	6	5	5	5	6	3	6	6	3	3	4
2	4	3	1	4	4	5	4	2	1	5	5	5	5	2	6	5	3	5	5
4	3	3	3	6	6	5	4	4	4	4	4	4	7	7	5	4	6	6	4
5	6	5	4	3	3	5	5	3	6	5	5	5	4	6	7	3	4	7	5
7	5	7	7	5	4	6	2	4	5	6	6	6	4	3	6	6	7	6	4
4	3	2	3	4	4	4	3	5	3	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
4	5	5	4	3	4	5	5	4	3	5	5	5	4	6	5	4	5	4	5
4	6	5	2	4	5	6	5	5	6	5	5	5	4	6	3	5	5	5	6

(تابع) جدول 23.6: إجابات عينة من 100 شخص على 10 أسئلة في استبيان حول جودة المنتجات الغذائية العربية والأجنبية.


6	6	5	6	5	6	6	5	7	8	5	3	3	3	4	6	3	2	3	5
5	4	5	5	4	8	6	5	5	4	4	5	5	5	3	4	4	5	5	5
5	3	4	3	5	6	3	4	5	3	3	5	5	5	3	7	5	6	6	5
4	5	5	5	3	3	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4	9	5
5	4	5	2	6	5	4	6	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2
6	6	4	5	4	4	4	6	3	5	2	3	5	5	3	1	6	5	3	3
4	4	4	4	4	5	6	5	3	4	2	2	5	4	5	3	4	4	3	2
5	7	4	5	5	7	7	6	3	4	5	4	6	4	7	7	5	4	5	4
6	4	5	6	3	3	4	3	6	5	6	6	7	5	5	4	4	4	6	5
6	6	6	4	8	5	6	6	4	5	3	4	6	7	5	4	5	6	6	5
3	5	4	3	3	5	6	4	4	5	2	4	3	3	7	3	4	4	3	3
7	4	5	4	7	5	7	5	4	4	1	5	5	4	5	1	5	3	6	4
1	2	2	3	3	2	2	2	3	1	6	7	6	5	5	8	3	5	6	6
7	6	7	7	4	4	5	5	6	5	5	4	4	5	6	8	3	3	5	5
5	5	4	6	6	5	5	6	6	6	6	5	6	5	6	4	4	5	6	6
6	7	7	4	6	3	8	7	5	6	5	6	5	6	4	4	4	5	6	6
5	6	6	4	4	7	6	6	5	6	2	3	3	2	6	2	1	4	3	3
3	5	5	3	5	3	4	4	6	3	5	6	4	5	3	4	6	6	5	5
7	6	7	6	6	6	6	7	6	4	5	4	4	5	5	3	7	5	4	5
3	4	5	2	3	6	4	4	3	4	4	5	4	4	5	5	5	6	4	8
4	4	3	3	4	5	2	1	4	1	4	5	5	5	4	3	6	4	6	4
6	6	5	5	3	6	5	4	7	5	2	4	4	5	4	4	3	6	5	5
4	5	5	5	6	3	6	4	4	5	2	4	4	5	4	4	3	6	5	5
4	5	4	3	2	4	5	5	5	5	3	4	5	4	3	6	4	3	2	2
4	5	2	3	3	2	3	4	2	4	2	6	6	3	7	6	3	4	5	6
6	7	7	5	5	6	6	5	5	5	4	6	6	5	5	6	4	7	6	7
6	6	3	3	5	7	4	6	5	6	5	5	5	5	6	6	4	7	6	3
6	6	6	5	5	4	5	5	6	5	3	5	5	5	6	5	5	6	5	4
3	4	2	2	4	7	3	3	3	3	3	5	4	6	1	4	5	5	4	4
4	4	2	4	5	3	5	2	4	4	4	5	3	5	5	6	4	3	4	2
8	7	6	5	3	2	7	5	4	5	3	4	4	5	6	6	4	5	4	5
1	4	1	5	4	4	3	3	5	3	2	6	6	7	5	6	7	6	6	6

في شريط الأدوات العلوي، قم باختيار Analyze>Scale>Reliability Analysis فتظهر نافذة التحليل كما هو موضح في الشكل (15.6). قم أولاً باختيار كل المتغيرات العشرة ونقلها إلى مربع الموارد أو المتغيرات (Items).



شكل 15.6: نافذة تحليل الموثوقية لمتغيرات ملف البيانات "استبيان المنتجات الغذائية".

بعد ذلك قم بالضغط على خيار الإحصاءات (Statistics) في أعلى اليمين فتظهر النافذة الفرعية الخاصة به، كما يوضح الشكل (16.6). وفي تلك النافذة قم باختيار خيار المقاييس عند حذف المتغير (Scale if item) في مربع الإحصاءات الوصفية (Descriptive for deleted).



شكل 16.6: نافذة اختيار الإحصاءات في تحليل الموثوقية.

ونلقت نظر المستخدم هنا إلى إمكانية اختيار عرض عدة نتائج مثل مصفوفة الارتباطات والتغييرات من مربع العلاقات بين المتغيرات (Inter-Item)، وعرض المتوسطات والتباينات وغيرها من مربع المخلصات (Summaries).

سنكتفي بخيارنا الحالي الآن ونضغط استمرار للعودة للنافذة الرئيسية، وفي تلك النافذة، سننقي على الخيار الافتراضي لطريقة حساب معامل الموثوقية في مربع النموذج (Model)، وهو معامل كرونباخ ألفا، ثم نضغط موافق فتظهر النتائج المطلوبة في نافذة المخرجات.

والجدول الأول يوضح عدد المشاهدات المستخدمة والمستثناة، والجدول الثاني في نافذة المخرجات، (جدول (24.6))، يعرض قيمة معامل كرونباخ ألفا في الجدول الفرعي الأول وهي قيمة جيدة ($\alpha = 0.799$) تدل على ثبات الإجابات في الاستبيان.

جدول 24.6: نتائج معامل كرونباخ ألفا واحصاءات المتغيرات لملف بيانات "استبيان المنتجات الغذائية".

Reliability Statistics				
Cronbach's Alpha	N of Items			
.799	10			
Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
المنتجات الغذائية العربية كلها متشابهة	41.70	53.889	.655	.759
يفضل دائماً شراء المنتجات الغذائية الأجنبية	41.46	55.625	.670	.760
المنتجات الغذائية العربية لا تتوفر فيها الجودة الرئيسية	41.50	56.879	.549	.773
المنتجات الغذائية الأجنبية دائماً ممتازة في جودتها	41.72	58.204	.485	.780
المنتجات الغذائية العربية سعرها مبالغ فيه	41.61	66.261	.060	.829
المنتجات الغذائية العربية تحتوي دائماً على مواد حافظة ضارة	41.65	64.210	.143	.820
مصانع المنتجات الغذائية العربية لا تهتم بأراء المستهلكين	41.55	56.028	.587	.768
المنتجات الغذائية الأجنبية ليست دائماً الأرخص	41.42	54.973	.619	.764
المنتجات الغذائية الأجنبية تعتقد لذوق المستهلك العربي يجب تقليص استيراد المنتجات الغذائية الأجنبية	41.53	56.716	.514	.776
	41.75	55.927	.568	.770

وأما الجدول الفرعى الثانى، والذي يمثل بعض المقاييس الإحصائية لمتغيرات (أسئلة) الاستبيان فيمكن الاستفادة منه بصورة خاصة للتحقق من الأسئلة (أو بمعنى آخر إجابات المستهدفين) التي وجودها يقلل من مدى ثبات الاستبيان، وهذه الأسئلة هي التي ترتفع قيمة معامل كرونباخ ألفا بحذفها، وهذا يمكن مراقبة في العمود الأول إلى اليمين من هذا الجدول (Cronbach's Alpha if Item Deleted).

ونلاحظ أن السؤالين الخامس (المنتجات الغذائية العربية سعرها مبالغ فيه) والسادس (المنتجات الغذائية العربية تحتوي دائماً على مواد حافظة ضارة) إذا ما تم حذفهما فإن قيمة معامل كرونباخ ألفا سوف ترتفع بصورة ملحوظة؛ (0.829) و(0.820) على الترتيب، إلى جانب كون معامل الارتباط بين هذين السؤالين والأسئلة كلٍّ هما الأدنى مقارنة بباقي معاملات الارتباط في العمود الثاني إلى اليمين، (0.060) و(0.143) على الترتيب.

لذلك قد يكون من الموصى به أحياناً حذف هذين السؤالين، (أو إدراهما على الأقل)، إذا ما رغب الباحث برفع مستوى موثوقية أو ثبات الاستبيان، وبالتالي رفع القيمة العلمية للدراسة ككل.

من جديد، يمكننا استخدام معامل ثبات التجزئة النصفية ومعامل جوتمان ضمن التجزئة النصفية ومعامل كرونباخ ألفا ضمن التجزئة النصفية لمزيد من التحقق حول مدى ثبات أسئلة الاستبيان.

في شريط الأدوات العلوي، قم من جديد باختيار Analyze>Scale>Reliability Analysis، وفي نافذة التحليل قم باختيار كل المتغيرات العشرة ونقلها إلى مربع المواد أو المتغيرات (Items)، وهنا يمكننا الاستغناء عن اختيار خيار المقاييس عند حذف المتغير (Scale if item deleted) في خيار الإحصاءات (Statistics) حيث أنه قد تم التطرق إليه في النتيجة السابقة. نقوم بعدها باختيار طريقة الثبات في التجزئة النصفية (Split-half) كطريقة حساب معامل الموثوقية في مربع النموذج (Model)، ثم نضغط موافق.

وفي نافذة المخرجات، من الجدول الثاني، والموضح هنا في جدول (25.6)، نلاحظ قيم معاملات الموثوقية وهي معروضة بالترتيب التالي، (حيث يمثل الجزء الأول (Part 1) الخمسة أسئلة الأولى في الاستبيان، والجزء الثاني (Part 2) الخمسة أسئلة المتبقية من السؤال السادس وحتى العاشر)؛

- قيم معامل كرونباخ ألفا للجزء الأول والثاني من المتغيرات وهي (0.662) و(0.673) على الترتيب ونلاحظ أنها أضعف من قيمة المعامل ألفا للأسئلة ككل، (جدول (24.5)).
- أما معامل الارتباط بين مجاميع المتغيرات في كل جزء فهو (0.659) وينعد مقولاً إلى حد ما، وأما معامل معامل ثبات التجزئة النصفية أو معامل سبيرمان-براون فهو (0.794) ويعتبر جيداً.
- والمعامل الأخير في الجدول وهو معامل جوتمان، (0.794)، يُعد أيضاً جيداً.

جدول 25.6: نتائج طريقة الثبات في التجزئة النصفية لمتغيرات ملف البيانات "استبيان المنتجات الغذائية".

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.662
		N of Items	5 ^a
	Part 2	Value	.673
		N of Items	5 ^b
		Total N of Items	10
Correlation Between Forms			.659
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.794
	Unequal Length		.794
Guttman Split-Half Coefficient			.794
الم المنتجات الغذائية العربية كلها متشابهة، يفضل دائمًا شراء المنتجات الغذائية الأجنبية، المنتجات الغذائية العربية لا الم المنتجات الغذائية العربية سعرها مبالغ فيه، بتتوفر فيها الجودة الفاسية، المنتجات الغذائية الأجنبية دائمًا ممتازة في جودتها مصنوع المنتجات الغذائية العربية لا تهتم بأداء ، المنتجات الغذائية العربية تحتوى دائمًا على مواد حافظة ضارة في جودتها المستهلكين، المنتجات الغذائية الأجنبية ليست دائمًا الأجدد، المنتجات الغذائية الأجنبية تفتقد لذوق المستهلك العربي، يجب تقليل استهلاك المنتجات الغذائية الأجنبية			

وهكذا نخلص إلى أن الإجابات على أسئلة الاستبيان بالنسبة لهذه العينة المكونة من 100 شخص تُعد جيدة الثبات أو الموثوقية من خلال نتائج المقاييس السابقة، مع الأخذ بالاعتبار حذف السؤال الخامس أو السادس أو كلاهما إذا ما أردنا رفع درجة ثبات أو موثوقية الاستبيان.

الملحق

ملفات البيانات المستخدمة في الكتاب

الصفحة	تعريف ملف البيانات	اسم ملف البيانات في SPSS
9	بيانات خاصة بعشرة أطفال في إحدى المؤسسات التعليمية في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وتشمل ثلاثة متغيرات هي وزن الطفل (بالكجم) وعمره (بالسنوات) وجنسه.	1. مثال 1
18	المشاهدات الخاصة بـ 35 طالباً جامعاً مقاسة لثمانية متغيرات هي: درجة الطالب في المقرر 1 (من 100 درجة)، درجة الطالب في المقرر 2، درجة الطالب في المقرر 3، عمر الطالب (بالسنوات)، جنس الطالب، ترتيب الفصل الدراسي للطالب، عدد أفراد أسرة الطالب، وعدد الحجرات في منزل الطالب.	2. بيانات الطلبة
26	بيانات المثال 1 مصنفة بحسب جنس الطالب.	3. مثال 2
26	بيانات المثال 1 مصنفة بحسب جنس الطالب ثم عمره.	4. مثال 3
27	آراء عينة مكونة من 12 شخص رداً على المطلوب التالي: "ضع إشارة (✓) أمام التطبيقات التي تستخدمها وإشارة (✗) أمام التطبيقات التي لا تستخدمها". وهذه التطبيقات هي؛ فيسبوك، واتساب، فايبر، وإنستجرام.	5. تطبيقات التواصل الاجتماعي
37	بيانات تمثل التقدير الدراسي والقسم العلمي لعينة من 15 طالب.	6. مثال 4
39	أسعار النفط العالمية الشهرية لمزيج برنت بالدولار الأمريكي لخمسة سنوات افتراضية.	7. أسعار النفط
42	بيانات خاصة بعدد من موظفي إحدى الشركات تضم ثلاثة متغيرات هي مرتب الموظف والعلاوة والخصم السنوي بالدينار الليبي.	8. مثال 5
50	بيانات من أمثلة برنامج SPSS تحتوي على خمسة متغيرات لعينة من 128 شخصاً في إحدى شركات التأمين على السيارات، والمتغيرات هي: عمر المؤمن على السيارة بالسنوات ضمن فئات عمرية، فئة تصنيف السيارة، عمر السيارة بالسنوات، معدل قيمة التأمين المدفوعة من قبل الشركة بالدولار، وعدد مبالغ التأمين المدفوعة.	9. car_insurance_claims

56	<p>أعداد الطلبة الذكور والإإناث في خمسة أقسام في كلية العلوم بجامعة بنغازي لعام 2012، والأقسام هي: الرياضيات، الإحصاء، الفيزياء، الكيمياء، والنبات.</p>	10. أقسام كلية العلوم
61	<p>آراء مجموعة من الأشخاص حول وجباتهم المفضلة، (متاجات، لحوم حمراء، سلطات، دجاج، بييتزا)، من المطاعم المختلفة.</p>	11. المأكولات المفضلة
80	<p>نتائج مقاومة خليط المعادن قبل وبعد إضافة معدن جديد، يستخدم في بناء جدران المنشآت العسكرية، خلال فترة ثمانية أشهر.</p>	12. مقاومة المعدن
85	<p>عينة مكونة من 90 طالبا من الطلبة القدامى في كلية العلوم بجامعة بنغازي مقسمة بحسب التخصص؛ (رياضيات، إحصاء، وفيزياء)، وتشمل معدل الطالب، (على مقياس من 0.00 إلى 4.00 درجة)، جنس الطالب، وعدد الفصول الدراسية التي أنجزها الطالب.</p>	13. معدلات الطلبة
110	<p>النتائج التي حصل عليها 20 شخصاً أجروا مقابلات شخصية للعمل في قسم الموارد البشرية في شركتين، (التقييم من 100 درجة).</p>	14. المقابلات الشخصية
112	<p>قياس ضغط الدم لعينة من 15 مريضاً في إحدى المستشفيات قبل وبعد إعطاؤهم دواء تجريبي موسع للأوردة الدموية.</p>	15. عينات ضغط الدم
114	<p>أسعار 10 أنواع من شواحن الهواتف النقالة بالدينار الليبي في ثلاثة متاجر مختلفة.</p>	16. أسعار الشواحن
118	<p>مستوى الإنتاج ومستوى الأرق لعينة مكونة من 90 عامل في أحد مصانع الحديد والصلب.</p>	17. مستوى الأرق
121	<p>معدلات فيتامين دال (Vit. D) وأعمار عينة مكونة من 60 شخصاً إضافة لتصنيفهم ذكور وإناث.</p>	18. فيتامين دال
141	<p>أطوال عينة مكونة من 20 طفلاً (بالسنتيمتر) تم تقسيمهم إلى خمسة مجموعات، كل مجموعة تم إعطاؤها نوع محدد من ضمن 5 أنواع من الحليب، وبداخل كل مجموعة من هذه المجموعات الخمسة تم اعتماد 4 أنواع من فيتامين دال.</p>	19. أطوال الأطفال
148	<p>ملف بيانات الطلبة مضافاً إليه متغير جديد يمثل معدل عدد ساعات الدراسة اليومية للطالب.</p>	20. بيانات الطلبة
221	<p>استبيان يتضمن 10 أسئلة تم توزيعه على عينة مكونة 100 شخص، ويتضمن استجابة هؤلاء الأشخاص لأسئلة متعلقة بجودة المنتجات الغذائية العربية والأجنبية في العموم.</p>	21. استبيان المنتجات الغذائية

المراجع

1. Barton, B., and Peat, J., (2014), *Medical Statistics: A Guide to SPSS, Data Analysis and Critical Appraisal*, John Wiley & Sons Ltd., U.K.
2. Brink, D., (2008), *Statistics*, David Brink and Ventus Publishing ApS. U.S.A.
3. Douglas, M. and George, R., (2003), *Applied Statistics and Probability for Engineers*, John Wiley and Sons, Inc. U.K.
4. Fernandes, M., (2009), *Statistics for Business and Economics*, Marcelo Fernandes and Ventus Publishing. U.S.A.
5. Field, A., (2006), *Discovering Statistics using SPSS*, SAGE Publications, London, U.K.
6. Frank, H., and Althoen, S., (1994), *Statistics: Concepts and Applications*, Cambridge University Press. U.K.
7. Gerber, S., and Finn, K., (2005), *Using SPSS for Windows: Data Analysis and Graphics*, Springer Science and Business Media, Inc. U.S.A.
8. Griffith, A., (2010), *SPSS for Dummies*, Wiley Publishing, Inc. U.S.A.
9. Gupta, V., (1999), *SPSS for Beginners*, VJBooks Inc., U.S.A.
10. Han, J. and Kamber, M., (2000), *Data Mining: Concepts and Techniques*, Morgan Kaufmann Publishers. U.S.A.
11. Landau, S., and Everitt, B., (2004), *A handbook of statistical analyses using SPSS*, Chapman & Hall/CRC Press LLC. U.S.A.
12. Leech, SN., Barrett, K., and Morgan, G., (2005), *SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation*, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. U.S.A.
13. Moore, D., (2003), *The Basic Practice of Statistics*, W. H. Freeman Publishers. U.S.A.
14. Spiegel, M., Schiller, J. and Srinivasan, R., (2001), *Schaum's Easy Outline of Probability and Statistics*, The McGraw-Hill Companies, Inc. U.S.A.
15. Stephens, L., (2006), *Schaum's Outline Beginning Statistics*, The McGraw-Hill Companies, Inc. U.S.A.
16. University of Bristol, (2010), *Introduction to SPSS (version 18) for Windows*, Information Services, U.K.
17. Wackerly, D., Mendenhall, W., and Scheaffer, R., (2002), *Mathematical Statistics with Applications*. Duxbury Thomson Learning, Inc. U.S.A.

ماذًا ؟SPSS

يُعد برنامج SPSS، والذي يمثل اختصاراً للعزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، البرنامج الإحصائي المفضل للطلبة والباحثين المتخصصين في العلوم الطبية والنفسية والبيولوجية، والعلوم الاجتماعية والأدبية، وكذلك العلوم الاقتصادية والمالية، وغيرها من التخصصات، حيث أنه متاح على العديد من الأساليب الإحصائية والمقاييس التي تتعلق بطبيعة هذه التخصصات وطرق تعاملها مع البيانات. ومن ضمن المزايا التي يشتمل عليها البرنامج، مقارنته بالبرامج الأخرى المرونة الفائقة في إدخال البيانات وتعديلها ومعالجتها، وتنوع طرق قرئ وتحويل المتغيرات، وكذلك سهولة استيراد وتصدير ملفات البيانات من وإلى البرامج الأخرى. وفي هذا الكتاب، تقوم بشرح كيفية التعامل مع البيانات بدراية من إدخالها في البرنامج وإجراء التعديلات عليها، من قرئاً بعرض طرق استكشافها وتشخيص الأخطاء المختلفة ضممتها، ثم استخدام الأساليب الأكثر عملاً في خليلها وفهمها، إلى توضيح كيفية تفسير النتائج الإحصائية وعرضها بصورة مبسطة.

